





BLASIUS
HOLLERIUS
ARS
MEDICA
THEORICA.

1565









MEDICAL SOCIETY
OF LONDON



ACCESSION NUMBER

PRESS MARK

HOLLERIUS, B.

II

pg 12

24

G. L. 33

65462/A

Medicę artis The

ORICA, LIBRIS DVOBVS SVCCIN=
*Et comprehensa, atq; medicinę Studiosis apprimę
necessaria.*

BLASIO HOLLERIO VIVARIEN=
si, Doctore Medico authore.



Anno. M. D. LXV.

AD LECTOREM.

Carolus Kyrningus D.

Certa Machaonias ut semita ferret in artes,
Et medicas iuuenes consequerentur opes:
Hunc tibi confecit lector studiose libellum
Hollerius: Musæ dexteritate suæ.
In quo commemorat uarios ex ordine morbos,
Perdere qui dira corpora tabe queant.
Ostendit sæui quæ sit tibi causa doloris,
Veraq; morborum quæ sit origo docet.
Sinimum calida correptus febre laboras:
Hic, si quæsieris, unde sit orta uides.
Argentees etiam si frigore concutit artus:
Quæ sit causa tuæ frigiditatis habes.
Deniq; quod poterit corpus torquere caducum:
Hic quo profluxit fonte uidere licet.
Ergo precor coëmas librum semperq; reuoluas:
Sic te cura tenet corporis ulla tui.
Atq; refer meritis auctori candide grates
Lector, qui præsens hoc tibi fecit opus.
Sed uos degeneres procul hinc decedite Momis:
Qui quodcunq; bonum dilaceratis opus.
Si tamen hæc audet, quid enim non Zoilus audet?
Ingenui quisquam carpere scripta uiri:
Tunc sibi cum pueris non rem sciat esse pusillis:
Sed qui uibretur liber Iambus erit.

ILLV

Illustrissimo do-

MINO, D. IOANNI DE FERRIE-
res: Vidamo Carnutensi, Domino
de Melligny &c. Virtute & do-
ctrina ornatissimo: Domi-
no meo plurimum
colendo.

BLASIVS HOLLERIVS VI-
uariensis. S. P. Opt.



VI ARTES ET SCI-
entias colunt Illustrissime
Vidame, primo in arce con-
templationis: deinde in ac-
tione operam impendunt. Sed hanc,
nisi contemplandi institutis atq; legi-
bus regatur, nutare & plerunque tu-
multuari periculosa experientia docet.
Vtraque compendiose ducta facilius
memoriam subit, atque animo con-
stantius inhæret. Neque enim in acti-
one posita, nisi artis fundamenta theo-
retica præcesserint, sese nobis commu-

A ñ

E P I S T O L A

nicant. Ob id Philosophi duplicem vitam statuerunt, alteram in intelligentia, alteram in administratione. si quidem nullus ad laudem otio locus dari potest. Primam igitur medicæ artis partem, quæ contemplatiua & speculatiua dicitur, in compendiariam notionem cogere uolui: ut infirma sustineatur memoria, dubia certior fiat, expediatur impedita, lapsa denique reuocetur. Atque ubi Celsitudo tua, Illustriss. Vidame beneuolentia & humanitate plena accessit, ad exprimendum quicquid hac in parte haberem, animus incaluit: Idque sub Celsitatis tuæ beneuolentia & fauore tutelariis: ne subicerem ac supprimerem, ius illud quod ad summam æquitatem exigis: & quod in commune bonum agnoscunt, uel infinitæ memoriæ. Ob id quæ ad medicinæ primam cognitionem spectant, summatim perstrinxi: quæ quidem ad altioris fastigij gradum subuexissem, nisi sceleratissimus ille Genius, fortuna dictus, obstitisset. Et adhuc dum singula ad excudendum expenderem, animum habebam adumbratum, contracto tum

nouo

DEDICATORIA:

nouo mihi matrimonio. Itaq; si quid inter-
ciderit, quo minus hoc meum tuæ
Celsitudini officium probetur, quæ-
dam uenia excusationis mihi, ut existis-
mo, dabitur. cum aliàs nihil adeo usq;
elimatam, tersum & politum fieri uix
potest, quod nō in calumniam rapiant
maleuoli, & asteriscis, unguibus, & gra-
phis seuerissimis uellicent, lacerent &
expugnant: atq; alterius cuiusq; operam
despectiorem habeant. qui quidem in-
geniosi uel abundantes otio, si quid de-
esse hic uideant, addendū: aut superesse,
rescandum: aut corrigendum permitti-
mus: atq; sua in medium adducant. Nū-
quam enim me pigebit iusta reprehen-
sione mea agnoscere & meliora redde-
re. Sed mihi nunc sat est, & præclarè a-
ctum puto, si te patronum ac tutorem
bonarum artiū et scientiarum. Illustris.
Vidame, tristi posterorum obliuione in-
uolui pro uiribus nō patiar, & posteris
tati medicinam facere cupienti, subsidio
sim. quo altiora & pleniora facilius in-
notescant, in mediū adducta: atq; in ma-
iorem ueniāt cōmendationem & usum.

EPISTOLA

inferiora tamē quā quæ ē penu literariā
atq; etiā promptuario tuæ eruditionis
& iudiciū possunt desumi. Ad hæc insti-
tutū illud percipio urgere, qđ Illustriss.
Prin. & Rom. Imp. Electori D. Frideri-
co Comiti Palatino, Christianæ religio-
nis amantissimo promissimus. Si quidē
ex eius etiā benignitate fructū nō illibe-
ralem, ex nō ita ualde magna opera, re-
cepi. Peracta, quā dixi, instituta ratione,
cognoscere studebo (qđ antea neglexi)
quid sit hominē optimē de se ipso me-
reri: quādoquidē uaria lectione hucusq;
delibutus, futura mihi, nō prospexi: quō
nomine angi, ut opinor, magnopere nō
debeo: Continget fortasse aliquando
per occasionē, ut hæc mœsta & impedi-
ta uitæ ratio, ad certum aliquem statum
immutetur. Itaq; si beneuolētia bonorū,
cuiusmodi es ipse, magnorūq; hominū,
in quorum numero honorificum locū
tenes, nobis sese communicarit, quæ ad
multarum ætatū memoriā perueniāt (si
uitā Deus dederit) in publicū edere ani-
mum induxi: uel etiā sub foelicissimo au-
spicio Regiæ Maiestatis literarū bonarū
peritia

DEDICATORIA:

peritia foeliciter instructæ . modo quid tantæ Maieſtati dignū excogitari uel inueniri queat; Et licet multī præſtantioris doctrinæ uiri in antecedentium uestigia progrediētes , medicæ artis compendia conſcripſerint , nihil tamen aut illis aut mihi derogatū exiſtimo , quo ſtudium communi concordia minus ſuſcipiatur. Sed inferiores ſunt hi noſtri conatus, quā ut tanto Domino adſcribi ac dedicari debuiffent. Veruntamē tantū apud me poteſt animi tui candor & Celſitudo, ut ad alia edenda ſim propenſus, ita me uera illa uirtutum tuarū conſtantia incitauit, quam comitantur multæ magnæq; actiones Heroicę, quas illuſtri laude celebrarem, ſi mihi eſſent ſermones, qui Celſitati tuæ probātur, De tua etiam gratia, quæ mihi fores aperit, non poſſum ſatis dignas agere gratias, habere tamē poſſum & habeo quā maximas. Deus opt. Max. Celſitudinis tuæ mentem ad Aeterni Dei gloriam & Reipub. commoditatem conſeruet.

Argentine Cal. Maijs, Anno,

M. D. LXIII. A iij

CONTENTORVM BRE-
uissimus Index.

<p>A</p> <p>Actio quid. 71</p> <p>Actiones duplices, ibid.</p> <p>Actiones ualide & im- becille. 72</p> <p>Aetates quot. 18</p> <p>Affectus qui morbi & quæ causæ. 143</p> <p>Affectus qui præter na- turam accidunt. 135.</p> <p>Alui deiectio. 273</p> <p>Animi Pathemata. 132</p> <p>Anni partes quatuor. 17</p> <p>Apothepia. 85</p> <p>Artes & earum fines. 2</p> <p>Arteriarum sanguis. 89</p> <p>Atrophia. 189</p> <p>Articulorum ægritudi- nes. 206</p> <p>Aurium morbi. 195</p>	<p>A</p> <p>uel post conueniāt. 88</p> <p>Balnea aquæ dulcis. 86</p> <p>Balnea aquæ frigida qui bus nō conueniāt. 88</p> <p>Balnea aquæ calida. 89</p> <p>Barba quibus & qua- re non contingat. 35</p> <p>Bilis flaua naturalis & non naturalis. 27</p> <p>Bilis praxina 28</p> <p>Bilis uitellina ubi gene- retur. 27</p> <p>C</p> <p>Cacochymia cur purga- tione non facile tol- latur. 109</p> <p>Capitis affectus ex ple- nitudine curatio. 13</p> <p>Capitis partes 36</p> <p>Morbi. 180</p> <p>Capitis quæ bona quæue mala constitutio. 33</p> <p>Cardialgia. 200</p> <p>Causa quid. 151</p> <p>Causa</p>
<p>B</p> <p>Balneorum triplex dif- ferentia. 86</p> <p>Balnea quæ ante cibum</p>	

INDEX.

Causa duplex.	155	tes.	ibid.
Collum	50	Elementa quomodo à	
Concoctio quid.	79	principijs differāt.	10
Corporis humani causa		Επιδημίας.	36
& principium	50	F	
Corporis partes dupli-		Facies.	36
ces.	ibid.	Faciei accidentia.	196
Cranei suture.	44	Facultates.	69
Crisis.	214	Febris quid.	161
Crus.	66	Februm prima diuisio.	
Cutis.	35		162
D		Februm simplicium tria	
Dentium numerus et e-		genera.	163
orum usus.	46	Febris ephemera du-	
Dentium affectiones.	197	plex	164
Dies decretorij.	219	Febris putrida.	66
Digit.	54	Febris intermittens du-	
E		plex.	166
Elementum quid.	8	Febris tertiana exquisi-	
Elementa nō nutriunt.	9	ta	167
Elementa humoribus		Producta.	ibid.
correspondent.	10	Febris ex flaua bile du-	
Elementa quatuor.	11	plex.	168
Elementa quaedā sibi mu-		Febris	169
tuo cōmunicant.	12	λυπία	ibid.
Elementorum qualita-		Febris hectica.	171

INDEX.

Febris hectica triplex.	122	Humores in sanguine quomodo discernendi.	24
Febris pestilens.	174		
Signa ipsius.	175		
Febris quartana.	170	Ilia.	65
Febres composita.	176	loxia	ibid.
Febris quotidiana	ibid.	Intemperiei quatuor differentiae.	20
Febris semitertiana.	177	Intemperantiae octo.	22
Frictionum sex differentiae.	83	Instrumentales partes quae dicantur	50
		Iracundia	133
G		Inedia quando aduersissima.	18
Gentiliū affectiōes.	104	Intestinorū numerus.	60
Gingiuarum calidiores affectus quae uena sci satollat.	113	Intestina quae uermes potissimū habeant.	61
		Intestinorum morbi.	201
H			
Habitus quid.	2	L	
Hemorrhogia unde fiat.	151	Labia.	41
Hemorrhoides affatim profluentes curatio.	113	Lien.	61
Hepar.	60	Lingua ex quibus constat.	47
Hepatis morbi.	303	Lippitudo	145
Humorum generatio ubi fiat.	24		
		M	
		Magnitudo inepta.	142
		Maras.	

INDEX:

Marasmus.	172	Morborum signa.	221
Malacia.	200	Morbi instrumentarij	
Manus organum orga=		qui dicantur.	149
norum.	54	Motus & quies.	41
Medicina ars & scien=		Musculi ex quibus com=	
tia.	2	ponantur.	67
Medicinæ definitio	1	N	
Medicinæ partes & dif=		Nasus	40
ferentiæ. 3. & 4		Nasi commoda.	41
Medici Rationales.	6	Nasi triplex figura. ibi.	
Medici Empeirici.	6	Narium actio.	153
Medici Methodici. ibid.		Narium morbi.	19
Membranae foetum in=		Nervorum paria septē.	30
uoluentes unde na=			
scantur.	65	Nutritio quādo fiat.	79
Methodus in morbis cu=		O	
randis obseruāda. 303		Oculorū compositio.	37
Morbus quid.	135	Oculorū pathemata.	189
Morbus omnis unde fi=		Oculorum signa physi=	
at.	161	onoma.	29
Morbus triplex. ibid.		Oculorum humores.	35
Morbi primi.	237	Oculorum musculi.	39
Morborum causæ variæ		Oculorum Nerui. ibid.	
ibid. & seq.		Oris passiones.	197
Morborum tempora.		P	
218. & 220		Paralysis.	187

Pectus

INDEX.

Pectus.	57	tio.	193
Penis.	63	Pulsus iuxta ætates.	294
Pepid &.	166	Anni partes.	ibid.
Physiologia.	3. & 4	Pulsus iuxta regiões.	295
Pituitæ species.	25	Pulsus post balnea qua-	
Pili unde generentur.	34	les.	296
Planeta.	316	Pulsus post edulia.	ibid.
Plenitudo quid.	96	Pulsus ex affectibus ani-	
Plenitudo uasorum ni-		mi	297
mia.	105	Pulsus ex inflammatio-	
Plenitudo quando fiat.		ne.	ibid.
ibid.		Pulsus epilepticorū.	300
Plenitudinis signa.	97	Pulsus pleuriticorū.	298
Purgatio fit duplici-		Pulsus hydropicorū.	301
ter.	101	Pulsus stomachi affecti.	
Purgatio quando præ-			300
ferenda, sanguinis		Pulsus ictericorum abs-	
missione.	102	que feбри.	301
Pulsus quid & eius cog-			
nitio.	287	Q	
Pulsuum causæ.	ibid.	Qualitates primæ	12
Pulsus duplex.	288	Qualitates secundæ.	19
Pulsuum æqualitas &		R	
inæqualitas.	290	Renes.	61
Pulsus ordinatus.	293	Renum passiones.	203
Pulsuum triplex muta-		Res naturales.	3
		Res nō naturales.	4. 77

Res

INDEX.

Res præter naturam.	Sudor.	271
ibid. & 135.	Symptoma quid.	147
Repletio et inanitio. 96.	T	
Respiratio pessima quæ	Temperamentū quid	14
S (286.	Temperata quæ dicantur.	15
Salubria quæ dicantur. 2	Tēperaturæ inditia.	16
Sanguis naturalis unde	Temperamentum insanis duplex.	17
& quale efficiat. 24	Testes.	63
Sanguis nō naturalis. ib.	Thorax.	55
Sanguinis essentia. 131	Thoracis morbi.	198
Sanguinem mittēti quæ	Tremor.	158
consideranda. 116	Tumores præter naturam.	206 & seq.
Sanguis quando ad animi deliquium detrahendus. 117	V	
Sanguinis mittēdi quantitas cōsideranda. 113	Vapores q̄ dicantur.	13
Sectæ medicorum. 6	Vasa præparantia.	62
Senectus qualis. 19	Venam aperienti quæ consideranda. 116	
Somnus & uigilia. 90	Venæ sectio quando purgationi præferenda & contra. 102	
Somnus diurnus cur noxius. 91	Venæ sectio in quibus fieri non debet, ibid.	
Somnia. 93	Venæ sectio quibus morbis	
Spiritus quid et unde. 75		
Sputa. 277		
Supuratio. 279		

INDEX.

bis conueniat.	104	Vrinæ & earum cognitio.	222. & seq.
Venæ sectio quando lata & quādo angusta fieri debeat.	128	Vrina quid.	222
Venæ tres insignes in brachio ubi percuti debeant.	55	Vrina ubi conficiatur.	ibid.
Ventris inferioris musculi.	59	Vrinæ color. 223. & seq.	
Vētriculi affectiões.	200	Vrinarum consistentia triplex.	230
Vesica.	62	Vrinæ ex intemperie	ibid. & 252
Vesicæ morbi.	103	Vrinæ quantitas.	231
Vomitio quas partes expurget.	99	Vrina in hydropse.	ibid.
Vterus.	64	Vrinæ passæ color.	227
Vteri pathemata.	209	Vrina proportionem minor.	232
Vterum gerentes quando purgandæ.	112	Vrinarum contenta.	ibi.
Victus administrandi quæ hora conuenientior.	79	Vrinæ hypostasis ubi conspiciatur.	233 & 237. & 239
Victus iuxta anni partem.	80	Vrinarum contentis tria consideranda.	ibid.
Vngues unde generatio nem et incrementum suscipiant.	67	Vrinarum contenta in senibus.	156
		Vrinarum contenta unde eleuentur	261

Vrina

INDEX

- Vrinarum contenta pes-*
sima *ibid.*
Vrinae optimae nota.
234
Vrinae contenta. *ibid.*
et seq.
Vrinarum contenta te-
nuia *235*
Vrinis innatantia. *239*

Vrinarum bullae. *240*
et *262*
Vrinae phrenesim indi-
cantes. *242*
Vrinae citra Hypostasim.
ibid.
Vrina febris tertianae et
quartanae. *244*
Vrinae febris quotidianae.
245
Vrinae in affectibus ca-
lidis quales. *246*
Vrinae et pulsus quid
indicient. *248*
Vrinarum matulae quae

- les esse debeant.* *249*
Vrinarum inspicienda-
rum locus. *250*
Vrinae iuxta aetates. *251*
et *254*
Vrinae mulierum. *ibid.*
Vrinae uirginum. *252*
Vrinae iuxta anni par-
tem. *253*
Vrinae dormientium.
255
Vrinae uigilantium ibi.

Vrinae quae febrium ini-
tijs male. *256*
Vrinarum praevidenda
quae. *257*
Vrinarum essentia. *260*
Vrinae crassae post tenu-
es quid indicent. *261*
Vrina male olens. *262*
Vrinae cordis pulmonis
et hepatis praeter
naturam calefacti.
264

Vrinae

INDEX.

Vrinæ in lateris dolori= considerandæ *ibid.*
 bus quales 265 *Vrinæ* sabulosa. 266
Vrinarum mutationes

FINIS INDICIS.

Errata quædam omiffa.

Pag.	192	lin.	13	colore.
Pag.	193	lin.	9	Rhyas.
Pag.	314	lin.	15	nostra ætate.
Pag.	89	lin.	25	exercitium.
Pag.	97	lin.	24	Plenitudinis causa.

MEDICAE

ARTIS THEORICA,

Libris duobus succinctè
comprehensa.

ATQVE MEDICINAE STV-
diosis apprimè necessaria.

BLASIO HOLLERIO

Viuariensi, Doctore Medico

Authore.

Medicinæ definitio & partes,
interpositis artium generibus,
primo hoc capite docentur.



MEDICINAM ET ARTEM

Medicam Autores indifferenter usur-
pant: eamq; uarijs modis definiunt,

Hippocrates enim πρὸςθεσιν καὶ
ἀφαιρέσιν, hoc est, adiectionem & subtractionē.
ubi quid scilicet deficit, aut exuperat.

Galenus Herophili secutus definitionem, scienti-
am salubrium, insalubrium & neutrorum pro-
tulit scientiæ uocabulo communiter & non propriæ

B. sumpto.

Lib. 1. & 6.
Collect.

sumpto. Quamuis ars & scientia esse possit, ~~ars~~
quidem ratione habituum, quatenus ex sepe iteratis
actibus nascitur. Est autem habitus qualitas compara-
ta ex crebris actionibus, quæ nostra assuefactione ac-
quiruntur. Scientia uero dicitur ratione causarum et
conclusionum, circa quarum demonstrationem uersa-
tur. Salubria quidem uocat ea, quæ presentem sani-
tatem tuentur restituuntque deperditam: morbosam
uero quæ contraria his sunt, ueluti lib. de sectis ad eos;
qui introducuntur, ostendit. Auerrhois porro Medi-
cinam artem dixit operatricem ex ueris principiis,
experientia, & ratione inuentam. Alij ex subiecto
& fine definiendam potius iudicarunt: ut sit ars quæ
circa corpora humana uersatur, sanitatis effectiua.

Et quoniam artes diuersæ sunt, earum quoque fines
diuersos esse oportet. Aliæ enim rem solum animo
cernunt, & θεωρητικαὶ à Græcis dicuntur, quæ in
sola natura rerum contemplatione suum finem ha-
bent, sine ulla corporis actione: ut est Physiologia,
quæ hominis naturam, corporum generationem, in-
teritum & mutationem ostendit. Aliæ ποιητικαὶ
dicuntur, quæ finem in agendo sibi statuunt, nihil post
actionem operis relinquentes, ut Musica. Aliæ νοη-
τικαὶ, quæ uel nouum opus aliquod efficiunt, ut ædi-
ficatoria, pictoria, fabrilis: aut iam factum, quod de-
inde uitium fecerit reficiunt, ut medendi ars, &
aliarum

MED. THEOR. LIB. I.

5

allarum effectricum. Sunt qui quartam artium differ-
rentiam adiungant, utpote $\chi\tau\sigma\iota\kappa\alpha\upsilon$, id est, acqui-
rentem: ut est aucupatoria, piscatoria & uenatoria,
quæ magis studio & labore quàm arte comparantur.
Sic & Comicus Poëta:

Quod pleriq; omnes faciunt adolescentuli.

Vt animum ad aliquod studium adiungant, aut
equos alere, aut canes ad uenandum, aut ad Phi-
losophos.

Ex supra dictis apparet Medicinam ex effectricum
esse genere: non quod nouum opus efficiat, sed quia
emendat ac reficit quod uitio quodam est depraua-
tum: sicuti Galenus lib. de constitut. artis med. indi-
cauit.

Medicinæ interea partes ob earum diuersitatem
diuersis sunt nominibus appellatæ: nam quæ sanita-
tis tuendæ præcepta tradit, conseruatricem: & quæ
morbos propellit, curatricem: Eam uerò quæ pro-
hibet ne morbi nascantur, iam malè affecto corpore,
præcautricem & præseruatricem nominant: sicuti
quæ conualescentibus adhibetur, restauratricem.

Medicinam porrò in tres classes seu differentias,
uiri qui dam celebres digesserunt.

Prima Physiologia dicitur, hæc septem res natu- Res naturales
rales (quæ corporis nostri constitutionem compa-
ctam & absolutam reddunt) indicat. Vt sunt, ele-
B 2 menta

4. BLASII HOLLERII

menta, Temperamenta, Humores, partes, facultates, actiones & spiritus: de quibus postea.

Res non naturales.

Altera Hygiene, quæ res non naturales docet: quæ quidem administratæ ut decet, corporis naturam incolumem seruare possunt: sin minus, alterare, & sanitatem demoliri. Huiusmodi sunt aër, cibus & potus, motus & quies, somnus & uigilia, inanitio & repletio, atq; animi affectus.

Res præter naturam.

Tertia Aetiologia nuncupatur, & est rerum quæ præter naturam corporibus nostris insunt: ut morbi causa, morbus & symptoma. Sed cum duplex sit medicæ artis & eius efficaciæ munus: alterum ut sanitatem conseruet: alterum ut profliget præter naturam affectiones: necessum est iam dictis partibus alteram interuenire, quæ signa doceat, alteram uero quæ methodum curatiuam contineat.

Merito igitur primariæ medicinæ partes quinque Græcis annumerantur: utpote φυσιολογικὴ, ὑγιαίνουσα, αἰτιολογικὴ, σκεπτικὴ, & θεραπευτικὴ.

Physiologia Theoricæ pars est, quæ res naturales continentur. Vniuersam siquidem hominis naturam indagat ac perquirat. De his Galenus lib. de Elementis, Temperamentis, Facultatibus naturalibus: de fœtus formatione, de placitis Hippocratis & Platonis, atq; de usu partiũ corporis humani sermonẽ habuit

Hygie-

Hygiene sanitatem tuetur, morbisq; aduenientibus occurrit. Ad hanc partem spectant libri Galeni de sanitate tuenda, de aliment. facultat. de cibis boni & mali succi.

Actiologia quæ παθολογικὴ etiam à Græcis dicitur, præter naturam causas & symptomata disquir. Ad hanc referuntur opera Galeni de morborum et symptomatum causis & differentiis, atq; locorum affectuum. Actiologia,

Simiotice prosperæ & aduersæ ualitudinis signa docet, hoc est, cognitionem præteritorum, inspectionem præsentium & futurorum prædictionem. Hanc partem Hippocrates in progn. & Gal. lib. de crisib. & dieb. decretorijs sunt prosequuti.

Therapeutice medendi rationem ostendit. Hæc in tres partes diuiditur, quas Græci διαίτητικὴν, φαρμακευτικὴν καὶ χειρουργικὴν appellarunt. Διαίτητικὴ, uictus ratione: φαρμακευτικὴ, medicamentis intus & extra corpus admotis, Χειρουργικὴ, manus industria auxilium præstat.

Huc pertinent libri Hippocratis de uictus ratione in morbis acutis: Item libri Therapeutices Galeni, & ea quæ Paul. Aegineta in epitomen contraxit.

DE SECTIS MEDICORVM.

Caput II.

Sectæ Medico-
rum tres.

MEDICORVM SECTAS, QVÆ dogmata, & placita dicuntur, ab initio usq; ad Galeni seculum tres fuisse legimus. Rationalem, Empiricam & Methodicam. Atq; ab ea, cui assipulantur & consensum præbent, appellatorem Medici retinuerunt, ut λογικὴ, hoc est rationalis, ἐμπειρικὴ, quæ sola experientia ducitur, & μεθωδικὴ, quæ ab effectibus solis curationum indicationem desumit.

Medici ratio-
nales.

Porro Medici rationales, qui dogmatici & uerè Methodici dicuntur, omnia ratione et scientia agunt: atq; uniuersam corporis naturam, constitutionem, morborum causas, signa & symptomata, atq; conuenientia remedia inquirunt: nec interea rerum utilium experientiam damnant, sed rationem in obseruatione adhibent, ob id eos meritò sequimur, ut qui ueram ac probabilem doctrinam, eamq; certa Methodo prosequantur. Huius sectæ princeps medicorum Hippocrates author fuit.

Empirici.

Empirici, citra morbi, & eius causæ notitiam obseruationi eorum, quæ frequentissime eueniunt, inniuntur. Sperant enim in multis particularibus experiundis, obiter quod conueniat inuentum iri, & fortunæ confidentia ad aliud absq; ratione transiliunt, si primis experimentis non responderit successus. Interea facultatis medicamentorum essentiam non posse cognosci

cognosci existimant: non secus atq; Sceptici philosophi, quemadmodum Galenus lib. 1. simpl. indicauit.

Atq; Empirico sat est, si laborantis particula symptomata exposuerit: ueluti tumorem præter naturam, renixum & pulsatilem dolorem, & tensionem ruboremue: aliaq; id genus, imponitq; nonnunquam breuitatis docendæ causa, cunctis simul collectis, unum nomen, sicuti iam comprehensis phlegmonem, ut Galenus lib. 7 & 13. Method. Med. scriptum reliquit. Huius autem sectæ principatum, Philinius obtinuit.

Dogmatici neglecta experientia solam artis methodum ad expellendos morbos obseruant, curationem interea hominum quodammodo æqualem seu communem iudicant, unde causam, ætatem, tempus, regionem consuetudinem, locum, affectum, uirium ægrotantis, seu naturæ seu habitus inspectionem, nullo modo conferre ad indicationem existimant: sed à solis affectibus remedij indicatione petita, curationem auspicantur: aiunt enim id quod est toto genere præter naturam ablationem sui indicare: & quæ luxata sunt (quæ uidelicet loci gratia præter naturam se habent) reponenda in suum locum. Sed id priuatorum cuiq; etiam patet quippe citra artificium membrum quod luxatum est, reduci in artus omnes iubet: præterea uerrucam tolli, & ulcus ad cicatricem duci, atq; aluum fluentem fisti ipsi tradunt: sed qua ratio-

ne id fieri debeat, incerti sunt : nec nisi in manifestis uersantur. unde suum dogma euidentium cognitionē describūt. Ad hæc omnes morbos ad duo genera contrahi posse autumant: astrictum uidelicet et fluens: et si quod fuerit tertium, ex utroq; mixtum esse uolunt. Huius sectæ principium ex Themisone ductum fuit.

Cæterū Empirici ex obseruatione experimētorum: Methodici uerò ex communi indicatione principij notionem statuunt. Nunc quæ ad huius nostri operis fundamenta pertinent, aggrediamur.

DE ELEMENTIS ET EORUM
qualitatibus.

CAP. III.

Elementum
quid.

Plato in philo-
soph.

ELEMENTVM IGITVR SIMPLEX est, & minima corporis alicuius pars Sic & Constantinus philosophus definiuit. ea tantum elementa intelligens, quæ aspectui nostro minime subiiciuntur. Nec enim inferior hic ignis, hic aer, hæc aqua, seu terra simplici qualitate sunt elementa: nec quantitate minima: quare elementa propriè dici non possunt. Sic & Plato unumquodq; inquit, elementum apud nos exiguum est, nec ullo modo syncerum & integrum, minimeq; sua natura dignam uim ferens. Ignis siquidem noster imbecillior est, quam
qui

qui in suprema mundi regione locatur. Ad eundem modum et reliqua elementa, quorum concordia, mundus, & corpus nostrum, ut Empedocles Pythagoreus testatur, constat: discordia uero dissipatur. At uero Galenus nos persæpè uti elementis uniuersalibus uel synceris, lib. 1. Element. testatur. Sicuti aqua, quotidie dum bibimus aut lauamur, & aëre qui nos undique ambit, dum illum in spirando attrahimus: igne etiam dum frigemus, ut caleamus utimur: uerum hoc loco de communioribus & minime synceris eum intellexisse mihi uerissimè uidetur: cum haud dubie profutendum instituat, ex terra, aqua, aëre et igne, tum stirpes, tum animalia cuncta gigni, ali, atq; incrementum suscipere. At uera elementa non nutriunt, nec ullam Elementa non nutriunt. gustui qualitatem offerunt, sicuti etiam lib. 4. de simpl. Medic: facult. testatur. In ipsis quidem solis, summas qualitates reperiēs, absq; ulla mixtura aut temperie. Etenim in igne summam caliditatem & siccitatem: in reliquis etiam reliquas qualitates prout sui cuiusq; natura postulat. Sunt qui tria elementa tantum adnumerent, aërem, aquam & terram. Ignem uero elementum esse negant propter immensam caliditatem: sic et res frigidissimas elementa dici nolunt. At Galenus sola elementa prorsus calida, aut frigida esse dixit, & quicquid præter hæc cœperimus ex his mixta esse tradit. Itaq; non amplius at soluta ratione syn-

cera, & à mixtione aliena reliqua quævis calida aut frigida dicuntur.

Elementa à
principiis
differunt.

Quo pacto aut à principiis elementa differant, lib. primo elementorum Galenus ostendit. Elementum, inquit, à principio in hoc differt, quod minimè sit necesse principia in eodem esse genere cum eis, quorum sunt principia. Elementa quidè ad idem semper genus pertinent. Simplex namq; qualitas compositæ, & simplex corpus, corporis compositi est elementum. Rursus ex principio oriuntur omnia: ipsum autem nulla ex re alia nasci potest. Nec enim esset hoc principium quod generetur aliunde. Atq; si semel extingueretur, nec ipsum ab alio renasceretur, nec ex se aliud curaret. Ad hæc elementorum numerus humoribus quatuor adæquatur: ita ut singula elementa singulis humoribus qualitate corresponsdeant: ut ignis, calidus & siccus cum sit, eiusdem naturæ humorem in corpore refert, utpote bilem flauam. Sic ær inferior sanguinis, & aqua pituitæ, atq; terra melancholicæ qualitates obtinent.

Quotiescunq; igitur aliquam uiderimus particulam frigidam siccam et densam, ea satis sit ad terram: memoriæ concipiendam. Satis etiam si humidum aliquid conspeximus rarum & fluens, ad contemplandam mente aquam. Calor quoq; animantis ignem nobis representabit: sicuti spiritus ærem in primis, ac subinde

binde ignem. Quatuor igitur humores nobis insunt, Humores quatuor corporei ex alimentorum interuentu.
 elementa in corporibus dicti, ex alimentorum interuentu: sanguis uidelicet, pituita, bilis tum flaua, tum atra. atq; moderata omnibus quatuor elementis temperies, ipsos conquiescere & minime morbosos fieri necesse est, unde & sanum corpus ab Hippocrate est dictum, cum mediocriter & uirtute & copia ipsa inter se elementa habuerit. Contra uero corpus dolere sentitur, cum aliquid minus aut maius fuerit: aut dum ab alijs semotum, unum aliquod in alienum quendam locum transcurrit. Sic Plato Hippocratem secutus, Quum enim, inquit, ex terra, igni, aqua, & aere, compactum sit corpus, horum praeter naturam excessus, defectusue, & ex eo loco proprio in alienum translati humores, seditiones ac morbos procreant.

Elementa igitur quatuor numero, etiam Metaphysicis habentur: ueluti essentia, esse, uirtus & actio. Elementa quatuor.
 Quatuor Mathematicis: signum, linea, planum, pululatio naturalis seu adulta forma. Sic & philosophis & medicis quatuor esse communis opinio tenet. Ignis, aer, aqua, & terra. Ex quorum mixtura, sed impari, (ut in nostris Comment: in lib. de nat. hum. secundum Hippocrat: etiam diximus) omnia generantur ac fiunt, atq; ipsorum naturas & qualitates suae cuiusq; essentia prodit. Elementorum porro aliae Elementorum secundae qualitates.
 sunt qualitates ab his quas diximus, uirium tamen inferiorum,

feriorum, ut tenuitas, raritas, splendor, leuitas, perspicuitas: & his contrariæ, crassities, densitas, obscuritas, grauitas, oppacitas.

Interea primas summasq; ipsorum elementorum qualitates uocamus, quibus efficacissima uis inest, ut igni caliditas, & terræ siccitas. Nam summa aëris & aquæ qualitas, etiam doctis ambigitur. Alijs siquidem summam humiditatem aëri, & frigiditatem aquæ: alij è conuerso tribuunt. Galenus & Aristoteles nunc hos, nunc illos imitantur. Sed Stoicis aer frigidus est. contra uero Aristoteli calidus magis censetur.

Ad hæc inter elementa quædam sibi mutuo communicant, ut ignis & aër, in calido: Ignis & terra in sicco: aer & aqua in humido: aqua & terra in frigido. Quædam secundum utramq; qualitatem aduersantur, ut ignis & aqua, terra & aer. At conuenientium facilior est transitus, ut ex igni in aerem sola humiditate superante. ex his, duo sursum naturaliter tendunt, ignis et aer: alia duo deorsum feruntur, aqua et terra: quò fit ut nõ congregiantur et multò minus misceantur. Porro aer hic infimus & nobis circumfusus, modo calefacit, modo refrigerat, modo humectat, modo exiccat, pro uaria regionum, partium anni, & præsentis status temperatura. Sed qui supremam regionem obtinet, calidum esse necesse est, propter ignis uicinitatem & motum continuum, & hic
elemen=

elementum proprie dicitur, ut qui sponte non corrumpatur, nec pabulo indigeat, nec euagetur: sed certam sedem seruans, ut ad generationem sit aptus. Qui uero mediam regionem habet, eum frigidissimū esse demonstrant mixta imperfecta, in eo concretionē genita: nubes, nix, grando, pluuia & huiusmodi. Veruntamen aer ipse in omnem excessum est alterabilis, non sua quidem natura, sed ex accidente, uaporibus scilicet (qui humores sunt extenuati) ex aqua in eum elatis. Est itaq; aer igni proximus præ alijs elementis, unde eadem natura utriq; propemodum inesse uidetur. Ambo siquidem caliditatis, tenuitatis, raritatis, leuitatis, splendoris, & perspicuitatis sunt participes. Ignis tamen longe actuosior, imò omnium elementorum efficacissimus, qui quidem in summo calefacit, postea exiccat. Estq; tota substantia & qualitatibus primis aquæ contrarius: sicuti terræ quatenus crassa, densa, grauis, & opaca. Interea tradunt sibi naturaliter elementa mutuas operas: nam terra aquæ beneficio in formam quamlibet redditur habilior. Ignis & aeris raritatem, leuitatem & tenuitatem: aquæ & terræ densitas, grauitas & crassities remorantur. Terræ & ignis siccitas, aquæ & aeris humiditate corriguntur. Similiter ignis caliditas, & interdum aeris: aquæ & terræ frigiditate temperantur. Sic de opacitate, splendore, & reliquis.

Cæterum

Vapores quid.

Cæterum aqua supra id quod refrigerat, humidissima est. Hæc enim siue feruens sit, siue refrigerata, nunquam humectandi facultatem deponit. Sicuti Galenus lib. 1. simpl. & in comment. de nat. hum. testatur. Postremo terra quam cætera elementa circumcurrunt, ut illi fecunditatem adferant, tanquam suspensa, sed fixa tamen ac immobilis manet: ne si huc uel illuc declinet, sursum deorsumue feratur, partium ordo confundatur. Primo exiccat, deinde refrigerandi facultatem obtinet. estq; solidissima: contra uero ignis & aer tenuissimi: aqua inter hæc media. Nunc ad elementorum commixtiones, quæ temperamenta dicuntur, accedamus.

DE TEMPERAMENTIS SEU
quatuor qualitatū commix-
tionibus.

CAP. IIII.

Temperamen-
tum.

COMMIXTIO ELEMENTO-
rum, seu quatuor qualitatū cōmunio, tempe-
ramentum dicitur: Cuius differentie nouem à
Medicis sunt institutæ: una quidem temperata, quæ
græcis εὐκρασία dicitur: octo intemperatæ: ut po-
te, quatuor simplices, calidū, frigidū, humidum, &
siccum, quæ quidem suapte natura & primario: aut
aduenti-

aduentitia qualitate seu accidente sumuntur. Et quatuor ex his compositæ, calidum & humidum, calidum & siccum, frigidum et humidum, frigidum & siccum. Porro quæ propria natura calida, aut frigida aut humida, aut sicca dicuntur (talìa enim sunt quæ ab initio ad finem usque suam facultatem seruant) quedam actu seu energia: idq; uel absolute, ut elementa uel excessu ut homo & alia quæuis animalia. Cum autē inter res eiusdem generis speciei fit comparatio, ut homo etate florens, est puero calidior, tunc non ad excessum propriè, sed ad symmetriam eiusmodi comparatio dicitur, quemadmodum Galenus ostendit. Gal. lib. 11. 117. simpl. cap. 11. Quin etiam ex animantibus ipsis inter se collatis, canis quidem est siccior, homo autem humidior, sed formicæ et apes his omnibus sunt sicciore: Sic & Leo quouis homine calidior. Cæterū temperata dicuntur, uel ad pondus, hoc est exquisita, & ad æqualem temperiem sine ullo qualitatū excessu, quæ quidem cogitatione uerius, quàm ratione discuntur. Talia potissimum sunt, cuius internæ manus & frontis, atque digitorū summitas: Vel ad iustitiam, hoc est, conuenientem & idoneam temperaturam, ad obeundas functiones à natura institutas, ut cerebrum ad iustitiam, temperatum dicitur, si quatuor qualitatibus non absolute, sed pro sua natura probe ualeat. Id quidem cognoscetur ex commoderata excrementorum deiectione,

etione, & quando à calidis, frigidis, humidis & siccis non leditur. Sicuti Galenus libro in quo totam artem summam perstrinxit, fecit manifestum.

**Temperatum
duplex,**

Temperatum igitur duplex est, absolute seu simpliciter, hoc est, respectu totius nature: & in singulis generibus, in quo uidelicet elementorum contrarietas mediocris existit. unde considerare oportet temperaturæ equalitatem omnibus temperatis animalibus & plantis non eam esse, quæ ab equali contrariorum mixtione constat, sed quæ pro sua natura probe suo munere fungitur. Ad hunc modum aliquid temperatum dicimus, etiamsi ab equalitate parum recesserit. ut aërem nobis circumfusum temperatum dicimus, etiamsi in alterutram partem paululum sit propensus. Præterea ex primis qualitatibus aliæ nascuntur: nempe mollicies, duricies, gracilitas & crassities: In quarum corpus ueluti medio constitutum est, quod ἐυσταγνόν Græci, nos quadratum dicimus. ex quo mediocritatem inter cuncta abundum & præcipientem, audacem & timidum, misericordem & inuidum obseruamus. Item prudentia, humanitas, affabilitas, amicitia & huiusmodi, optimæ temperaturæ sunt inditia. At uero quæ mediocritatem in corporibus transcendunt, intemperata dicuntur, & ab eo contrariorum quod exuperat, sortiuntur appellationem. ut calidum, frigidum, humidum, siccum, à calidi, frigidi, humidi,

**Intemperata
quæ dicuntur:**

imidi, sicci ceteras qualitates exuperantis dominio. Adhæc calor concoquit, & resoluit humores: frigus pituitæ concoctionem ac resolutionem digestionemq; impedit: humilitas materiam suggerit, quam siccitas depascitur & assumit. Et ubi calidum per se magis cum sicco in nobis abundat, adusto sanguine bilem utramq; gignit. Hinc corporis habitus gracilis, hirsutus & nigrior. Si uero frigidum magis cum humido exuperet, pituitam procreat, quæ morbos ut plurimum magnos, pro intemperatura, accersit. Porro quæcunq; partes cute sunt duriores, ueluti ossa, cartilagine, pili, ungues, ligamenta, ungulae, cornua, calcaria: in his siccum præualet: Quæcunq; uerò molliores, sicuti sanguis, pituita, seuum, adeps, cerebrum, medulla, tum spinalis tum altera: in his humidi plus est quam sicci. Temperamentum quod sanis inest, primo simplex, optimum & ex actissimum est sine latitudine. Secundo medium nulli uitio quod saltem sensu percipiatur, obnoxium. Tertio intemperatum, & nociuum, de quo ex postulari liceat, magis aut minus pro uarietate recessus à medio. Considerandum semper temperamenta similibus conseruari: alterari uerò contrarijs, ut Galenus lib. 6. Sanit. tuend. indicauit.

Huc etiam pertinent anni partes & ætatis ratio. Annus siquidem quatuor partibus constat, uere, æsta

C te, autumnus,

Temperamentum in sanis.

Anni partes quatuor.

te, autumno & hyeme. Ver (in quo sanguinis motus augetur) omnis excessus est in medio, unde temperatum dicitur: tametsi pars quæ hyemi est proxima frigidior quàm æstati percipiatur. Aestas calida & sicca cum sit, bilem flauam procreat. Autumnus inæqualis: alius frigidus & siccus, sed non absolute, in quo citius Melancholia gignitur. Hyems frigida & humida, in qua pituitosus humor acervatur.

Ætates.

Ætates præterea alij quatuor, pueritiam, pubertatem, iuuentutem & senectam. Alij sex: quidam septem esse dixerunt, sicuti in nostris commentis super Hippocrat. Aphorismis. indicauimus. Pueritia calida est & humida, unde magnum præ cæteris ætatibus augmentum suscipit. Est enim mortalibus ex calido & humido, nempe uiri & mulieris semine, & sanguine menstruo propagata soboles. Pubertas media & optima est ætas, sub qua comprehenditur adolescentia, Iuuentus quæ florens & uirilis ætas atq; consistendi tempus nuncupatur, calida est & sicca. Porro

Animosi qui & nimis ad actiones prompti.

qui calidiori sunt temperamento, siue naturali, siue acquisito, ij animosi sunt, & ad actiones plusquam expedit prompti. quemadmodum Galenus lib. 2. sanit. tuend. scriptum reliquit. Atq; calidis & siccis naturis siue à primo ortu, siue proprio, ut dixi, temperamento, siue à uictus ratione, immodico exercitio, uigilia, perturbationibus, loco & cæli statu calido &

do &

do & sicco aduersissima est inedia ac febrium paratissima causa. Præterea senectus frigida est & sicca: contra uero puerorum ætas calida & humida, ut iam diximus. Ad hæc calor qui pueris inest à calore iuuenū differt, quod ille multus, suauis, & magis habituosus: hic uero exiguus, siccus & minus suauis percipitur. At senes frigidi & sicci proprijs sunt particulis, humidi tamen respectu excrementorum quibus abundant. Horum etenim oculi lachrymis suffunduntur, tum nares distillatione manant, tum in ore illorū salinæ copia exuperat: tuſiunt, pituitam excreant, pulmones ac uentrem hoc humore esse reſertos ostenditur: tum etiam singuli articuli quodammodo muscosi sunt: nec tamen horum quicquam prohibet quin senum corpora iuuenum corporibus sicciora censeantur: sicuti Galenus lib. 2. Temp. indicauit. Porro senes nec probe concoquunt ob caloris penuriam, nec probè nutriuntur: partim ob siccitatem: partim ob alteratricis facultatis imbecillitatē.

Nunc de secundis qualitatib. quæ ex primarū temperatura seu mixtione gignuntur. Harum prima uisibilis dicitur, cui albedo, nigredo, rubor & cæterij colores subiacent. nam de singulis colorum differentijs (in quibus calida, frigida, humida & sicca reperiuntur) hic meminisse superuacaneum uideretur. In lapillis etiam ut physicis placet, temperatissima quatis

Qualitates secundæ, unde ſciantur

or elementorum permixtio quædam interior, nitor
rem parit exteriorem, sic in hominibus, alijsq; ani-
malibus ex humorum complexione, iucundam linea-
mentorum & colorum speciem procreat. Similiter
herbas & arbores innata radicibus & medullis foe-
cunditas, florum & foliorum gratissima uestit uarie-
tate. Internæ igitur perfectio externam procreat de-
centiam, siue ad corpus, siue ad animum referatur.
Altera gustatilis cui dulcedo, amaritudo, austeritas,
acerbitas, aciditas, salsedo, acrimonia, subiiciuntur.
Tertia tactilis, cui caliditas, frigiditas, durities, molli-
ties iudicanda igitur sunt differentia huiusmodi &
similes sensu, cui subiecta sunt, Vt ex lib. 1. simpl.
Galenii facile innotescit. Hactenus pro compendij
exigentia de temperamentis egimus, nunc de intem-
perie, quæ in toto corpore, uel eius partibus fit, pau-
cula subiiciam.

DE INTEMPERIE

CAP. V.

Intemperiei
Differentiæ,

INTEMPERIEI IGITUR
quatuor sunt differentia. Prima ipsius functio-
nis læsæ, Altera eius, qui hanc peperit, affectus.
Tertia causarum quæ ipsum præcesserunt affectum.
Quarta symptomatum quæ hanc necessario sequun-
tur. Cum enim in corpore quopiam sentiendi ui præ-
dito, inae-

dito inaequalitas quaedam suboritur, quanta fuerit in
 temperantiae magnitudo, tanta erit & molestia.
 quemadmodum Galenus lib. 2. de sympt. caus. osien-
 dit. Porro partes quae simplici intemperatura, nempe
 calida, frigida, humida uel sicca, afficiuntur (id enim
 fit natura uel accidente) aut sunt principes, ut cor,
 hepar, cerebrum, testes, uentriculus: aut non princi-
 pes, ut partes similes & organicae, atq; haec sim-
 plex intemperies dicitur, quae quidem diu permanere
 non potest, sed necessario sibi alteram statim asciscit,
 atq; equalis & sine materia dicitur, quae morbis mi-
 nimè est obnoxia. Quinetiam Galenus lib. 6. de sa-
 nit. tuend. aequalem intemperiem esse dixit, qua om-
 nes corporis partes (sed absq; dolore) afficiuntur:
 inaequalem uerò, quando in diuersis partibus differen-
 tes sunt intemperaturae, qua ratione corpus illud in-
 temperatum dicimus, cui cerebrum, uel Hepar, aut
 pars quaedam alia, calida uel frigida existit. Quod
 autem equalis intemperies nullo penitus dolore cru-
 ciet, per hecticas febres, & complures frigidos affe-
 ctus declaratur, ubi equaliter particula quasdam oc-
 cupant. Altera intemperies fit per coniugationem
 quae & composita dicitur. Haec inaequalis est, mor-
 bosa, & cum materia quae nonnunquam contraria
 qualitate corpus exagitat. demum omnis intemperies,
 si uehemens fuerit, uires deijcit, quod si exempli cau-

Intemperantia
ocho

sa frigus uicerit, frigidus affectus efficiet, iuxta excessus intemperantiam, eritq; cuilibet ita affecto ueluti acquisititia quædam natura: nullum siquidem corpus à sua ipsius natura tale afficitur. Ceterum octo intemperantias esse Galenus lib. 8. de comp. Med. secundum locos indicauit. Atq; hæ omnes aut secundum simplices et nudas qualitates gignuntur, aut accedente alicuius humoris complexu. Si enim ex primis quatuor qualitatibus inter se iuxta quadam ratione mixtis confusisq; elementis temperies oritur, necesse est octo omnino qualitatum excessu morbos in hoc genere excitari: simplices quatuor, singulis qualitatibus exuperantibus: totidem compositos, uictis inter se duabus qualitatibus excedentibus calore & frigore, cum humore & siccitate. Harum interea singula per contrarias qualitates, sunt ad mediocritatem reducendæ. Ex his omnibus quæ humida est, quomodoq; accidat, facillime curari posse Gal. lib. sept. Meth. explicauit. Duplicem igitur intemperiem esse, uel ex his quæ idem lib. secundo Temp. scripsit cognoscimus. quarum alteram intra sanitatem dicit consistere: cuius sufficiens nota erit, quando nulla animalis functio manifestè adhuc est oblesæ: alteram uerò morbi intemperiem nuncupauit, quæ à media temperie quam longissime abest. In primis itaq; & omnium maxime officit facultati, quicquid in intemperie est.

quam

quam morbum semper Galenus esse dixit. Neq; alia de causa potest intemperies primorū esse morborum causa, nisi quod commoda temperies fuerit corrupta. Porro intemperies calida & humida à sanguine excitatur: calida & sicca à bile, seroso humore, & pituita salsa: frigida & humida, à pituita: frigida & sicca à melancholia. Omnis igitur intemperies fit ex iam dictis humoribus dum excedunt. sicuti ex quatuor qualitatibus præter naturam auctis. ut dum corpus immodica exercitatione calefit, aucto calore etiam exiccat. Ad eundem modum animi perturbationes, præsertim in ijs quorum uitalis facultas est imbecillis, & corpus infirmum atq; ad dissolutionem propter mollitiem & raritatem expositum.

DE HUMORIBVS, QVI
materia sunt generationis.

CAP. VI.

ANIMANTIA SANGVINE PRAE
dita quatuor humoribus, tanquàm elemen-
tis constare omnibus receptum est. Sanguine pituita, atq; bile, tum flaua tum atra. Et quamdiu legibus conueniens est ipsorum constitutio, ex qua sanitas integra manet, eam conseruare, & nullis uacuationum generibus demolliri conuenit: Si uero inui-

cem cōmoueantur ac sese uellicent, exoriuntur morbi. Porro humores non in cibis, sed earum generatio intra corpus peragitur: tametsi assumptorum qualitate & quantitate, calidi frigidiue humores ipsi generantur. Sanguis itaq; naturalis ex quatuor succorum naturalium æquabilitate consurgit, non ut parem habeat omnium in mixtura portionem, sed pro ratione cuiq; conuenientem. Hic syncerus, dulcis, ruber & mediocris substantiæ existit. Si uero alterius cuiuspiã uitiosi succi commixtione inficiatur uincaturq;, non naturalis appellabitur: et hic inutilis est corpori alendo, unde pars quædam tenuior in cholera, crassior uero in melancholiam sæpius transit. Quo tandē humore sanguis inficiatur, id serum ostendit. Si enim sanguis biliosus sit, serum quoq; biliosum erit, & sic de alijs humoribus iudicandū. At hæc naturali sanguine quisquis abundat, moderatior, affabilior, simpliciorq; conspicitur. Præterea hic humor in uenis atq; arterijs ab hepate includitur, rubeus magis in uenis: flauior, tenuior & uaporosior in arterijs, ut etiã Galenus lib. de atra bile, & lib. 4. de usu part. Sed dum præter naturā adest, tum fiunt febres synochi, phlegmones, gangrinæ, dothiones, & huiusmodi. De quibus in tertia de curandis morbis particula diximus. Diffunditur quidem hic succus per uniuersas corporis partes, ut eas nutriat, ac refocillet: Pituita suapte
natura

Sanguis naturalis
 quales effluat.

natura frigida & humida, albiq; coloris existit, atq; qualitatis expers ut aqua. gignitur in uentriculo & intestinis ex cibis pituitosis seu phlegmaticis in prima concoctione: & in sanguinem mutatur per secundam digestionem, quæ fit in Hepate. Porro naturalis pituita dulcis & benigna est, cui sedes propria nulla attribuitur, nam omnia membra hoc humore sicut sanguine indigent. Etenim iuncturas nutrit & membra quæ multum mouentur, humectat, ne propter calorem qui prouenit ex motu exsiccentur. At pituita quæ in uenis est Galeni consilio euacuatione non indiget. Interea pituitæ quatuor species lib. 2. de diff. feb. statuit, quarum prima admodum frigida est, quæ uitrea dicitur, eò quod tum colore, tum substantia, uitro eliquato similis sit, quæ quidem si in locum calidum irrepserit, grauissimos inferre solet dolores: Si uero in colum intestinum delabatur, colicam procreat passionem. Atq; acrij dysmate tali humore euacuato statim sedatur affectus. Praxagoras uitreum phlegma eum uocat, quando uidelicet succus crudus cum lentore adest, quemadmodum Galenus lib. 4. sanit. tuend demonstrauit. Altera pituitæ, siue phlegmatis species seu differentia ea est quæ ab excreantibus sæpè exspuitur, & à sensibili dulcedine quam obtinet, dulcis & nullo modo frigida nuncupatur. Tertia est quæ inter exspuendum acida sentitur, minus

Lib. ij. facultas
natu.

Gal. lib. de ple-
nitud.

quam uitrea, magis quam dulcis, frigida: quæ si ab-
undet appetentiam, ob humoris crudi frigiditq; uitia-
um, deprauatam excitat. quæ quidem si modum ex-
cesserit, canina dicitur. Quarta species falsa dicitur,
quæ aut ob putrefactionem aut permissionem falsa
serosaq; humiditatis efficitur, sitibundosq; reddit.
Siquidem biliosi humores uentriculum calefaci-
unt & exiccant, unde sitis, quæ si immoderata sit in
tunicis uentriculi, uitiatos esse necessum est. Et qui
ab hoc humore febricitant, non rigent sed præhen-
dente accessione tantummodo horrent. Tandem pu-
trescens in uenis pituita, assiduam febrē in corporis
habitu procreat. Citra putredinem uero aquam in-
tercutem quæ λευκοφλεγμασίς dicitur: Si uero
in partem aliquam corporis pituita tenuis & uapo-
rosa defluerit, oedema. ita enim appellant tumorem
laxum, & doloris expertem. Sicuti etiam in libro
quem de morborum curationibus edidimus, est ostensu-
sum. At in cute & subiecta carne pituita uiriligi-
nem albam gignit. Similiter serosa substantia pituita
est, quæ si in habitu corporis citra putredinem redun-
det, eam intercutis specie quæ ὀσπυῖς uocatur,
generare solet. Et si extra uasa putruerit, febrem in-
terpolatam: si uero in uenis continuam, ut iam dixi,
procreat. In cute porro phlyctenas, hoc est pustulas,
nec non pruritum excitabit. Ita accidit in quibus sin-
gula ex-

gula excrementa redundant. Cæterum pituita natura-
 turalis, segnes, somnolentos, cogitabundos, meticulo-
 lis.

fos, carnosos, cito canescentes reddit. Et qui in otio
 degunt, pituitosum succum colligere solent. Omnis
 igitur pituitosus humor dulcis est, seu qualitatis ex-
 pers, acidus uel salsus, crassus, uiscidus, aut dissipatus
 facilis, quemadmodum Galenus lib. 1. aliment. facult.

ostendit. Bilis flaua quæ pallida & amara dicitur ca-
 lida est, & sicca quantumuis aspectu humida sit, &
 ex sanguinis seruire generatur, atq; ignis propieta-
 tem remisse obtinet, nec solum in iocinore, uerum eti-

am in toto uenoso corpore procreatur. Quæ si natu-
 ralis sit est ueluti sanguinis spuma, cuius color rube-

us & clarus apparet, sitq; ualentior calore extrinse-
 cus adueniente. Est & altera bilis flaua quæ non na-

turalis dicitur, quando scilicet alteri alicui humori
 admiscetur, sicuti phlegmati. quod si fuerit subtile,

tum bilis ipsa citrina dicitur, quæ amara est. Si uero
 tale phlegma crassum fuerit, uitellina quæ à flaua bi-

le incrassante progignitur. quemadmodum palida
 aqueam quandam substantiam accipiente, Vt in 6.

Epid. Galenus, & lib. 2. facult. natural. indicauit.
 Bilem uitellinam ita nominant eò quod ouorum uitel-

lis, tum colore, tum crassitie sit adsimilis. Hæc in ex-
 tie sis morbis porracea fit: & ex hac æruginosa: ex

qua deinde cerulea: quæ cum ad extremum torretur,
 tum de-

Pituita natura-
 lis.

Bilis flaua natu-
 ralis

Bilis flaua non
 naturalis.

Bilis uitellina.

tum demum in atram bilem conuertitur. Præterea bilis siue pallida siue uitellina, in uasis generatur.

Bilis praxina. Praxina uero quæ & porracea dicitur, in uentriculo ex ciborum corruptela & alimentorū cruditate, sicuti ex betis, cepis, brassicis & huiusmodi. Porro flauæ bilis multitudo (cuius lingue amarulentia indicium est) si in uenis putrescat, ardentes febres: si per uniuersam corporis habitum transfusa sit citra putredinem, regium morbum, Græci *ἰκτερόν* nunciant, gignit: cum putredine uerò setrem tertianam. Quod si parte aliqua congesta sit, herpetem. Insuper bilis facit iracundos, ingeniosos, acutos, leues, macilentos, optimè concoquentes. & ex abundantia sitim & nauream prouocat. At quos multus labor exercet, ij biliosum uel melancholicū humorē, illum æstate, hunc autumnus generare solent. quemadmodū Gal. lib. 4. sanit. uend. docuit. In summa biliose intemperantiæ fere magna comes est corporis extenuatio.

Bilis atra. Bilis atra frigida est & sicca, terræ naturā obtinens, ex sanguine crasso & adusto. Augetur in florente ætate, quæ uigori succedit, & in ea sanguis torretur, ac uritur. proinde bilis atræ copia acceruat, & in autumnus potissimum exuperat: quæ duplex est, naturalis utpote inculpati sanguinis sex seu residentia: non naturalis uerò sanguinis boni redundantia: cuius sapor est acris & asper. Recipitur in liene, cui alimonia præ-

niam præbet. Sciendum tamen si bilis atra in uenoso genere putrescat, febrem acciduam gignit, si in corporis habitū transmissa sit, & citra putredinem, tum Elephantiasin procreat: Si uerò cum putredine, febrem quartanam. Quod si in parte aliqua corporis collectus sit hic humor, carcinoma: si in cute & subiecta carne, nigram uiriligniem generat. Cenum bilis atra subdolos, tacite iracundos, tristes, timidos, auaros, & perfidos reddit: Stomachi tamen actiones adiuuat, ut quæ appetitum excitet, si acri exuperet qualitate. Sed quando dysenteriam excitat, ex Hippocratis sententia mortifera est. Ex bile uerò flaua non omnino lethalis: pleriq; enim ex ea seruantur. Aph. xxiii. lib. iij.

Hæc de humoribus, quorum gratia animalia quæq; constant, breuiter sumus prosecuti. quiquidem uiscosi crassiue præter modum si fuerint, minime uacuan- di, donec fluidos, hoc est, tenues fecerimus, & nullius lentoris participes, meatusq; per quos purgatio futura est ad apertos, sicuti Gal. in lib. quos purgare oporteat demonstrauit.

DE PARTIBVS SEV MEM-
bris corporis humani.

CAP. VII.

NUNC CORPORIS HVMA-
ni (cuius sanguis & genitale semen primor-
dia

Corporis hu-
mani partes du-
plices.

Instrumentum
in corpore
quid.

da sunt) partes saltem præcipuas, & huic instituto
necessarias recenseamus. Harum enim notitia ad ua-
letudinem & mores plurimum confert. Itaq; parti-
um corporis humani figuram, numerum, situm, &
actiones cognoscere oportet. Partes autem quædam
sunt similes, & quædam dissimiles seu organice.
Similes porro quæ Græcis *ὁμοιογενῆς* dicuntur,
sunt quæ in similes sibi partes diuiduntur, & separa-
te retinent nomen totius, Vt quælibet pars ossis, car-
tilaginis, carnis simplicis, sanguinis & reliquorum
humorum, appellationem totius retinebit. dicuntur
etiam primariæ & simplices partes, seu corpora sim-
plicia. Organice uero, quæ Græcis *ἑτερογενῆς* di-
cuntur, ex similaribus constant, & totum corpus com-
ponunt ac constituunt: Vt sunt caput, thorax, uen-
ter, humerus, brachia, manus, digiti, pedes, & id ge-
nus reliqua: quorum partes dissectæ ac separata mi-
nimè totius partis nomen retinent. Hæ partes com-
positæ & instrumentales etiam dicuntur, siquidem
instrumentum est quod actionem perfectam potest ede-
re, ut oculus uisionem, crus incessum, lingua loque-
lam: sicuti Galenus lib. 1. Meth. Med. demonstrauit.
Ad eundem modum muscoli & nerui, tum instrumen-
ta tum partes animalis sunt. Cornea uero & tunica
rhagoides, & arechnoides atq; huiusmodi oculorum
particulæ sunt, non autem instrumentum. Porro par-
tium si-

tium similarium duplex est differentia, alia cuius uniuersae particulae eiusdem sunt speciei, & in diuersarum specierum partes diuidi non possunt. Hæ quidem sunt primæ & ueræ similes, quas Galenus primæ & simplicissima hominis elementa uocauit, cuiusmodi sunt caro, os, adeps, cartilago, neruus, ligamentum, fibræ, membranæ, cutis, unguis, medulla, & id genus. Altera earum est partium, quæ similes & simplices sensus iudicio dicuntur, quæ in diuersæ speciei particulas diuidi possunt: ut sunt uenæ & arteriæ, quæ ueræ simplices & similes non sunt, quæ quidem ex fibris & membranis teste Galeno, sunt conditæ. Ex instrumentarijs seu organicis partibus (quarum sanitas in figura, numero, magnitudine, compositione similarium consistit) quatuor sunt præcipuæ & ueluti fontes uirtutum nostrum corpus regentium: cerebrum, cor, iecur, & testes: quibus tanquã præsidibus aliæ quedam partes famulantur, sicuti nerui cerebro, arteriæ cordi, uenæ iecori & uasa seminaria testibus. Hinc cerebrum animale, cor uitale, iecur naturale, testes genitricem uim obtinere medici censuerunt. Sunt & aliæ partes quæ ui quadam à principijs mutuata seipsas gubernant, ueluti uenter, intestina, lien, renes: Aliæ sunt quæ nec regunt, nec reguntur ab alijs, sed insitam uirtutem habent: ut membranæ, pinguedo, glandulæ, os, caro sim

Partium similarium duplex differentia.

caro simplex, ligamenta, cartilago: Alia neq; quicquam suggerunt, neq; ab alijs mutuuntur, neq; ex se ingenitas vires habent: sed solū generantur, & crescunt, non quidem in omnem dimensionem, ut reli-

**Quæ longitudo
ne solum in cor
pore crescant.**

quæ corporis partes, sed in longitudinem duntaxat, ut sunt pili, & ungues: Alia porro ingenitas simul & aduentitias vires habent, cuiusmodi reliquæ omnes corporis partes, non secus atq; ventriculus, renes, lien, uterus. Postremo cerebrum, cor, iecur, testes, caro, tum simplex, tum composita, & reliquæ uniuersi corporis partes, alimentum trahendi, continendi, concoquendi, & superuacuum exernendi, à iecore possident. Cerebrum quidem per neruos sentiendi & mouendi potentiam habet: Iecur uerò per uenas non solum nutritoriam uim, sed & materiam qua uniuersum corpus alitur exhibet. Ceterum cor per arterias uitam & spiritum uitæ tutorem transmittit. Testes genitalis seminis procreandi facultatem per uasa seminaria recipiunt ac deinde præparant.

Capitis constitutio.

Nunc hominis totius compositionem ex quatuor partibus summis constitutam, utpote in caput, thoracem, uentrem & artus doceamus. Caput igitur quod Græcis κεφαλή est, supra reliquas corporis partes tanquàm artem inter reliqua urbis moenia eminare cernimus, & partes animales continet, cuius constitutio, magnitudine, paruitate & forma conspici-

citur.

citur. Magnitudo enim si ad insitæ uirtutis robur, multā atq; optimā materiam tribuit, commendatam habet notam: sin propter solam materiæ abundantiam minime bonam: quod ex crassis spiritibus & pituitosis succis (ex quibus ignauia) hæc magnitudo sæpe contingat. At paruum caput uitiosæ constitutionis cerebri propriū est inditium, propter defectum materiæ. Siquidē caput exiguum, exiguā quoq; cerebri substantiam necessario habet, angustiq; erunt ipsius uentriculi meatus, & paucus aderit spiritus: unde uirtus animalis, (quæ in motib. & sensibus dominatur) præualere non poterit, tum propter spirituum penuriam tum cerebri imbecillitatem: quo fit ut qui parū caput gerunt, uersuti sint. Sed capitis optima ductio hæc est, ut concinnam magnitudinem & formam ueluti Sphericam seu orbicularem habeat: atq; totius corporis proportioni & symmetriæ respondeat, probeq; ac perfecte, (quod præcipuum est) edantur actiones. Porro capitis partes uel sunt externæ, uel internæ: Externæ quidem uisui patent, ut sunt capilli, cutis, uertex, occiput, synciput, facies cum suis partibus, nimirum fronte, supercilijs, palpebris, oculis, naso, malis, genis, mento: quibus adiunguntur aures & tempora. Internæ uerò non conspiciuntur nisi post dissectionem: cuiusmodi sunt caluaria, membrana, sutura, cerebrum cum suis partibus

Capitis partes
tertiæ

D & uenis:

Pili modo gene-
rentur.

¶ uenis, reticulum, uermiformis & huiusmodi.

Pili quos Græci *ἰγυχαῖς* uocant duplicem genera-
tionē obtinent à conditoris primi providentia et loci
natura, ut Galenus lib. 11. de usu part. corporis hu-
mani docet. frigidi sunt & sicci, excrementitijq; na-
tura. Atq; ex locis humidis et molliorib. exeuntes plu-
rimi sunt incrementi, ut in capite, axillis & obscœnis
partibus. Qui uero ex duris atq; aridis, exiles sunt
ac nullius incrementi. Siquidem humida & mollis
materia facilius quàm dura & sicca in fumum & ua-
porem resoluitur, atque tum pili minori negotio
cutem perforant. Et licet crassa & terrena materia
ex qua generantur adsit, non proinde suscitabuntur,
nisi prius fuliginosa & adusta fuerit. Præterea pili
magna ex parte nigri sunt, uel flauij, uel albi, rufiue
coloris: idq; pro humoris quem secum è profundo
abundantiam & fuliginis adustionē, sicuti ex uapo-
re adusto ui caloris & temporis spacio, quo in mea-
tibus consistit: & tum nigri fiunt: Flauij uerò ex mi-
nori adustione: At ex pituita albi producuntur: sicuti
rufos, flauos, ex pituitosa biliosaq; fecis media qua-
dam natura prouenire iudicamus. Crispi uel pro-
pter siccitatē temperamenti, uel meatuum in quibus
radicantur tales fiunt, atq; ueluti igni propius admo-
ti in se retorquentur: quemadmodum Galenus lib. se-
cundo Temp. ostendit. At uerò pili qui mento suc-
crescunt,

crescunt, ex calidi humoris affluxu à prioris capitis
 parte non secus ac testiculi generationis causam tra-
 hunt. Mulieres, Eunuchi, & puelli barbam non ha-
 bent, propter inualidum roborem, & frigiditatem
 inmodicam. Menstruorum interea suppressio, bar-
 batulas mulieres nonnunquã effici, Aristoteles scrip-
 sisse uidetur. Quod autem inferior mandibula sit pi-
 losior rationes non sunt obscuræ. Illuc enim plus hu-
 moris propter frequentem motum attrahitur. Dein-
 de iunctura eundem humorem recipiens laxior est,
 postea nonnihil cutis raritas efficit. Physiognomi ali-
 quid sub barba, ut ex alijs corporis partibus colli-
 gunt, ut si densa, rara, proluxa, hirsuta, nigricans, fla-
 ua & aliorum colorũ. Cutis quæ Græcis *σέλα* Cutis
 dicitur, uniuersam corporis molem contegit, ex mi-
 nutissimis neruorum fibris, uenis & arterijs contex-
 ta diciturq; ab excoriatione: siquidem *σέλα* dæ-
 ραρις, id quod Latinis excoriare sonat. Ea tamen
 in manu interna, facie, fronte & planta pedum uix
 excoriari potest, ob musculosam propaginẽ. Et quæ
 capiti inest dura, densa, sicca, & crassa existit. Ea tan-
 dem saluberrima cutis est, quæ raritatis & densitatis
 excessum declinat, quandoquidem rara cutis à quali-
 bet extrinsecus occasione facile læditur: densa uerò
 corporis transpiratum prohibet, sicuti Galenus lib. i.
 sanit. tuend. indicauit. Porro cutis, præsertim faciei,

D a fix

Corporis tem-
perati ex cute
notio.

si ex albo & rubro colore constet, corpus tempera-
tum ostendit. Ceterum summa cuticula seu superfi-
cies efflorescens nullius sensus est particeps & *ἐπι-
δερμὶς* dicitur, quæ alterius tantum gratia adstute-
lam superposita est.

Capitis partes
externæ.

Sed nunc de partibus capitis agamus. Vertex igitur, *ῥομφή* Græcis, summa capitis pars est, propter flexum capillorum circularem. Occiput seu occipitium posterior capitis pars à uertice ad ceruicem, ubi cerebellum, quod supra cerebrum flauescit & in primam uertebam desinit. Synciput in anteriore capitis parte super frontem ad uerticem usq; situm est. Facies anterior pars à syncipiti ex Aristotelis sententia, uel à supercilijs secundum Galenū, ad collum usq; porrecta. Frons pars est depila, quæ interuallo syncipitis & oculorum medio concluditur, ex qua solent physiognomi, mœroris, lætitiæ, seueritatis, & clementiæ uitiorum & uirtutum sumere inditia. Supercilia enim quæ inam frontis partem concludunt, oculis pro uallo superponuntur: quorum pili æqualem magnitudinem seruant. ex quibus etiam Physiognomica indicia desumuntur, ut uidere licet apud Aristotelē & Plinium, Palpebræ tunicae sunt quæ utrinq; oculos tegunt, quarū superior duobus musculis pro arbitrio mouetur: altera immobilis per se cernitur: Pili autem qui in earum extremitatibus sunt, cilia Latinis,

tinis, Græcis uerò Βλεφαρίδες dicuntur, ex quibus etiam, ut de supercilijs dictum est, Physiognomica desumuntur diuinationes.

Oculorum (qui sub palpebris includuntur) ex tribus humoribus et quatuor tunicis, et alijs quibusdam subseruientibus particulis, integram compositionem natura effecit. Prima tunica ὤπιωεφυκῆς Græcis, Latinis uero adnata et coniunctiua uulgo dicitur, eò quod alijs quæ cum oculis communicant tunicis extrinsecus adnascatur: originem trahit à peritoneo, ex ea qua frontem tegit parte. Altera est κερὰ τοῦ ὀφθαλμοῦ, hoc est, cornea, quæ alba est, solida, neruacea, et nullo modo fissilis, ex crassa mennis oritur habens. Hanc duram natura genuit, ut melius oculum quem totum ambit tueretur, sit tamen ante pupillam tenuior, ut per eam facilius rerum spectra introferantur: lucida quoque est et albuginem humorum concludit, ut spiritui splendorem præbeat. Tertia ῥαγοῖς cæruleo colore donata, in medio perforata est, ubi pupillæ oculi circulus insignitur, et per rectas lineas uisio fit, atque cristallinum humorem cui reliqui (nimirum candidus et uitreus in uidendi functione famulantur) circumuestit, uulgo uuea et acinea dicitur. Porro ῥαγοῖς foramen quatuor modis à propria natura immutatur, utpote dum auctum, uel imminutum, diuulsum aut ruptum existit,

Oculorum compositio.

D 3 atque int-

atq; incrementum siue foraminis amplitudo semper
 bonæ uisioni incommodat, siue id ab utero protinus,
 siue postea contigerit. Imminutio uerò si in utero con-
 tracta est, acutissimam efficit uisionem: quæ uerò po-
 stea accidit mala est. Reliqua autem pathemata siue
 in conformatione, siue postea cum quibus genitus est
 contigerint, uisioni incommodum notatu dignum in-
 ferre possunt, quemadmodum Galenus lib. 1. de sympt.
 caus. indicauit. Ultima ὀφθαλμικός tenuissima
 tunica est, araneæ telæ instar, unde araneæ etiam
 reticularis dicitur: candida et fulgens, atq; omnium
 leuissima, pupillæ imaginem ueluti in speculo refert,
 et humorem quem uitreum appellant continet. Sunt
 qui plures oculorum membranas adnumerent, quæ
 tamen uel parum apparent, uel subtilius dissecantur,
 iudicenturq; reliquarum partes. Humores interea tres
 iam dictis tunicis, ut dictum est, comprehenduntur.
 Primus ὀφθαλμικός, id est albugineus, ab albumi-
 nis ouorum similitudine intra corneam excipitur. Ex
 hoc enim humore lachrymæ defluunt, tum à frigore
 tum ab alia re urgente, plus minusue, pro maiori aut
 minori copia à cerebro. Secundus ὕδαρ, hoc
 est uitreus quod uitro liquefacto similis sit, intra ara-
 neam. Tertius κρυσταλλικός. Humor hic cristalli
 instar pellucidus est, à quo uidendi facultas perficitur
 intra uueam, Ceterum color in oculis aut multus, aut
 paucus,

Humores oculo
 tres.

paucus, aut mediocris apparet. Multitudo siquidem splendoris in humore puro ac paucos oculos caescos reddit. Contra paucus splendor in multo & impuro humore nigros. Mediocritas uero tum in quantitate, tum in puritate, horum medios efficit: quemadmodum Galenus & Aristoteles ostendunt. Ad haec uariant in multis oculi, siquidem alij magni, alij parui, alij mediocres, uel nimium eminent, uel abditi sunt, uel medio modo se habent. Similiter motu, nam quidam frequentissime nutant: alij intenti manent: alij medium inter alterutrum seruant. Qui hi uel illi portentant, ex Physiognomis poterit disci. Verum eque-
dem indagine coniectura talis uidebitur: ut uigilantibus, apertis, lucidis, mediocribus, atq; rotundis admodum ex ipsa proportionem animus metiendus, integer & sanus. Sunt praeterea oculorum musculi sex: unus sursum, alter deorsum & duo in latera ducunt: reliqui uero circumagunt. Sunt & nerui optici seu uisorii, ab anterioribus cerebri uentriculis procedentes, duo mollissimi, quibus duntaxat manifestum foramen natura concessit, ut sensibilis spiritus à cerebro in oculum transferatur. Et cum alteruter oculorum clauditur, alterius pupilla dilatatur, & is spiritus antea ambobus particulatim distributus: in unum deriuatur, & facultate eo modo duplicata, fit uisus acutior. Sicuti Galenus lib. 1. de sympt. caus. & decimo de usu

Oculorum signa physiognomica.

Oculorum musculi & nerui.

part. ostendit. Duo canthi seu anguli oculis utrisq;
dantur: magnus ad nasum paruus uerò è regione di-
rigitur. præterea figura satis apparet, est enim globo-
sa ut facilius incommoda quæ extrinsecus adueniunt
declinent. Mathematici qui optice docent, addunt.
Si oculus non esset rotundus, quantitati capiendæ im-
par esset. Sunt & in oculis uenulæ quædam, quæ si
amples conspiciantur, eorum temperaturam calidam
esse, sicuti motus creber indicant.

Nasus

Nasus ea faciei pars est, quæ à superciliarum con-
finio oriens olfactum recipit, cuius partes duæ maxi-
mæ sunt, quas Græci ῥίνας, Latini nares uocauere,
qui quidē duobus foraminibus intercepto quodā me-
dio diuiduntur. Exteriores partes, pinnulæ seu alæ
dictæ sunt, quæ suis musculis mouentur. Porro na-
sus duobus ossibus constat, in quorum summo est fo-
ramen, per quod à cerebro fit excretio, & quæ redun-
dant excolantur: constat etiam cartilaginibus, acce-
dit & modica caro, in qua sunt duo muscoli, qui
introrsus claudunt. postea neruus quoq; adest à ter-
tia neruorū syzigia, item uenulæ quædam & in eius-
dem extremum usq; disperguntur. postremo cute te-
gitur, qua tota facies. Eius generalis figura præter
longitudinem triplex est: aquilina in qua caliditatis:
sima, in qua frigiditatis: & media in qua mediocrita-
tis indicium pro temperatura physiognomi osten-
dunt. *fl.*

**Nasus triplex fi-
gura.**

Aunt statuuntq; præterea naso hæc insunt commoda
 ut per illum ad cerebri confirmationem odores hau-
 riantur, tametsi Galenus priores cerebri uentriculos
 olfaciendi instrumenta esse dicat, quandoquidem odor
 ad nasi carunculas delatus, illas subit ut olfactus uerus
 fiat. Nec solum olfactus sed omnium sensuum exte-
 riorum uirtutem esse in cerebro propter neruos est
 iudicandum. Alterum commodum ut per collatori-
 um superflua & noxia à cerebro excernat. Tertium,
 ut feruidus cordis ex assiduo motu calor mitigetur, et
 ut fumi noxij excludantur. Genas à malis Aristote- **Genæ:**
 les non discernit. Est tamen mala, faciei tumulus
 proximæ infra oculos, in pudore suffusus rubescens:
 Genæ uerò oculis propinquiores. Bucca inde succe- **Bucca.**
 dit quæ infra malas situm habet, & est concauitas in-
 terna, quæ spiritu à pulmone reuocato, & oppressis
 labijs retento inflatur. Labia seu labra dicuntur **Labia:**
 quæ dentes extrinsecus obducunt atq; hilaritatem &
 risum indicant. Rursum linea seu fovea quæ in riden-
 tis facie apparet, ueluti corrugatio quædam, Gelasius
 dicitur. Maxillæ seu mandibulæ ad mentum usq; **Maxillæ:**
 descendunt, suntq; duo illa ossa in compagine acu-
 minata quibus dentes infixi sunt. Solent physiogno-
 mi ex labijs sua prognostica elicere, ut si tenera &
 mollia, generositatis & acuminis ingenij: Si uero
 crassa & dura insipientiæ & obtusi intellectus si-

- Mentum** • gnum esse perhibent. Mentum sub inferiori labro, figura oblonga & orbiculari prominet & in medio notabilis lacuna quædã interdum apparet, quæ amantis & luxuriosi est indicium. Aures capitis organa sunt quibus enunciata & sonos sine respiratione apprehendimus. Harum utramq; Aristoteles in duas partes distinguit, superiorem uidelicet & inferiorem, Superior partis totius nomen retinuit: inferior uerò *λόβον*, alij *λόβιον*, latinis uero ima auricula, dependens & pinna passim nuncupatur. His accedunt alula uersus tempora & semicirculus acuminatus, sub cuius mucrone subiacet chonchula tum exterior, tum interior. Insuper auris ex cartilaginibus & modica carne est constructa. Eius figura introrsum cochleæ similitudinem habet, usq; ad illud os quod à duritie petrosus dicitur, in quo fit sonitus. Ibidem enim membrana ex neruo cui facultas auditoria tribuitur est expansa. Est præterea neruus auditorius, qui non aliter suam ob id functionem atq; in oculo crystalloidis humor. Hæ capitis partes quæ inter oculos & aures sitæ sunt *ἡρόταφοι* Græcis, Latinis uero tempora dicuntur, ubi nerui & arteriæ quædam insunt, quibus à cerebro in reliquas partes spiritus animalis diffunditur. Spiritus etiam uitalis à corde proficiscens in caput defertur, quo fit ut hac in parte isti facile intereant, utpote cum obstructis meatibus spiritus occludantur.

cludantur, nec præstare ualeant officium. Porro tempora dicuntur eò quod annorum seu temporum notæ hinc posse colligi pleriq; existimarunt: & ijs quos ad senectutem ætas perduxit magis excauantur. Ad hæc temporū musculi apud Galenum προταφίται dicuntur. Ossa duo utrinq; ad aures sita λιθοειδῆ: hoc est, petrosa seu Lapidosa. Hactenus externas capitis partes recensuimus, nunc eadem ratione internas prosequamur. Postquam igitur cutis externa quæ propter capillorum segetem crassa est, excoriata anatomicè fuerit, mox occurrit tunica quæ ex duriori cerebri inuolucro ducit originem. Hæc totum cranium contegit, unde περικρανιον, καὶ περιόσσεος, id est circumossea dicitur. Et ubi ad oculos peruenit adnata seu coniunctiua nuncupata est, eo quod extrinsecus alijs membranis oculum constituentibus, ut dictum est, adnascatur. Est autem hæc membrana nervosa totam caluariam comprehendens, quæ quidem per suturas ex inuolucris cerebri prodit, ex qua etiam nervosæ membranæ complures deriuantur, sicuti quæ costas succingit, quam Græci πλευγῶν nominant, septū transversum, peritonæum & alia id genus. Sub hac altera est tunica quam ποδιόσσεον nunc diximus, osibus cunctis commune tegumentum. hæc si radatur nuda caluaria sese exhibet. Cæterum ex pericraneo uenæ & arteriæ oriuntur quæ

Corporis partes internæ.

untur quæ suturas subeunt, ut cerebro alimoniam de-
ferant. Cranium insuper omnes particulas capitis
comprehendit. Est autem os illud rotundum quod
Cranei suture galeæ figuram refert, constat suturis communi con-
sensu quinque, tametsi non in omnibus idem semper
numerus inueniatur, sed tantum tres, prima $\sigma\epsilon\phi\alpha\nu\epsilon\acute{\iota}\alpha$
id est, coronalis quæ per synciput utrinque ad tempora
porrigitur. Altera $\lambda\alpha\mu\beta\omicron\lambda\omicron\epsilon\acute{\iota}\delta\iota\varsigma$, quæ à summo
capite, sic enim eam appellant, quod λ litera figu-
ram referat. Tertia $\omicron\beta\omicron\lambda\iota\epsilon\acute{\iota}\alpha$, id est, sagittalis à medio
huius posterioris per uerticem usque ad anteriorem me-
diā pertingit, & figura sua H representat, nisi quod
pars dextra obtusior sit. Reliquæ uero duæ obscurio-
res, ac minus euidentes, quæ tempora à superiore ca-
pitis parte discernunt. Atque $\kappa\omicron\tau\alpha\phi\epsilon\acute{\iota}\alpha$ id est tem-
poralis & $\lambda\epsilon\pi\iota\delta\omicron\lambda\omicron\epsilon\acute{\iota}\delta\iota\varsigma$ quasi squamosæ sutu-
ræ dictæ, ut quæ squammarum formā præ se ferant. Ha-
rum omnium triplex est usus. Primus ut fumosi spi-
ritus exhalent, quod optime fit, dum capita lauantur,
pectuntur, & fricantur. Secundus ut per easdem du-
rum cerebri inuolucrum pericraneo potissimum con-
nectatur. Tertius ut pharmaca per illas intra crane-
um deferantur. Mulieribus una est sutura circularis,
uiris autem ut plurimum tres, quæ mutuo tactu con-
nectuntur. Illis quidem ob immodicam frigiditatem
ualdè sunt angustæ & interdum non apparent.

Nunc de

Nunc de cranij ossibus quæ suturis & commissuris *Cranij ossa vii.*
 ris coniunguntur erit dicendum. Illa autem septem
 sunt numero. Primum caluaria dicitur quæ os fron-
 tis est circa coronalem suturam. duo postea quæ in
 uertice per sagittam intersecata & usq; ad os frontis
 ubi phregma constitutum est, pertingunt. Iuxta tem-
 pora etiam duo lapidosa. septimū est adiunctum pa-
 lato, & à multiplici forma *πολύμορφον* dictum.
 In facie etiam duo circa nasum: iuxta oculos totidem,
 duo pariter iuxta mala, in palato rursus quatuor,
 quæ perpendiculum & subiacentem lineam diffecan-
 tur. Alia quoq; duo in quibus dentes sunt fixi, nempe
 mandibula superior & inferior. Sunt adhuc alia
 quædam si à suis commissuris separentur, ueluti in po-
 steriore capitis parte, qua cerebellum continetur duo
 adnata, seu appendices duæ, quæ primæ uertebrae im-
 plicantur. Alij etiam processus seu explantationes ut
 uocant, quæ Græcis *ἐκφυσις καὶ ἀποφύσεις*
 nuncupantur, Sic ossa paris dicta, *σφηνόειδες* quod
 alij inter capitis, alij inter maxillæ superioris ossa
 connumerant. Postremo os basilare, quo cerebrum
 superflua excernit. Prætereo ex industria minutissi-
 ma quædam ut sunt ipsorum & reliquorum ossium
 situs, uenarum propagines & huiusmodi, cum paulo
 supra *ἐπιγραφήν* præcipua solūmodo humane con-
 stitutionis expendamus. Maxilla porrò utraq; den-
 tes si-

- Dentes xxxij.** tes sicuti iam dictū est, continet, qui quidem triginta duo in uniuersum existunt: Priores quaterni à secundo incisori dicuntur: Postea canini, utrinque bini inseruntur: Deinde maxillares quaterni: & postremo seni molares. Interdum dentium integer is numerus non est. desiderantur enim in quibusdam quaterni ultimi maxillares. Porro dentium usus primus ad incidendos confringendosque cibos: alter ad uocis formationem & pronunciationem. Vltimus propter decorem & uenustatem faciei. Ceterum eorum constitutio uaria est, partim siquidem ex osse constant, partim ex carne & neruis à tertio pari, præsertim radices. Ideo sentiunt propter nervos qui à tertia syzygia deducuntur. Præterea caro quæ circa dentes utriusque maxillæ adnascitur, tanquam uallum dentium est & gingiua latinis nuncupata. Pars concava supra linguam ad fauces, palatum latinis, Græcis uero ὀπίσθενον nominatur. constat ex ossibus ipsius maxillæ, parua carne, & membrana, quæ à fistula per quam cibus in stomachum defertur, & ab ipso etiam stomacho oritur. Post palatam faucibus est locus, spatium scilicet illud latum intra os quod œsophago seu gulæ & trachæ arteriæ præiacet, atque in eo spatium uula & amigdalæ seu glandulæ continentur, alio etiam nomine pharynx, unde ex cernuntur redundantes humores ex capite. Præterea in faucibus primum uula occurrit,

occurrit, quæ Græcis γαργαρίω, Latinis uero uula, columella & columna, quæ similitudinem uulæ acino præ se fert, sed parte superiore qua ex palato pendet super Epiglotida ampla est & crassa: interna uero angusta & acuta, uenis & arterijs plena, atq; suspensa manet, & dum humor defluit longius protrahitur, & si quando inflāmata fuerit minatur suffocationē. Excipit autem à capite humiditates destillantes remoraturq; ac cōtemperat aërem ne minis frigidus subito ad pulmones irrumpat, comedentibus etiam ne quid esculentorum & poculentorum per uiam spiritalem descendat contegit. Post uulam circa linguae radicē, & iuxta gulæ initium caruncula quædam glandibus non absimilis utrinq; conspicitur, quæ quidē sparsas uenulas habet αὐτὶσίδες dictas: nos **Tonsillæ,** uero tonsillas, amygdalas & glandes nuncupamus, in quarum medio uula hæret. Et dum præter modū intumescunt, dolorem qui interdum suffocat concitant. Conducunt & ad continendū aërem & ad coarctandum fistulæ principium. **Lingua** Lingua ex carne spongiosa molliq; uenis, arterijs, neruis, ligamentis & musculis constat. Ex uenis quidem rubet & nutritur: Ex neruis & carne musculosa, motū, sensum & gustum obtinet. Motum quidem uoluntarium (moueri enim potest pro arbitratu cuiuslibet) ex nouem musculis & neruis septimæ syzygiæ. Gustus ex neruis tertiæ, & tactus

Et tactus ex carne. Sunt etiam qui ex linguae tunica per se sapores discerni ostendant. Est praeterea lingua caro rara et mollis et in eius radice glandulosa figura, in posteriore parte lata in anteriore uero angusta. Porro in linguae ipsius radice duo sunt spacia concava ex quibus salivae emanat, quae quidem clauduntur dum ipsa desit, et aperiuntur cum redundat, atque lingua subinde humefit. Praeterea ossi ὑψελος lingua infigitur, ex hoc quidem osse multi musculi prodeunt, quod cartilaginofum et bilaterale conspicitur. Adhuc intra fauces est ἐπιγλωττις, id est, membrana ex cartilaginibus, quae guttur seu utramque arteriam continet, ne cibus aut potus elabatur. Hanc laryngis orificio natura obiecit, ut quo tempore respiramus recta maneat, cum uero deglutimus aut cibum assumimus super laryngem subcedat, ne loquentibus illuc cibus aut potus inter deglutiendum permeet.

Epiglottis.

Trachea arteria.

Trachea arteria, fistula est descendens ad pulmones respirationis et uocis gratia, atque cartilagine tantumquam anulis distinguitur, uocaturque ob id aspera, cuius partes postea in collo dicemus. Altera fistula uocatur ὀσφραγος, latinis uero gula, et ad os uentriculi porrigitur, in eumque cibum et potum transfert.

Gula.

Duo cerebri inuolucra.

Nunc cerebri (in quo animae pars principalis ἡ ψυχή constituta est) inuolucra μενῆγγες Graeci uocant, explicemus, quarum una crassa est, ideo crassissima

sa meninx aut dura mater dicitur: altera est mollior, tenuior & subtilior, atq; ob id pia mater dicta. Harum prior est ueluti propugnaculū, quod cerebrum eiusq; molle inuolucrum contegit ambitq; penitus, ne à cranei duritie lædatur. Altera intersitium constituit inter cerebrum & cerebellum: ut uenas sustentet, quæ ultro citroq; implicantur, quibus cerebrum nutritur. Sub his tunicis cerebrum latitat, animæ rationalis, ut inquit Plato, domicilium. Nec aliter Galenus lib. 1. sanit. tuend. Cæterum inter reliqua membra primas cerebrum obtinet, propter sensus interiores: alia enim famulantia sunt, ut craneum, membranae, nerui, medulla, uenæ, arteriæ, rete admirabile, & alia id genus. Præterea cerebri substantia alba est, quia sine sanguine per se mollis instar coaguli ut affectiones sensuum interiorum uarias facile recipiat: humida, ne à motu qui fit per spiritus plus satis exiccetur: pinguis & tenax, ut spinalem medullam & neruos nutriat. Est etiam præter omnes corporis partes frigidissimum, & friabile, uenas, arterias, sanguinem & spiritum ex se non habens. Ad hæc cerebrum bifariam diuiditur, utpote per latitudinem & longitudinem. Latitudine quidem duas tantum partes habet, anteriorem & posteriorem. Illa quidem dextram & sinistram eiusdem magnitudinis per sagittalem suturam utrinq; ab altera, sicut per lambdoiden cerebel-

E lum à

Cerebrum primas inter reliqua membra obtinet.

lum à cerebro extrinsecus : sed intrinsecus per meninges. Atq; cerebrum anterius mollius est, ex quo nervi senserij. sic dicti quod sensum particulis distribuant, præsertim uisum & auditum. Posterius autem durius unde motorij nervi producuntur.

Septem nervorum paria.

Nunc de nervorum paribus quæ Græci *ουζυγίας* appellant. Itaq; nervorum quidam à cerebro (& hi propriè nervi dicuntur) quidam ex spinali medulla, alij ex musculis & hi tendones dicti, Alij ex ossium extremitatibus, qui ligamenta uocantur originem ducunt. Sunt igitur septem nervorum paria seu coniugationes. In primis equidem optici seu visorij, ab anterioribus uentriculis ad oculos instar *X* literæ sese inuicem diffecantes, uidendi uirtutem suppeditant. Alia duo paria, oculorū musculos mouent. Tertium par in cōmissura cerebri & cerebelli iuxta basin inuenitur. Quartum à tertio pari discedens ad palatum usq; procedit. Quintum prodit cum tertio pari & maxilla adiungitur. Sextum iuxta basin cerebri prodit. Septimum par & ultimum partim in musculos linguæ, partim in laringa & cartilaginem distribuitur. Hactenus capitis totius partes præcipuas enumerauimus, nunc colli ac subinde reliquas partes explicemus.

Collum.

Collum ambitus ille est à capite ad humeros, ex cute, carne, nervis, musculis, uenis, arterijs, uertebreis, cartilaginibus.

Cartilaginibus constitutum: in quo due canales seu ar-
 terie quæ Græcis καροΐσιδες conclusæ sunt. Prima
 anterior, & cartilaginea, per quam & respiratio fit,
 Græci Τραχηάειον καὶ Τραχίαιον uocant, quæ cartilagineis
 ueluti annulis ut ante dixi & membranis neruaceis
 constructa est, & à faucibus usq; ad pulmones pro-
 greditur: & est ueluti ductus quo aer in pulmones re-
 cipitur, quo etiam fuliginosi halitus cum per os tum
 per nares excernuntur. Hanc propter modulationem
 uocis (cuius formandæ instrumentum est) longiuscu-
 lam esse oportuit. Animalia siquidem, quibus collum,
 per quod eam distendi oportet deficit, muta sunt. si-
 cuti & quibus pulmo deest. Porro tracheæ orifici-
 um λάρυγξ, id est, guttur appellatur: reliquum ue-
 ro corpus post laringam usq; ad pulmones βρόγχος
 Galeno dicitur. At uero βρόγχος humor est excre- βρόγχος
 mentosus qui in guttur defluit raucedinem efficiens.
 Præterea huius arteriæ constitutio ex tunicis cartila-
 ginibus & musculis est confecta. Prima siquidem tu-
 nica seu membrana ambitum arteriæ intus & extra
 circumuestit, altera interna est & orbicularis, omnia
 concludens atq; contegens. cuius fibræ in longum re-
 ctæ contextæ sunt. Externa uero est tegumentū alia-
 rum eiusdem partium aniuersarum, cum eadem stru-
 cturæ ratione. Alia est cartilaginum hemicyclum ex-
 operantium sutura, quatenus eius & gulæ mutua est

Larynx.

**Laryngis mus-
culi xx.**

**Cervicis verte-
bræ vij.**

coniunctio . reliquæ enim cartilagine rotundæ prorsus sunt . Larynx porrò tribus componitur cartilaginibus , una maxima est & suprema , gibba foris ut contactu apparet , intus uerò caua ut est ad formandam uocem necessaria . Media aliquanto minor , quâ parte gula subsidet , & omnino circularis . Vltima αὐτὴν εἰσέεισιν uulgo cymbalaris , quod in modum cymbali uox in ea quodammodo resonet . Hæc cum foris expectat ἐπιγλωττίδα excipit . Porrò uocis organa dicuntur , per quæ spiritus reditus uox efficitur . ut sunt aspera arteria , guttur , & fauces , quemadmodum Galenus lib . 1 . Epid . ostendit . Adhæc in larynge musculos uiginti adnumerant , duodecim proprios & octo communes : Ex proprijs quatuor primam cartilagine secundæ coniungunt : quatuor tertiam secundæ connectunt : duo tertiam primæ copulant ; & duo in basi tertiæ cartilaginis sedem habent . Ex communibus uero sex primæ cartilagini : duo autem laryngis operculo inserti sunt . quo pacto autem collocentur Vesalius uir nostræ tempestatis , in corporis humani artificio exercitatisimus optime indicauit . Altera arteria carnosâ est colli & spinæ uer-tebris incumbens ad uentriculi orificium perducitur . Cæterum in ceruice , hoc est postrema colli parte , uer-tebræ septē quæ caput fulciunt , sunt constitutæ : quæ quidem nunc nodi , nunc spondilia , dicuntur . Prima igitur

igitur capiti annexa est, supra quam caput uertitur: altera statim subijcitur eadem ferè ratione: alia uerò quinq; coalescunt, in anteriori quidem parte firmissimo uinculo (quod membraneum est) astrictæ, postea duodecim subnectuntur dorso, cōmunes per spinam ad os usq; magnum quod & sacrum dicitur deductæ syzygiæ per singularum uertebrearum utrinq; constituta foramina: unde sensus & motus corpori exhibetur. Postremo sub gutture duo ossa à collo ad humeros quo loco facillime animalia iugulantur, propter arteriæ expeditiorē compressionem, ob id & iuguli dicuntur. Sic à similitudine furculæ fœnilis καλὴ ἄλξ, quasi clauiculæ quæ occludunt quum astringuntur, & dum laxantur aperiunt pectoris penetralia.

Sequitur nunc ut de humeris dicamus, quiquidem **Humeri.** humani corporis partes sunt utrinq; ab ima colli propagine ad brachia prominentes, Græcis ὠμοὶ dicuntur. Proprie tamen humeri ossa illa sunt, quæ à summo brachio usq; ad eius flexum protendunt, quorum partes summæ ἀκράμια & ἀπομεις Græca appellatione dicuntur: quibus scapularum ossa ὀμοπλάτη dicta cum iugulo mutua fit connexio. **Ancon.** Ancon tum Græcis tum Latinis ea brachij pars est, quæ incuruari & retorqueri manu pectori admota potest brachij etiam flexum uocant. Subsequuntur subinde ossa duo usq; ad brachiale: cubitus scilicet & ra-

dius. Ille in superiori parte duos recipit mucronatos
processus, quorum anterior minor est & in horum
utriusq; complexu est sinus, qui $\sigma\upsilon\gamma\mu\omicron\acute{\epsilon}\iota\delta\eta\varsigma$ uo-
catur: plerumq; tamen pars illa quæ ab Ancone est
usq; ad palmam, cubitus dicitur, ad brachiale quod
Græcis $\kappa\acute{\epsilon}\rho\pi\omicron\nu$ est, octo osibus constitutū desinens.
Huius partes due sunt, præcedens $\pi\rho\omicron\kappa\acute{\epsilon}\rho\pi\iota\omicron\nu$ &
subsequens $\mu\epsilon\tau\alpha\kappa\acute{\epsilon}\rho\pi\iota\omicron\nu$. Hæc extensa manus
pars est extrema usq; ad digitos.

Manus orga-
num organo-
rum.

Digitus.

Nunc manus quam Aristoteles organum organo-
rum uocauit, fabricam aggrediamur. Eius itaq; pars
prima quæ intrinsecus cum quadam concavitate ap-
paret, palma dicitur. cavitatis uero manus internæ uo-
la, cui metacarpion opponitur. Thenar & hypothe-
nar opponuntur, illud quidem iuxta pollicem assur-
git, sed in his Polux non nihil uariat. à magno siqui-
dem digito ad indicem usq; thenar illi est: & ab indice
ad minimum hypothenar. Digiti qui Græcis $\delta\iota\acute{\epsilon}\tau\eta\lambda\omicron\iota$
dicuntur manui utriq; ductu naturali,
quinq; annumerantur, utpote, pollex, qui primus &
omniū crassissimus est, Græcis $\alpha\upsilon\tau\iota\chi\epsilon\iota\varsigma$, postea index
 $\delta\epsilon\acute{\iota}\chi\epsilon\upsilon\omicron\varsigma$, Deinde medius $\mu\epsilon\acute{\iota}\sigma\omicron\varsigma$, demum annularis
 $\delta\omicron\kappa\tau\upsilon\lambda\omega\tau\eta\varsigma$, postremò minimus $\mu\iota\kappa\rho\acute{\varsigma}$, Hi om-
nes ex Galeno quatuor osibus constant, ut ratio ter-
norum osiculorum digitis rectius iniretur. At de mu-
sculis & uenis, eorumq; propaginibus, nexibusq; &

eorum

eorum operationibus Galenus lib. 2. de usu part. indicauit. Sunt præterea tres uenæ insignes cum sua Venæ tres insignes ramorū propagine, humeraria scilicet quæ cephalica dicitur: axillaris quæ basilica & iecoraria nuncupatur, & mediana seu media, quæ communis atq; Arabibus nigra uocitatur. Est quoq; una arteria quæ totam manum percurrit modo sub uno humerariæ uenæ ramo, modo sub uena axillari. Humeraria supra inflexum uersus scapulam aperitur: Mediana infra uersus manum: axillaris iuxta furculam, seu ramificationem ubi magis tumet: Sic & Saphenam recta clauiculâ. quod si in poplite hanc secare uoluerimus, poplitem ligare parte inferiori & superiori oportet, & subinde longe à ligamentis & neruis tundenda, securius tamen superiori modo aperitur. Porro uenæ humerariæ nulla arteria subijcitur, neq; ramis qui ab ea propagantur, si unum in eo nodo quo brachium cum cubito coarctatur, sub uena axillari exceperis: Reliquæ uero uenæ superficiariæ arterias nō habent.

Thorax à clauiculis ad diaphragma continetur Thorax & partes uitales habet, atq; uenter medius nuncupatur. In hoc etiam costæ duodecim ab utroq; latere & uertebre totidem proxime à collo impactæ ad os pectoris sufferuntur. Sed ex eis septem superiores ueræ & integræ dicuntur, quæ cum osse pectorali coniunctæ sunt: Aliæ uerò nothæ, spurie, & illegitimæ ap-

Hypochondri-
on.

Ilia.

Libro xj. cap.
xxxvj.

pellantur: quæ propter alui extuberationem & uen-
triculi intentionem ac propter mulieres uterum ge-
rentes decurtata sunt, ad diaphragma desinentes. Eas
Græci simpliciter $\chi\omicron\nu\delta' \gamma\alpha\upsilon$ & partem sub eisdem
utramq; $\epsilon\upsilon \pi\omicron \chi\omicron\nu\delta' \delta\iota\sigma\iota\omicron\nu$ appellarunt. Cæterum Hy-
pochondrion cum ilijs & præcordijs authores sapis-
sime confundunt: sed hypochondrion proprie super-
nam uentris partem, in lateribus sub costis, ubi iecur,
lien, uentriculus, & peritoneum. Ilia uerò infimam
à lateribus iuxta pubem. Præcordia autem membra-
ne sunt (ut etiam Plinius testatur) quibus exta ab in-
feriorum uiscerum parte separantur, Græci $\phi\epsilon\gamma\epsilon\nu\alpha\varsigma$
& $\delta\iota\alpha\phi\epsilon\gamma\acute{\alpha}\gamma\mu\alpha$, nos septū transversum uocamus.
Est & altera tunica quam Græci $\delta\iota\alpha\phi\epsilon\gamma\acute{\alpha}\tau\iota\omega\nu$ uo-
cant, nos uerò communi uocabulo mediastinum, quo
thorax dextra atq; sinistra parte & pulmones inter-
cipiuntur. Eius utilitas est ut si altera pulmonis pars
uitiata fuerit, alteram integram conseruet. Porro
membrana costas intrinsecus succingens, $\pi\lambda\epsilon\upsilon\gamma\epsilon$
dicitur. Ultima $\delta\iota\alpha\phi\epsilon\gamma\acute{\alpha}\gamma\mu\alpha$: Celsus septum trans-
uersum interpretatur, quod instar septi cuiusdam in
transuersa parte thoracis membra naturalia à uitali-
bus, seu uentrem inferiorem à pectore, ne cor halitu
ciborum in præcipuis animæ operationibus impedi-
retur. Veteres hanc partem $\phi\epsilon\gamma\epsilon\nu\alpha\varsigma$ & ijs è regione
positam $\mu\epsilon\tau\alpha\phi\epsilon\gamma\epsilon\nu\omicron\nu$ dicere consueuerunt.

Iam uero

Iam uero de pectore, cuius constitutio à collo ad **Pectus.**
 diaphragma est constructa. illud equidem constat cu-
 te, musculis, ossibus, cartilaginibus, membranis, uenis,
 arterijs, & eiusmodi. in quo etiam duæ mammae
 utrinq; sitæ sunt, quæ Græcis *τῆτες* dicuntur. In
 foeminis tamen lactis causa laxiores. Suscipit albes-
 cinem lac ipsum à carnis substantia, quæ alba, rara,
 & spongiosa est, ex uenarum & arteriarum à supe-
 riori furcula intertextu, quæ cum nutrimentum at-
 trahat, menstruum sanguinem in album conuertit.
 Apices quos infantuli sugunt *θῆλαι* hoc est papillæ
 uocantur. Partes quæ pectori incubant & in eo con- **Pectorales par-**
 tinentur, cor primas ueluti sol inter erroneas possidet, **tes.**
 cui arteria uocalis & pulmones spiritum præparant.
 Huic etiam membranæ, costæ, muscoli, pericardion,
 propugnacula & tegumenta dicuntur. Præterea ue-
 næ & arteriæ ab illo in alias corporis partes spiritum
 & sanguinem deferunt. Adhæc membrana quæ to-
 tum corpus cordis ambit Græcis *περικαρδιον* di-
 citur. Hæc neruacea est in qua humiditas quædam
 continetur, idq; ne cor ex motu continuo calefacto
 exiccet ac tabescat. Cæterum cor (ex quo iecur,
 cerebrum, testes, & aliæ corporis partes uitam ha-
 bent) in medio pectoris consistit, sed eius mucro non-
 nihil ad sinistram, sicuti basis ad dextram deflectitur.
 Deinde cordis substantia ex carne solida est, & ueluti **Cor.**

E 3 sanguine

sanguine concreta, cui uena inest quam arteriosam uocant, & arteria torta omnium maxima propago & origo, cuius una pars iugulum petit: altera deorsum ad spinam detorquetur. Postremo arteria uenosa. Sunt etiam cordis uentriculi duo, qui à Græcis *κρῖνες* dicuntur, quorum utriq; est suus ambitus, dexter qui tactu est mollior, in quem uena caua subit, & ex quo uena arteriosa egreditur: Inest & cartilago, quæ omnia in dissectionibus sunt considerata.

Pulmo,

Proximus cordi Pulmo est qui Græcis à spirandi officio *πνεύμων* dicitur, cuius substantia rara est & spongiosa atq; arterijs tum lenibus tum asperis coniuncta. Preterea pulmo in duas partes, dextram & sinistram diuiditur, idq; per membranam interceptentem, est etiam quatuor fibris seu pinnis quos Græci *ἀέρας* uocant circumdatus: duæ quidem in sinistra, totidem in dextra, quibus tertia accedit admodum exigua quasi alterius soboles.

Partes naturales.

Supereft uenter inferior qui à diaphragmate ad os pubis porrigitur, partes naturales complectens, ut sunt membrana, adeps, musculi, peritoneum, omentum, mesenterium, intestina, lien, iecur, uenter, renes, uesica & membra genitalia, tam in uiris quam mulieribus. Principio cutis totius animalis inuolucrum sese offert, ex qua per poros continua, nostra substantie nullo sensu percepta fit transpiratio. Tuberculum

Uterculum illud in uentris atq; animalis totius medio, *ὀμφαλός* Græcis, Latinis uero umbilicus nominatur. Postea adeps sequitur, & ab ea musculi octo, quibus abdomen comprehenditur. Ex ipsis itaq; musculis, quatuor sunt obliqui, duo recti, & duo transuersi: in quibus ordo, origo, connexus & situs obseruari debet: duo primi à spurijis costis obliquè ad pubis ossa descendunt, alij duo è contrario ab ossibus coxendicis obliquè ascendentes ad mucronatam cartilagineum desinunt. Tertium par ab hac cartilagine recta ad pubis ossa, ultimum à lumborum uertebis ad extremum spuriarum costarum in anteriori parte adhærescit. In primo pari est membraneus & ualidus tendo ante inguina: in secundo membrana carnosior: in tertio multum carnis adest tota longitudine: In quarto iuxta originem membranosum ligamentum, quod deinde fibris adactū in musculi naturam abit. Sub his musculis est tunica quæ intestinis adiacet & substernitur admodum subtilis, uideturq; telas aranearum referre, Græcis *περίτονιον*, quod sit undiq; circa illas partes extensa, cui neruosus panniculus subiacet *ἐπίπλοον* & omentum dictus. Postea sequitur *μεσεντέριον*, sic dictum à situ cum sit intestinis implicitum, dicitur & *μεσάρειον* à substantia tenui. nam subtilis est à peritoneo panniculus, neruis, uenis, arterijs & glandulosa constans carne.

Musculi uentris inferioris viij.

In me-

**Intestinatorum
numerus.**

**Lumbrici in
quo potissimum
intestino gene-
rentur.**

Hepar.

In mesenterij complexu sex sunt intestina ex duabus tunicis constituta, in quibus quædā sunt fibræ transuersæ, ad excrementorum expulsiōem: aliæ rectæ, propter facultatem attractoriam. Atq; tria superiora intestina gracilia sunt, reliqua uerò crassiora. Primum igitur intestinum $\delta\omega\delta\epsilon\kappa\alpha\delta\acute{\alpha}\kappa\tau\iota\lambda\omicron\rho$ à Græcis dicitur, Latinis uero communi uocabulo duodenum quod à pyloro, id est inferiori uentriculi meatu oritur. Secundum, ieiunum, quod innane & uacuum sit. Tertium $\iota\lambda\epsilon\omicron\varsigma$ Græcis, Latinis uero tenue, in quo Iliacus morbus, seu uoluulus gignitur. Quartum cæcum dicitur, cuius sedes sub iocinore & dextro rene est constituta, & in quo magna ex parte lumbrici generantur. Quintum colon est, cæco continuum, in quo sinuosæ sunt quædam inuolutiones. Sextum rectum dicitur, in cuius ambitu est astrictorius musculus Græcis $\sigma\phi\gamma\kappa\tau\eta\varsigma$, cuius extremum anus & podex dicitur.

Hepar sub diaphragmate in dextro hypochondrio proximè locū habet, cuius substantia est rara, mollis & rubea, ueluti sanguis recenter concretus. Intrinsecus caui unde uena porta (ex qua uenæ mesaricæ & aliæ quædam propagantur) ortum habet Extrinsecus uerò gibbum, quod prominens uentriculo incumbit, & ab eo uena cava & magna seu iecoraria oritur. quæ sanguinem ad cor per reliquas uenas in totum

in totum corpus transfert ac distribuit, ob id uehiculum alimenti est dicta. Hepar insuper uirtute sua specifica sanguinis generandi est organum, & non cor ut quidam iudicarunt, atq; summa hepatis in parte uesicula est, in qua amara bilis recipitur.

Alterum uiscus quod lien dicitur, in sinistra corporis parte hepati opposita. paulo tamen inferius, atq; in costarum spurcarum media cappaçitate collocatur. carne constat subtili, rara, spongiosa, subnigro colore: est enim atræ bilis receptaculum, in eo etiam multe sparsæ sunt arteriæ, quæ calorem à corde recipiunt ad sanguinis fœculenti concoctionem.

Ventriculus sub septo transuerso in medio animalis iuxta mucronatam cartilaginem inter hepar & lienem est constitutus, & ex duabus tunicis simul compactus: In interiori quidem quæ propter facultatem attractoriam membranosiore est, fibræ rectæ sunt: In exteriori uerò, quæ propter expultricem carnosior, transuersæ. Porro uentriculi ostiola duo sunt superius quidem ὁ σόφαιος Græcis, Latinis uero gula & stomachus, inferius uerò ad dextram prope iecur situm habet, cui astrictoria uis inest, quousq; concocta esculenta ad intestina demittat.

Sub hepate & liene renibus qui Græcis νεφροὶ dicuntur utrinq; locus est, quorum substantia carnosæ, solidæ, & densæ est, & à uena cava alimentum desumunt.

sumunt. Horum in medio sunt urinarij meatus, quos Græci *ὀυρητῆρες* appellant, qui quidem ad uesicam descendunt, ut ex his urina in uesicā defluat.

Vesica. Vesica quam Græci *κύστη* uocant, ex duabus tunicis nervosis & densis, nec non uenis & arterijs quibusdam est constructa. Iam uerò de membris genitalibus, quæ quidem in utroq; sexu duo sunt, aliud in dextrum, aliud in sinistrum ex compagine magnæ uenæ & arteriæ ab utroq; latere usq; ad ipsos testes composita, unde sanguis & spiritus ad generationem deferuntur: siquidem semini uirtus inest ab hepate propter uenam à corde: propter arteriam, à cerebro: propter panniculum quo uena caua & arteria Aorta iunguntur & conteguntur.

Semen humanum unde producat. Semen ex quo animal generatur à toto corpore iuxta Hippocratem producit, sed magna ex parte à cerebro, cum eius natura sanguinis sit propinquior. Et quoniam à caua uena dextri testiculi semen calidius masculis gignendis magis accommodum, ueluti ex uena emulgente sinistri semen aquosum & minus excoctum prolicetur foemineis generandis appositum. Hæc uasa quæ præparantia dicuntur, utilem superfluitatē ultimæ concoctionis à toto corpore trahunt & paulatim præparant ad seminis humanæ speciei naturam: postea testes qui calidi sunt concoctionem explent & sua concoctione sanguinis ruborem in al-

bum con-

bum conuertunt. Porro inuolucrum quod circa caput testiculorum exiſtit ἐπιδιδυμῖς dicitur, eſtq; teſtium ſuperior particula ex ſeminarijs uenis & arterijs ipſos conuoluens. His accedit exigua quedam uenarum & arteriarum propago, quæ in unum deſinens meatū genitura ex ſuperiori teſtium parte ad penis ipſius originem & urinaẽ canalem producitur. poſtea ab inuolucro uehitur ſemen in uafa, quæ conſeruantia dicuntur. Inſuper teſticulorum tres ſunt tunicae, quarum extrema ὀσχεον, id eſt ſcortum, Media Δακτύλος: ima ἐγερθροειδὴς.

Teſtes uero Græcis Διδυμοί dicuntur, ſingulis Teſtes hominibus bini ut plurimum ſunt, & in ſuperioribus uafiſ preparatum ſemen conſeruant. Horum caro mollis, frangibilis & glanduloſa, qualis in mammis reperitur. Penis καύλος Græcis dicta, connexum cum ueſicæ collo habens, carne dura conſtat, ligamentis & tendonibus multis, qui ab oſſe fœmoris oriuntur. Similiter & neruus à ſpinali medulla, tum etiam uenis & arterijs nec non muſculis duobus ab utroq; latere. Præterea penis ſummitas βάλανος hoc eſt glans dicitur, foramen uerò quo urina redditur ἐγερθρα, Cuticula glandem ueſtiens, præputium.

Mulieres etiam in utroq; latere uenas & arterias habent, ſed magis quam in uiris breuioreſ, & circa earum teſticulos anfractuofa quedam eſt circumuolutio,

lutio, unde rami duo exeunt, quorum unus uulvæ corpus subit, alter laxis quibusdam anfractibus in muliebrium locorum apices abit.

Vterus. Vterus Græcis μήτρα, Latine matrix: quibusdam loci muliebres, inter rectum intestinum & vesicam situm habet, atq; fundū ipsius umbilico uicinum est: ac uteri ipsius collum additus est longiusculus ad muliebrium sinū desinens, & ex musculis, carne duriore & cartilaginibus constitutus. cuius longitudo in mulieribus ætate perfectis, sex fere digitorum est: ueluti ad fundum usq; undecim: ut in dissectionibus anatomicis apparet. Porro cervicis seu colli extremitas præter cuticularem connexum & rugarum implexum nymphaea dicitur. Hæc masculorum præputio respondet, & cervicem obturat, ne quid frigidi aëris intro recipiatur. Sunt præterea ipsi utero duo sinus, dexter, in quo mares & sinister, in quo foemelle sæpius generantur. Similiter duo cornua quæ uterum coxis alligant: duo itidem testiculi utrinq; iuxta hæc extra matricem sed masculis minores, duriores, & frigidiores. Ob id ipsarum semen magis est tenue & aquosum quod uirili in foetus procreatione miscetur, nam utrumq; actiue & passiue in foetus generatione se habet: multum siquidem in utroq; spirituum inest, sed uirile semen cum sit calidius & crassius magis agit. Sunt & uenarum in matrice quædam ori-

dam orificia Græci *κοτυλάδες* uocant. sed cum uenarū scaturigo hic uaria sit, duæ erunt potissimum considerandæ, quæ ad mamillas diriguntur. Ex his itaq; sanguis menstruus effluit, & puriorem sanguinem quo matrix & foetus nutriuntur conuehant. In mulieribus porro paulò aliter atq; in uirginibus menstrua, tum colore, tum copia discernuntur. Postremo est hymeneum, hoc est, membrana quædam instar retis, ex ligamentis subtilibus & pluribus uenulis circa ceruicis medium intertexta, quæ in defloratione uirginum scinditur. Cæterum membranæ foetum inuoluentes ex semine nascuntur, quarum prima *χόριοι* dicitur Latinis uero secundina, ut quæ omnia ad foetum pertinentia contineat, atq; totum uteri sinum ambiat, estq; arterijs & uenis propter nutrimentum contexta, per quam foetus uteri annexus est, in cuius medio meatus est, qui ex fundo uesticæ urinam haurit, & in membranam alteram eius uicinam transfert. Proxime est *ἀμβλαστὶς*. Tertia *ἄμνις*. Est etiam os illud magnum & latum tam in mulieribus quam uiris, quod Græcis *ἰεγὸν* dicitur, estq; basis & ueluti fulcrum quoddam uertebraarū in fine ipsarum constitutum. Sunt præterea huius ossis processus duo ab utroq; latere in superiori quidem parte, illa dicti: *Ilia*. In inferiori uero & exteriori ad fœmoris ingressum *Coxendix*. *ischia*. coxa & coxendix. At uero *ἰσχία* interdum pro

F coxen-

- coxendicibus accipiuntur: interdum pro utraq; ossis
Nates. ipsius magni seu lati parte, ubi γλῶττι, id est, nates
 quibus intercedendū totum corpus innititur. Harum
 tumores seu colliculi κλῶνες, Latinis non admo-
Clunes. dum uoce dissimili clunes dicuntur. Fœmur μῆρὸς à
Fœmur. Græcis, superiorē partem magni pedis à natibus usq;
Genus. ad genua comprehendit. Genu γόνυ eo loci incipit
 quo fœmora tibijs iunguntur & motum efficiunt.
 Os extrinsecus cartilaginosum, rotundumq; & ad
 flexum iuncturarum tutelam, μόλῃ & Latinis mo-
 la atq; patella dicitur. Cavitas posterior quæ flexum
 cruri præbet, poplex appellatur.
- Crus.** Crus à genu subsequitur ad extremum pedem ex:
 duobus ossibus constans, quæ arundines & cannæ:
 atq; uulgo focilia nuncupantur. maius tamen in par-
 te anteriore cruris situm est. Itaq; facile maius aut
 canna maior & tibia dicitur, Græcis κνήμη, alte-
 rum quod ipsis τρεῖς γόνυ, extrinsecus est locatum,
 & focile minus, fibula & sura uocatur, tametsi sura
 pro carne pulposa posteriori arundini adnata fre-
 quentius accipiat. Clauiculæ extremæ tibie, su-
 ræq; processum partes σφύρα καὶ ἀσγέρονες, uelut
 ti Latinis malleoli & suffragines uocantur. At cal-
 caneus sub σκαποειδὴς, id est offe nauiculari exi-
 stit, ossa balistæ quæ in utroq; latere extuberant, suf-
 fragines etiam appellantur. Porro pars pedis superi-
 or quæ

or quæ quatuor ossibus astringitur est τὰ ἑσσοσ, inferi-
 or uero quinque ossibus constans πένδλιος ternis in-
 ternodis non aliter atque manuum digiti præter polli-
 cem (qui duplici osse tantum constat) alligantur. Po-
 stremo unguis qui manuum et pedum extremitati-
 bus adnascuntur, ex crassis et terrenis neruorum re-
 crementis, pilorum modo, generationem et incre-
 mentum suscipiunt. Sunt et alia quædam per to-
 tum corpus sparsa, quæ quidem ex uberiori aliorum
 lectione colligere licebit. Huiusmodi ferè sunt aliquot
 muscoli, nerui, tendones, ligamenta, uenæ, arteriæ, fi-
 bræ et similia. Musculi ex carne simplici, neruis, li-
 gamentis, uenis et arterijs componuntur, atque orga-
 na motus uoluntarij sunt: et qui ossa non mouent,
 in tendonem minime desinunt. Porro musculorum
 motus in agendo non in patièdo actionis efficaciam
 habent. Tendones ex neruo et ligamento à fine mu-
 sculorum exeunt: et neruis sunt multo maiores.
 Neruij (quorum cavitates spiritu animali plena est) à
 cerebro ex quo uirtutem animalem habent, et spi-
 nali medulla, quæ à cerebro fit, trahunt originem.
 atque facultatem sensus et motus à principio in partes
 diducunt. Ligamenta Græcis σύνδεσμοι dicuntur,
 suntque neruis similia, quæ ex ossibus originem ducunt,
 et in ossa aut musculos inseruntur, ex angustia et al-
 ba sunt: sensu omnino et motu carentia. Venæ san-

Vngues

Musculi ex quibus componuntur.

Venæ in quibus

asum facta.

Iecoris actio
de cognoscitur.

guinis generandi & in omnes partes corporis diffen-
rendi gratia factæ sunt, atq; uim naturalem ab hepa-
te desumunt. quæ quidem sicuti arteriæ ex fibris &
membranis constant. Porro uena simplex ex se ipsa
nutritur, ueluti ex ea neruus & arteria. ut Galenus
lib. 2. facult. nat. indicauit. Cæterum per concoctio-
nem in uenis factam tria redundant excrementorum
genera: unū quidem bilis amara dicitur, quæ per io-
cinoris uesticam expurgatur: alterū bilis atra, quam
ad se lien allicit. tertium ueluti serum, quem renes
attrahunt. sicuti Galenus lib. 3. de causis sympt. pa-
tescit. Rursus iecoris & uenarum actio. per urinas
deprehenditur non secus atq; uentriculi per alui re-
crementa, musculorum ex motu & neruorū sensum.

De tendonibus, neruis, & ligamentis, & quomo-
do inter se differant Galenus in libro de motu muscu-
lorum, & primo de usu partium abunde differuit.

DE FACULTATIBVS

Cap. VIII.

Facultas anima-
lis.

FACULTATES operationū causæ sunt, atq; to-
tius animalis gubernatrices, quarum principia
sunt cerebrū, cor & epar: differentie uero ro-
bur & imbecillitas. Sūt autē ipsæ facultates (ut etiā in
primo de morbis curandis lib. diximus) tres numero.
Prima quidem animalis dicitur, quæ in cerebro
hærens

hærens operationibus uoluntarijs præsidet atq; sensum & motum in totum corpus transmittit, quam Græci λογιστική hoc est ratiocinatricem appellarunt. Ratiocinari enim est eorum quæ dicuntur considerare. Item pugnantia consequentiam rerum cognouisse, rationalis facultatis est munus. Ob conuitia autem aut minas nec irasci nec excandescere animosæ facultatis est proprium. Et dum conuenientia in hominibus sunt administrata, cerebrum quidem imperat, cor autem & imperat & obsecundat.

Altera facultas uitalis nuncupatur, in corde domicilium habens, quæ quidem per arterias uniuerso corpori uitam impartit: Græci θυμοειδής, id est animosam seu irascibilem appellarunt. Præterea uitalis facultas animalibus alijsq; rebus uegetantib. est insita.

Tertia facultas naturalis in iocinore sedem habet, atq; per uenas in corpus diffusas omnibus membris alimoniam distribuit, Græci ἐπιτιμητική id est, concupiscibilem & ἑπὶ ἡκκῆ hoc est altricem nominant. quæ quidem necessarijs sibi operibus semper uacat, & nunquam torpet aut negligens est. Quæ uerò facultates sub uoluntaria potestate cadunt, frequenter (ubi uoluntas ipsa circa alias actiones detenta fuerit) negligentius agunt. Præterea naturalis hæc facultas quadruplex est, utpote, attractrix, retentrix, concoctrix, & expultrix. Attractrix,

Facultas uitalis.

Facultas naturalis.

Naturalis facultas quadruplex.

atrix conuenientem particulæ succum, hoc est, quæ
 parti nutriendæ assimilatur allicit: Retentrix attra-
 ctum retinet: concoctrix ipsum alterat & immutat,
 nec non parti quæ alitur apponit & assimilât. Ex-
 pultrix à concoctione quod superuacaneum est, pellit
 ac segregat, ne sua putredine corpus inficiatur. Cæ-
 terum facultates quædam ob familiaritatem rerum
 tantum agunt, ut sunt attractrix, retentrix, & con-
 coctrix. Sola uero expultrix à noxijs & irritamen-
 tis exercetur. Rursus facultas animalis per somnum
 quiescit, naturalis uero ualidius operatur: utpotè
 cum cibus multo melius tum concoquatur, idq; non
 solum in uentriculo, sed per uniuersum corporis eti-
 am habitum. Porro facultas bifariam læditur, aut
 propter suam ipsius essentiam, aut propter aliquem
 morbum in instrumentis, sicuti Galenus lib. 3. de cau-
 sis sympt. indicauit. Atq; dum naturalis est offensa,
 id cognoscetur ex sanguinis eiectionibus ab initio
 aquosis atq; liquoribus, postea uero crassis & fœcu-
 lentis. Animalis uero facultas ex motuum uolunta-
 riorum imbecillitate: uitalis ex arteriarum pulsu. Et
 cum naturalis & uitalis facultatis fallax sit roboris
 iudicium: illius tamen longe rectius ex urinæ & ege-
 stionibus imbecillitatis signum: huius uero ex pulsu
 minime fallax iudicium esse potest. Atq; ex faculta-
 tibus quatuor naturalibus sola concoctrix sine motu
 ad locum

Facultates of-
 fensa:

ad locum operatur, quare sicco instrumento non indiget, sed calido & humido, ut probe concoqueret aleretq;. Reliquæ uero tres nempe attractrix, retentrix, & expultrix, non sine motu munus suum obeunt, & proinde *πρακτικὴς*, id est, actuosas, Græci uocant. Atq; una quæuis corporis pars, quæ ui propria regitur, has facultates à iocinore pro insiti temperamenti ratione mutuatur. Etenim quatuor facultates naturales quatuor qualitatum temperamenta, unaquæq; suum, sequitur: nihilominus retentrix quantitate, aut qualitate aut utraq; contentorum offensa, ad expellendum incitat expultricem. Quatuor igitur sunt facultates, quibus quælibet pars tum animalis tum plantæ prædita est: Et quibus omnia quæ aluntur corpora, gubernantur. Vna quidem ad si alimentum (ut iam dictum est) attrahit, altera uero ipsum ambit ac continet: Tertia concoquit & assimilât. Postrema inutilia deijcit. Neq; aliud est facultas quæ Græcis *δύναμις* dicitur, nisi causa quam *ἐνέργεια* ipsi uocant ex qua procedit actio.

DE ACTIONIBVS.

Cap. IX.

ACTIO motus est actiuus à facultate procedens. Eius natura duplex est. Vna quidem prima & maxime propria dum pariter omnia
Actio quædam

F 4 nes sima

Actio.

Gal, lib. de ple-
ritud.Actiones dupli-
ces.

nes simplices partes agunt: altera ex accidente, quæ totius est instrumenti. ut totius cruris actio, incessus est qui eo tempore fit dū articuli illius uicissim nunc extenduntur nunc flectuntur. Est igitur actio motus quidam efficiens, qui ex se fit idq; dupliciter, naturali scilicet ratione seu primaria: ut est cordis & arteriarum motus: & præter naturā, atq; in secunda huius dictionis significatione, quemadmodum in palpitationibus. Ceterum actiones ualidæ ingentium uirium inseparabiles sunt notæ, sicuti Galenus indicauit. Contra uero actionum imbecillitas uires inualidiores ostendit, eo quod mouens causa impediatur. sicuti in languidiore manuum & crurium motione accidit. Porro motricis ipsius facultatis symptomata triplicia dicuntur, utpote immobilitas, diminutus motus, & deprauatus. Actionis interea uitium, non ante pronuntiabimus morbum, quam ad sensilem magnitudinem prouenerit, quemadmodum Galenus lib. 1. sanit. tuendæ scriptum reliquit. Præterea actiones duplices potissimum adnumerantur, naturalis uidelicet & animalis. Animalis diuiditur in sensilem motiuam & gubernatricem. Sensilis quinque differentiis sortitur: uisuiam, olfactoriam, gustatricem, auditoriam, atq; factricem. Motiua autem cum unicuique duntaxat instrumentum habeat, unum habet tantum motionis modum, Variatur tamen pro particulari instrumenti

instrumentorum diuersitate. Huius quidem facultatis uia à cerebro per neruos in totum corpus ducitur.

Sic & musculorum, neruorum, tendonum, uoluntarias actiones proprias esse Galenus testatur. Actio-

Lib. ij. sanit. tuend.

nis itaq; notitia temperamentū & affectus indicant, ut ex motu celeri, biliosum uel sanguineum: ex tardo & lento pituitosum uel melancholicum. Et cum ex facultate actio quæuis efficiatur, ubi semel illa deper-

dita fuerit, actio ipsa nullo modo sequi potest. Interea corporales actiones præcipuas pueris: animales uero

ei ætati, quæ à pueritia ad remissionem usq; succedit, Galenus lib. 6. sanit. tuende monstrat. Initium au-

tem remissionis nonnulli habent statim à trigesimo anno: nonnulli post quintum & trigesimum. atq; ro-

bur omnibus post ipsam summi uigoris ætatem im-

Actiões ani-
males.

minuitur. Actiones igitur quæ ab animali facultate

Actiões uita-
les.

prodeunt, sunt sensus, motus, & ratio. Sensus, tum

communes ut somnus, uigilia: tum proprii, ut uisus,

auditus, gustus, tactus, odoratus. Quæ uero à uitali

facultate proficiscuntur actiones sunt arteriarum & cordis pulsus atq; motus animi, ueluti iracundia, fu-

ror, excandescencia, audacia, metus, morositas, iusti-

tia, letitia, amor, confidentia, & id genus. Porro actio-

nes quæ à principe facultate prodeunt, sunt cogitatio

(quæ imaginationis appellationem interdum sortitur) iudicium & memoria seu discendi promptitudo.

**Actioes natu-
rales.**

Naturales uero actiones sunt appetentia cibi, potus, ueneris & huiusmodi, sub quo genere excrementa continentur: quæ cum uniuerſi corporis, tum maxime partium unde reiiciuntur temperaturam ostendunt, cuiusmodi sunt urina, alui deiectiones, sputa, sudores, menstrua, & cerebri defluxiones. Item generatio, auctio, nutritio, atq; similia. Et quemadmodum corporis partes duplices sunt, simplices & compositæ, ita actiones duplices ut iam diximus, primæ à simplicibus partibus, secundæ ab instrumentarijs trahentes originem. nam instrumenta ex simplicibus ex

**Instrumenta
quæ dicantur.**

quibus actiones obtinent, componuntur. Instrumenta uocantur ut alibi diximus, partes quibus perfecta actio edi potest, ut sunt oculi, aures, crura, manus & in oculis chryſtallinus humor & similia, quorum uisus, auditus, sermo, incessus apprehensio, actiones sunt. Insuper corporis actiones si perfectè suum munus obeant, optimum temperamentum ostendunt & sequuntur, si uero læsæ fuerint, à parte unde ducuntur id habent. nulla siquidem actio læditur, nisi pars ex qua proficiſcuntur, prius læsa fuerit. Qui tueri igitur actiones uolet ipsarum temperamentum custodiat oportet. custodiet autem si quod ad calidius est conuersum refrigeret: & quod ad frigidius inclinatum calefaciat. Pari modo si quod ad siccus alteratum humectet, & humentius siccet. Rursus quoq; si
siccabit

ficcabit pariter ac calefaciet, quod humidius & frigidius: & sic in reliquis duabus coniungationibus. Atq; actionis causa quatuor qualitatum mediocris temperies existit. Contra uero intemperies causa est uitij, sicuti Galenus lib. 2 Meth. Med. monet.

DE SPIRITIBVS

Cap. X.

SPIRITVS subtilis est uapor ex sanguine, cordis uirtute incensus, ad actiones exercendas. Cuius principaliora instrumenta pulmonē, cor & thoracē ex Galeni lib. 7. de Anatomicis administrationibus didicimus. Caterum spiritus ex tenui materia syncerus & clarus nascitur: sicut ex crassa turbulenta & caliginosus. atq; in syncero & lymphido, celerius & melius quam in crasso & turbulento rerum imagines comprehenduntur. Porro spiritus primum in corde generationē habent: inde ad cerebrum ubi aliam naturam accipiunt, transmittuntur. In cerebro igitur spiritus quem Animalem uocant, sedem habet, actionibus sensuum & neruis ciendis idoneus. Hoc quidem anima utitur ad uoluntarias functiones. At uero Stoici spiritum esse animam contendunt: sed humidiores frigidioresq; naturalem, animalem contra aridiorem ac calidiorem. quem quidem spiritum, materiam propriam atq; instrumentum ipsius animae esse com-

Spiritus unde
fiat.

esse com-

Gal. lib. de usu
respiran.

Spiritus ultra-
lis.

Gal. lib. i. de
placit. Hipp.
& platon.

esse constat. Materiae autem species temperamen-
tum in commoderata aërea, igneaq; substantiae mix-
tione consistens, sicuti Gallenus libro cui titulus est de
anima, morum, & corporei temperamenti mutua
consecutione. Ceterum cum spiritus hic necessario
nutriri debeat, certe rationi est consonum ut Galenus
inquit, illic partim ab aëre per inspirationē attracto,
partim ex sanguinis euaporatione, nutritionem acce-
dere: contra uero eum assumi per uoluntarias, prae-
cipueq; uiolentas motiones & immodicas exercita-
tiones. impellitur enim haud difficile in quamlibet
affectionem, postea uero satiscit, elanguescitq;. Alter
spiritus uitalis dicitur, in corde residens, qui ex inspi-
ratione & humorum uapore gignitur & ad cetera
membra calorē uitalē defert, atq; eis exercendi actio-
nes impertit. Sunt qui tertiam speciem addant, uo-
cantq; spiritū naturalē, qui sicco, humidoq; alimento
proportionē, teste Galeno respondet. Hic spiritus in
hepate & uenis concluditur, ut sanguinē foueat, &
in sanguine ipso halitus excitet. Adhuc inter corpus
& animā spiritus mediator est, sicuti inter agens &
patiens quaedā cōmunio, atq; qualis est spiritus, talis
est anima & intellectus. Spiritus autē naturā sangui-
nis imitatur: sanguis uero huiusmodi est, cuiusmodi
corpus. Rursus temperaturā corpus, & temperamen-
ti conditionem intellectus sequitur. Hec de spiritibus
quatenus

quatenus præsens nostrum institutum postulat, utpos-
 te corpori admixtis. Nam spiritus ille qui prius est *Spiritus corpo-*
 corpore anima dicitur, quæ motu interiore ac suo mo-
 re prior.
 uetur, æterna est & immortalis, quam quidem optis-
 mis in rebus exercere oportet.

DE REBUS NON NATVRAS

libus. Et primo de Aëre.

CAP. XI.

HACTENVS DE REBUS
 naturalibus quæ corpus humanum constitu-
 unt, compendiose sumus prosecuti. Nunc
 de rebus quas non naturales uocant, eo quod corpo-
 ris constitutionem conseruent, aut etiam immutent
 offendantq; si oportune exhibitæ non fuerint, simili
 instituto dicamus. Hæ autem sex sunt numero, aër,
 cibus & potus, motus & quies, somnus & uigilia, re-
 pletio & inanitio, atq; animi affectus. Aër itaq; nos
 ambiens (de hoc enim præsentī loco intelligendum)
 non aliter atq; cibus & potus supra id quod fouet,
 corpus nostrum pro temporum ratione immutat.
 Nec solum aër sed omnes aliæ res non naturales, qua-
 tenus calefaciunt, refrigerant, humectant, aut exic-
 cant. De aëre & eius triplici regione ubi de elemen-
 tis loquebamur, dictum fuit. Neq; compendiosa exi-
 git institutio, eadem sæpius inculcare.

DE C

78 BLASII HOLLERII
DE CIBO ET POTV.

Cap. XII.

ALTERA res non naturalis in assumptione alimentorum consistit, ex quibus corpus nutritur reficitur & restituitur. Atque eorum bonitas, mensura, tempus & distributio conueniens considerata, siquidem ex ijs recte obseruatis propitij nobis humores generabuntur: contra uero noxij. Bonitatis interea indicium in cibo & potu: ex sapore: leuitate, seu partium tenuitate, & loci delectu, ut plurimum innotescit. Mensurae etiam est habenda ratio, ut ne ultra quam naturae conueniant, alimenta ingerantur. Hæc enim plus æquo ingesta, morbum ex Hippocratis sententia gignunt: quandoquidem facultas multitudine ciborum pressa non potest concoquere. Adhæc in utroque morborum genere: nempe acuto & cronico siue diuturno, uictus ratio præscribenda, quæ morbi naturæ aduersetur. In acutis quidē, id est, quibus motus uelox est, tenuis & exquisita, modo ægrotantis uires ferre queant: in diuturnis uero uictus plenior esse debet, ut ualidæ & integre uires ad morbi uigorem consistere queant ac morbi diuturnitati pares existant. At uero qui sani sunt cibis simili qualitate utantur. natura enim similibus gaudet, sed qui morbo aliquo premuntur ad contrarium

trarium habitum trahere conuenit. Proinde humidus
 cibus temperatura humidis confert, sicuti pueris &
 mulieribus. quandoquidem nutritio fit cum cibus qui
 nutrit, corpori quod alit assimilatur. Citius autem
 assimilantur humida humidis, & sicca siccis, quem-
 admodum Galenus lib. 6. sanit. tuendæ demonstrauit.
 Cum igitur concoctio alteratio sit alimenti ad pro-
 priam aliti qualitatem. sequitur humidiores, mollio-
 resq; cibos pueris esse magis peculiare: inuenibus
 uero aridiores: contrario modo in his quos morbus
 aliquis infestat, ueluti qui feбри uel alio quodam sicco
 morbo detinentur. talibus enim uictus humidus (ut
 qui contrarius sit) omnibus est ex usu. unde Hippo-
 crates, uictus humidus febricitantibus omnibus con-
 fert: præsertim pueris & alijs, qui tali refici uictu
 sunt assueti. Est præterea tum in sanis tum ægrotan-
 tibus aliquid consuetudini condonandum. præcipue
 dum quis ualde appetit. nam uenterculus auidè illa
 amplectitur faciliusq; concoquit, etiamsi aliqua ex
 parte non conueniant. Cauendum ne ordine præpo-
 stero cibi & potus ingerantur, id enim fieret si liqui-
 dora & lubricantia, dulciaue, atq; concoctu facia-
 liora, siccis, astringentibus, & concoctu difficilioribus
 postponerentur. quæ omnia sicuti ordine, ita tem-
 pestiue administrari debent. Atq; nulla conuenientior
 seu commodior hora administrandi uictus, quam cum
 appetitus

Nutritio quan-
 do fiat.

Concoctio
 quid.

Hipp. i. aphr
 xvj.

Uictus ad admi-
 strandi hora
 conuenientior.

Victus ratio
iuxta anni par-
tem obseruan-
da.

appetitus allicit, seruatis tamen concoctionum spa-
cijs, & quibusdā præhabitis exercitationibus. Aegri
tamen in morborum accessionibus à cibo prorsus ab-
stineant. nam tunc cibus ex sententia Hippocratis
noxius est. Aliquando tamen ipsis in accessionibus
cibum dare cogimur, quando scilicet calidos & siccus
temperamento febris urget. Neq; anni partes in de-
bita & conuenienti uictus ratione negligendæ erunt.
Nam quidam cibi uere, alij æstate, alij hyeme, alij au-
tumno magis conueniunt. Vere quidem uti licebit
rebus frigidis, amaris, siccis, uentrem mollientibus. Et
cum temperata hæc anni pars potissimum sit medio-
critatem inter qualitates primas, calidum, frigidum,
humidum, siccum, obseruabimus. Aestas calida &
sicca cum sit, frigidis & humidis uti oportet, sed usu
moderato. Aestate quidē & autumno uentres difficil-
limè cibos ferunt: hyeme facillimè: medio modo in
uere. Autumno paulò plenior & siccior quam
æstate, uictu & uino minus diluto uti licet. Hyeme
uero contrarijs sua qualitate nempe cibis & potio-
nibus corpus nostrum calefacientibus & maiori co-
pia quàm in alijs temporibus. nam eo tempore uen-
tres calidissimi sunt, minus tamen bibendum ipsa tem-
poris natura humida cum sit, satis indicat. Est etiam
ex calore natiuo in ætatibus indicatio desumenda,
ueluti in pueris: qui calidi & humidi: iuuenibus qui
calidi

MED. THEOR. LIB. I. 82

calidi & sicci, senibus qui frigidi & sicci, contraria
conferunt uictus institutio, atq; pro caloris innati (ex
quo cibi appetitus) ratione nutriendum. Senes inquit *(. Aph. xij.)*
Hippocrates difficillime ieiunium ferunt: secundo lo
co iuuenes: minus adolescentes: omnium minimè pue
ri, præsertim uiuidiores & alacriores. Post cibum
cauendi sunt omnes cum corporis tum animi uehe
mentiores motus. Cauenda & uocis contentio, sed
tribuenda uentriculo iam cibū amplexo quies, ut de
bita fiat concoctio: ijs præsertim in quibus difficile
perficitur.

DE MOTV ET QUIETE
Cap. XIII.

NUNC de motu & quiete. Motum hoc lo
co intelligimus quoduis exercitiū, ut in des
ambulatione, cursu, saltationibus, luctatio
nibus, disci lactu, pilæ luctæ, armorum. & ijs quæ in
gymnasijs tractari solent. Similiter in fodiendo, me
tendo & similibus, quorum musculi & nerui robur
acquirūt. Item gestationibus, equitationibus & eius
modi. Porro cuius exercitationi commune est ut ex
se ipsa animantibus caloris augmentum excitet, nam
temperata dum fuerint exercitia, corporis spiracula
laxabunt & aperient, humores extenuabunt diffun
dentq; spiritus concitabunt, ac per corpus impellent:
G ea tamen

ea tamen conuenienti tempore & seruata mediocritate peragenda, ueluti ante ciborum assumptionem & cum externū cibum uentriculus concoxerit. nam ex cibis nondum probe alteratis, concoctisque, succi in omnes animales corporis partes (praesertim si fortia fuerint exercitia) saepissime pelluntur. quo fit, ut corpora non raro ledantur, & insalubria fiant. Nec motui seu exercitio indulgendum, nisi alui & uesicae prius ductis excrementis, ne quid ex motione eorum quae continentur, corpus inficiatur. Seruanda etiam in exercitationibus mediocritas, nam immodica exercitatione boni continuo succi aliquid adimitur aut humoris crudi in praecipuas corporis partes confluit.

Ab exercitio
quando desistendum.

Ab exercitio desistendum, ubi color ille floridus apparet, & uaporosus calor sudori immiscebitur, maxime uero si lassitudo adsit aut coloris bonitas euanescat, uel urina mutetur, quae si mediocriter rufa aut pallens cernatur exercitatione opus esse ostendit. Porro exercitatio acuta, id est cuius celeres motus sunt, corpus extenuat: contraria crassum reddit: multa corpus siccatur, mediocris obesum efficit. Considerandum etiam circa tempus, quo exercitia magis conueniant, nam ueris tempore iuxta meridiem in loco temperato: in aestate ante meridiem calore nondum exussitato, exercendum: sicuti in hyeme post meridiem in loco prius calefacto, ne quid frigus noceat. At tem-

poris uae

poris uarietas diuersum exercitij genus requirit, æstate siquidem subtilius, sic exercitationum genera alia lumbos potius aut brachia aut crura fatigant: alia spinam totam aut thoracem seu pulmones. Sub motu frictio comprehenditur, quam partibus infirmis, quo tempore laborant, adhibere non conuenit. Sunt interea frictionum sex differentię, dura, mollis: multa, mediocris, aspera, lenis. Dura cogit, constringit, densat, seu tactu durum corpus efficit: Mollis semper molle tenerumq; reddit, & liberum excrementis exitum præbet, siue exigua siue mediocris siue multa fuerit. Proinde laxiora corpora duriter, coacta uero & astricta molliter fricare licet. nam his quæ tensa sunt maxime aduersum est id quod durum efficit. asperumq; adauget: contra uero quod mollit utilissimum est. At si quis temperato corpore sit præditus, nullo modo fricandus est, imo ab omni excessu cauendus. Tandem si tribus ijs frictionum discriminibus quæ à quantitate sumuntur: nempe multa, pauca, & mediocris: tria quæ à qualitate ducuntur copulauerimus, utpote dura, mollis & mediocris, nouem syzygias absoluemus in huuc modum.

Frictionum differentię.

Multa.	{	Dura.	{	Pauca.	{	Mollis.	{	Moderata.
		Mollis.		Dura.		Mediocris.		Dura.
		Medioc.		Medioc.		Mollis.		

G 1 Multa

Multa enim & dura frictio contrahit, constringit, atq; gracilitatem præbet, Mollis euaporat seu per halitum digerit, calefacit, cutis spiracula laxat, dilatat & liquat. quibus de causis humores per corporis summas partes diffusi incalescunt, extenuantur, & liquefiunt, qui demum sponte sua dissipantur. Eadem planè efficit unctio, sed ualidius. Mediocris æqualitatem inducit, hoc est, implet diminuta, quæ si mollis fuerit, leuiter carnem remittit. Atq; mediocris uim augendi & incrassandi habet quæ si aspera, ad exteriora sanguinem trahit, quem lenis in partibus retinet. Interea mane à somno omnes qui egrotant, sicuti nec senes, fricandi sunt. Porro exercitatio instrumentarias corporis partes promptiores & morbis minus obnoxias reddit, cibos melius & promptius caloris beneficio attrahit & alterat, meatus, id est, poros expurgat & corporis ob uehementem spiritus motionem redundantiam euacuat, ad motum etiam excrementa alioqui quiescentia. Id quod sol, balneum, & ex animi affectibus ira, præstant: Insurgunt etiam ex se ipsis ad motum excrementa, si uel calefiant uel extenuentur uel in spiritum degenerent, sicuti Galenus lib. 2. de sympt. causis scriptum reliquit. At senum imbecillas partes exercere non licet. Ex cæteris quanto quisq; à senio remotior fuerit, tantò illi magis exercitanda pars infirma est. Pueri tamen quia eorum tum

rum tum humidum tum tenerum corpus est paucis frictionibus indigent, sed qui carnis augendæ causa fricantur, ijs ad summum ferè tumorem faciendæ est frictio. Est tamen uidendū, ne frictione, balneo, aliæue exercitatione, mediocritatem seu moderatam rationem excedamus: ne corporis habitus durior, molliorue plus æquo reddatur: quippe hic ab extrinsecis facile offenditur. Vbi satis exercitatum fuerit ἀπὸ θεραπείας, id est, ea frictionum portione, quæ post exercitationem adhibetur, utendum erit. Hæc duplici consilio, ut Galenus docet, suscipitur. Primum ut membra firmet, & expurget excrementa: alterum, ut lassitudinem quæ immodico exercitio solet succedere, submoueat, atq; prohibeat. Cauendum ne corpus post frictiones aliæue exercitia frigescat ac densescat, dum nulla ope externa calefit. Hæc igitur de causa non solum cum celeritate est fricandum, sed etiam quod fieri potest plurium manibus, quo nulla corporis pars nuda maneat. At si nec duram nec tardam esse frictionem expediat, oleum, cui nulla astringendi uis insit corpori fricando affuse circumfundi debet, id enim ad uelocitatem simul & molliem frictionis multum conducet & alioquin aliud secum non mediocre commodum adfert, quando & quæ tensa sunt remittit, & quæ inter uehementius laborantium fatigata sunt emollit, ubi dura frictio minime esset adhi-

Apothecia.

Libro III. cautuend.

benda. Porro extendenda in apothetapia sunt partes dum fricantur, ut quicquid inter cutem & subiectam carnem excrementorum residet deorsum per poros feratur. nonnunquam & fasciarum circumactus fieri conuenit, de quibus iam dicto loco plura Galenus scripsit. Post uigilias uel tristitiam, uel ambas, apothetapia exercitatio idonea erit: si malo absit cruditas. Est & alia frictionum differentia quæ preparatoria dicitur, hæc non solum motus tum celeritate, tum robore calorem excitat; uerum etiam habitum cogit atq; contrahit.

Nunc de triplici balneorū differentia magis usitata paucis perstringamus. Prima quidem aërea dicitur, cum quis in piscina uacua, sed optime tecta sedet, ita ut à uase in quo herbæ decoquuntur per quandam canalem ipsarum fumus ad piscinam deferatur. Altera differentia ignea dicitur quando quis super lapides ignitos desidet ad sudorem prouocandum, ut fieri solet in hydropisi & alijs tumoribus: Tertia aquea est, quando scilicet aqua nunc frigida nunc calida adhibetur, atq; pro aquarū uarietate uarijs morbis auxilio esse potest. Cæterum aqua frigida condensat, constipat, contrahit, constringit & repercutit, sicuti extreme feruida adurit: At si temperata adhibeatur & moderate calida, laxat, rarefacit, fundit & digerit. Adhæc si ex aqua dulci balnea fiant hume-

stabunt

Balnea ex aqua
dulci.

Et abunt plurimum & emollient, & suo madore caloreq; spiracula laxant remittuntq;: humores calefaciunt, extenuant, colliquant, fluxilesq; reddunt, et ex summis intimisq; corporis regionibus foras euocant, qui si tenues fuerint, eos dissipant, crassiores quos non discusserint, commouent perturbantq; adeo ut plerumq; in partem aliquam imbecillam uel morbo laborantem confluant, idq; potissimum si plenitudo quaedam uenis insit. Si uero ex non dulci, siccabunt, praesertim quando ex speciebus terrae mixturam ingredientibus constent, ueluti ex salsa, amara, sulphurea quae calefaciunt & siccant. Et aluminosa gypso mixta quae infrigidant & exsiccant. Utilitates ac commoda quae ex balneis proueniunt ferè sunt pororum apertio, resolutio humiditatum, concoctio nutrimenti, attractio ad circumferentiam, & uarij generis affectionum sedatio. Signum interea percommodum speratae ex balneo utilitatis est: somnus ab eo: è diuerso non posse à balneo dormire, nec causa nec signum est commodum, ueluti Galenus lib. 4. sanit. tuend. docet. Rursus incommoda quae ex balneis accidere possunt, sunt corporis lassitudo, neruorum imbecillitas, caloris naturalis resolutio. possunt quidem calorem contrarium naturae inducere, superfluitatesq; ad membra debilia deferre: & appetitum cibi & ueneris deicere, attamen aquae frigidae lauatio, appetitum prouocat &

Utilitates et
incommoda ex
balneis.

Signum a bal-
neo percommo-
dum.

situm minuit, Ceterum pingues & obesi ante ciborum absumptionem balnea ingrediantur, macilentique uero post eam, facta tamē cibi prius ingesti concoctione. nam qui à cibo lauantur, grauitas aut densitas dextri præcordij (ubi iecur situm est) sentire solent, quod si id contingeret dandum ilico est quod obstructum iecur liberet, ueluti est liquor in quo macerata sit absinthij coma, uel quod tum ex ea, tum ex aniso & amigdalidis amaris conficitur, & alia id genus quæ deopilandi facultatem obtineant. Abstinentum ab ijs cibis qui crassum efficiunt succum. & potissimum si tales glutinosi sint. Præterea balneum aquæ frigide non cui uis ætati conuenit. etenim qui senes sunt, aut qui uomitu, fastidio, iugilijs, reumate & huiusmodi laborant, balneum hoc obesset. Quibus autem conuenit, ijs æstatis tempore & hora quadam calidiore & opaca magis est ex usu, Solemus etiam post balneum aquæ calide, alteram temperatè frigidam aquam superinfundere, propter confirmationem caloris naturalis, qui sic ad interiora repulsus fortius se exerit ac extendit. Ceterum temperatum corpus quod augetur non est frigida lauandum, ne eius incrementum remoretur: Vbi uero abunde est auctum, iam frigide assuesciendum utq; tum corpus uniuersum, tum cutem densam, duramq; efficiat, quod sane tutissimum est aduersus noxas quæ extrinsecus eminent. In quibus porro

Balneum aquæ
frigide quibus
conuenias.

bus porro calor sua natura est adeo mordax ut fumida gignat excrementa, ijs balneum salubre est: sicuti & motus qui exiguus & lentus sit: multus autem calor aduersissimus esset. uerum illis non semel modo sed etiam bis die lauari, praesertim aestate conducet, Sunt etiam qui nisi balneis uterentur in febrem corruerent, ob fuliginosa quibus abundant recrementa. neq; ob id solum sani lauacris se committunt sed nitoris & elegantiae causa: Valetudinarij uero & laboribus defatigati refocillandis uiribus, balnea ingrediuntur. Balnea insuper dulcia calefacta Balneorum calidorum uti. rum aquarum, si media temperie sint, uis calida & humida eis inest, sin tepidiora fuerint, humida & frigida. Quod si iusto calidiora fiant calida quidem sed non perinde humida, quippe corporis exiles meatus contrahunt, unde expurgari non possunt, sed ab ijs incipiendum quae medium temperamentum obtinent. Aestus etiam qui uel ab ambiente nos aëre uel à thermis existit, eadē quae balneum efficit, ac similis ratione humores è corpore per habitum cutimq; dissipat. Ceterum apotherae pars aliqua balneo adhibita, necessaria est: ut quae duras densasq; partes emollit, excrementum putre si quod intus ad cutem euocat.

Nunc de quiete cui contrarius labor seu motus est paucis agamus. Illa non secus atq; exercituum ad sanitatem tuendam considerata. Vtrumq; enim

G s si in-

si immodice aut alio tempore quam debeat, administratur, maximo nocumento esse solet. Siquidem crudos humores in corpore parit & acceruat, utpote cum calorem extingat & excrementa procreet, quæ corpus refrigerant & humectant: si uero moderata fuerit præter id quod lassitudinem infert, uirtutem animalem, uitalem & naturalem adimit, concoquuntur enim quiete & somno semicocta.

DE SOMNO ET VIGILIA.

Cap. XIII.

Somnus quid.

SOMNVS est facultatis animalis requies, ab utili humore cerebrum irrigante proficiens. Conducit quidem ea quies ad recreandas tres uirtutes, ad irrigationem cerebri & neruorum, ad generandos spiritus, & ad perficiendum uentriculi & hepatis officium. Toto namq; tempore quo quis dormit, animalem facultatem quiescere, naturalem uero ualidius agere Galenus lib. I. de symp. caus. ostendit. Adhæc qui mediocri somno indulgent, ad omnia prompti & alacres iudicantur, sensuum quoq; uiuacitate gaudent, nam somnus (ex quo calor intro agitur) moderatè sumptus molestias & lassationes discutit, facultatem alteratricem tum in uentriculo, tum in uenis & arterijs adiuuat: & inter concoquendum uapores deferuntur. præsertim in cerebrum, qui quia

qui quidem postquam refrigerati sunt humectant, & pro humoris inculpati abundantia somnū inducunt, Ex somno etiam nutritiua & generatiua potentia suas exercent operationes, unde spermatis pruritus & ueneræ cupiditati locus tribuitur. Sed nimio somno dediti, oscitabundi, desides, graues, hebetis obtusiq; ingenij & iudicij, nec non ad ea quæ ipsis conueniunt inepti manent. Est igitur somni tam in sanis, quàm aegris habenda ratio, idq; pro temporis spacio et forma decubitus. ueluti à cœna post aliquod interuallum conuenientissimum. Diurnus autem somnus fugiendus, nisi ex consuetudine habeatur, eo quod cerebrum magis humectet, unde distillationes & alia non pauca incommoda suboriuntur, ex quibus morbi frigidi, utpote cum per id tempus concoctio non probe perficiatur. Id autem ostendunt acidi ructus & flatus, ob interruptam ante tempus concoctionē. Cæterum qui somni limitem præscripserunt, ijs septem horarum aut circiter meta fuit, sed quid certi agant, non uideo. alij siquidē maiore, alij minore pro humoris somnifici abundantia somno egent. Sed nemini ad extremam usq; saturitatem indulgere fas est. Formam quoq; decubitus non pauci sic obseruandam tradunt, ut lateri dextro prius dormituri innitantur, ne hiet ostiolum uentriculi: & ut epatis concoctio adiuuetur: postea sinistro, ut ea ratione splenis calor augeatur.

Somnus diurnus cur fugiendus.

augeatur. Sapius autem decubitus concedendus non est: ex hoc enim fit defluxus superfluitatum ad posteriora, & facultas expultrix non potest per nares & palatum suas operationes exercere, unde apoplexia, neruorum resolutiones, & similia: præterea inflammatione uiscerum internorum laborantibus & accessionum principiis commodum non est, quia calor qui intrinsecus ex sopore agitur, sanguinem attractum inflammat, & crudos succos digeri non sinit. In alijs autem morbis, ubi somnus conuenit, si in alterutrum latus ægrotus iaceat, id bonum ex Hippocratis sententia iudicandum. Illud enim robur facultatis indicat per musculos firmantis corpus: sicuti rursus debilitatem, ubi cubare æger in latus non queat, quando scilicet alterum latus fit impotens ad alterum ferendum, quibus dorsum fortius existit. Inspecere etiam oportet si à somno sese æger melius habeat, id enim bonum est, si contrariò eueniat malum. In quo enim morbo somnus laborem facit, mortale si uerò uiuet: non mortale. Rursus cum uirtutem animalem somnus laxet, ieiunis & fame laborantibus minime conuenit: Repletur inde caput fumis & euaporationibus eleuatis ab excrementosa materia. quæ in uentriculo & in intestinis retinetur. Somnus igitur & uigilia si modum excesserint mala esse iudicat Hippocrates Sic in 6, Epid Somnus, labor, cibus, potus,

Progn. xvj.

Aph. liij. lib. ij.

potus, uenus, omnia mediocria inquit esse debent.

Vigilie quæ supra modum excedunt, cerebri tem-
peraturam demolliuntur, ac uirtutē animale[m] dei-
ciunt, cruditates ac grauedines efficiunt, generantq[ue]
morbos acutos, phrenitin, manian, melancholiam &
id genus. Atq[ue] ut per somnum calor intro reuocatur,
sic per uigilias foris mouetur, unde cordis spiratio-
nem multo fortio[re]m dormientibus, propter reuocati
caloris abundantiam, quam uigilantibus inesse cer-
tum est. Similiter cum per uigilias calor in ambien-
tem aërem foris dissipetur, spiritus etiam suis obeun-
dis functionibus parum sunt idonei. idcirco dum quis
uel mœrore uel sollicitudine seu alio quouis affectu
somnum subire non potest, in primis mœstitiam quæ
affligit pro uirili deponat, mox suauium sonoru[m] au-
scultationibus mentis considerationem applicet. Ego
quidem non infrequenter ad littus aquæ (pacato des-
censu) fluentis uel sub ramosa quadam arbore alioq[ue]
opaco quodam loco me quieti tradidisse animum in-
duxi, alioqui indulgere somno uix potuissem, quando
scilicet studio alijsu[m] occupationibus detinebar. Con-
ducunt etiam balnea uespertina facta prius assump-
torum concoctione: Item alimenta quæ humectandi
& infrigidandi simul facultatem obtineant, ueluti la-
ctuca, pisces facile alterabiles & huiusmodi.

Huc referuntur somnia, quæ imagines sunt per
somnum

somnum factæ, utpote quando hi spiritus qui cogitationum instrumenta dicuntur, in cerebro discurrent & ueluti effigiem quandam representant. Quibus itaq; cerebrum est calidum & humidum, ij pluribus & uarijs monstrosisq; somniorū generibus magis uexantur, propter calorem uirtutem animalem excitantem & humorem caliginosum sensim efficientem. nam quæ in somnijs apparere uidentur magna ex parte corporis affectionem humorumq; naturam, plenitudinem, defectum ac qualitatem ostendunt. Veluti qui ægre se moueri putant, aut graui onera gestare, aut in ea re impediri quam se efficere somniant, animalem facultatem plenitudine aut crassitie aut uiscositate humorum deprauatam habere coniiciendum. Contra qui se uolare uel currere ocijssimè putant, humores paucos eosq; leues minimeq; excrementosos habere uerisimile est. Et qui nocturnas ueneris imaginationes patiuntur, semine genitali abundare. Ad eundem modum qui in locis foetentibus, sordidis, immundis, se uolutari existimant, eos in corpore materiam putrem corruptam ac grauiter olentem habere suspicio est. Quemadmodum qui in locis odoriferis & benè olentibus se esse uidentur, materiam probam & inculpabilem. Igitur ex humorum redundantia (unde spiritus mouentur) ex eo quod exuperat iuxta temperamentum imaginationes huiusmodi efficiuntur, ut san-

Rx somnijs præ
legia.

ut sanguinei ob letam & aëream crasin, de rebus rubris, pulchris & amoenis somniant: & frequenter se uolare existimant. Cholerici de igne, bellis, iurgiis & contentionibus. phlegmatici de aqua, glacie, niue, & eiusmodi. Melancholici de terra, rebus grauidis tenebrosis & tristibus aut timorem inducentibus, quando scilicet falsæ rerum species (quæ phantasmata dicuntur) dormientib. obijciuntur. unde Tibullus.

Somnia fallaci ludunt temeraria nocte.

Et pauidas mentes falsa timere iubent.

In summa humorū qualitates similia sibi somnia gignunt. Similiter sonitus aurium flatu adeste indicant. Affectiones porro corporis animus sentit, nisi in rebus externis, tunc enim somnia corporis affectionem non significant. Proinde cum corporis ipsius ualitudinem tam prosperam quam aduersam per somnia uoluerimus dijudicare, interrogandus qui somniavit, an curæ siue alia quædam quæ concupiuerit consueueritq; præcesserint. quod si horum aliquid fateatur de corporea affectione ex somniis rectè iudicari non potest. Ceterum infantuli non somniant, ut qui plurimum calore agitentur, crassoq; ac indefecato adhuc uapore abundant, Quemadmodum nec statim à cibo & potu caput replentibus & agitantibus ijs qui dormiunt apparent somnia, sed maxime post mediū somni, ubi uapores sensum mittuntur, atq; subtiliores euadunt.

DE RE.

Infantuli cap
non somniant.

DE REPLITIONE ET INAN-
tione. Cap. XV

Plenitudo quid

PLENITVDO quæ Grecis *πληθος* & *πληθωγή* dicitur, succorum est utilium in-

Plenitudo quā
do fiat.

animantis corpore (præsertim in uenis atq; in corporis habitu) redundantia. Fit autem quando humores æqualiter adaucti qualitate, aut quãtitate excedunt: uel cum exiguum quendam excessum unus inter eos accepit. Quæ autem plenitudo qualitatis uitio peccat, fit quoties immodicè tenues uel crassi humores redduntur, aut cum bilis præter modum effertur, pituita uel melancholia existente frigidiore. Quantitatis uero uitium est, quum succi omnes, seruata qualitatis mediocritate, supra iustam & naturæ congruentem mensuram accumuluntur, ac crescunt, adeoq; exuperant ut corporis uniuersa moles intumescat, & uenæ supra modum plenæ tensionis sensum inuehant. Huius plenitudinis duo sunt genera ut etiam in commentarijs Aph. Hippocratis scripsimus. Vnum quidem secundum robur, seu ad uires & quando scilicet æqualis humorum multitudo adaucta corpus afficit, quæ quidem purgatione eget. interdum & modica sanguinis missione. Si interea non afficiat, nec morbus adsit, ea plenitudo commodius imminuetur in ædijs, moderata exercitatione, atq; ijs quæ concoctionem

Aph. iij. lib. j.

coctionem iuuant: maxime autem si sanguis nulla corruptionis labe confusus sit: Alterum plenitudinis genus, simpliciter, absolute & ad uasorum capacitatem dicitur, nempe cum purus sanguis reliquos in permixtione succos magnopere uincit, adeoque exuperat, ut uenas quoquouersum inflet, ac distendat & per sanguinis missionem (non enim aliud uacuandi genere tuto demi potest) imminui exigit. Porro plenitudinis notæ seu signa ex tempore præterito, præsentis, & futuro desumuntur. Ex præterito quidem. Vt si uita ociosa fuerit, & uictus ratio aliqua ex parte quã ante liberalior. Item excrementorum suppressio. Ex præsentis uero ut si totius corporis adsit grauitas uel partium quarundam tensio. quod quidem actionum imbecillitas seu uirtus infirma indicabit, dum id quod illa mouet impeditur. Præterea lassitudinis status, grauitas sensus, ulcerosa dispositio, uenarum tumor, interdum etiam rubor (sed hic si extrinsecus eueniat) utpote ex sole, balneo, exercitatione, itinere, calore, ira, febris acuta, & similibus, iam non sanguinem indicat, sed ab his, si æqualis totius corporis dispositio fuerit, rubor sanguinis copiam in corpore animantis ostendit. Ex futuro, quod hoc uitio laborantes, si euacuentur, conualescunt. Atque plenitudinis ex præpollentis humoris colore cognoscetur. Siquidem rubicundus color sanguinem: subpallidus bilem flauam: &

Plenitudinis
signa:

H qui su

qui supra naturalem habitum albescit, pituitam : quemadmodum nigrescens, bilem atram abundanter indicabunt. Nihilominus in singulis sanguinem co-
auctum esse potest, nam si sola pallida bilis aliquando superauerit, sicuti in morbo regio, non adhuc plenitudo, neq; ad hanc dispositio est, sed uitiosus tantum humor. Eodem modo de pituita & atra bile dicendum. Ad hæc plenitudinem siue ex uiribus siue ex continentium capacitate, unus humor efficere nõ potest, quod Galenus ijs uerbis indicauit. Vbi corpus inquit uel flaua bile, uel nigra, uel pituita, uel serosis humoribus refertum fuerit, eum habitum cacochimiam, quasi succorum uitium, & non plethoram appellabimus. Nec facefcere negotium cuiquã debet quod idem Galenus lib. 2. de comp. Med. secundum locos hunc in modum scripsit. Fit autem plethora quatuor humoribus proportionẽ auctis, aut solo sanguine. Hic de impuro & alijs humoribus mixto intelligi uoluit. Venarum siquidem sanguis nequaquam simplex est, sed ex pituita, utriusq; bilis, & sanguinis puri permixtione conflatus, atq; hos etiam succos ufi dicendi, sanguinis appellatione designamus.

**Euacuationum
differentiæ.**

Nunc de inanitione seu euacuatione dicendum. Euacuationum igitur differentiæ duæ potissimũ constituantur. Altera uniuersalis quæ cõmuniter ab uniuerso corpore materiam subtrahit : sicuti in sudore seu transpiratione.

seu transpiratione insensibili, sanguinis profusione,
 uomitu & alui subductione. Sudor seu per cutem Sudor unde dicitur
 euaporatio, primo è corporis habitu ducit, secundo è cat.
 uenis & arterijs grandioribus. Postremo ex uisceribus
 & intima corporis regione, & est succorū qui
 in uniuerso corpore abundant, nota. Sanguinis pro-
 fusio primum uenas exhaurit & arterias illis anasto-
 mosi coniunctas. deinde corporis molem, ipsaq; uis-
 cera ad primas usq; uenas progressionem faciens.
 Vomitus primum quidem, ac maxime uentriculum, Vomitio quas
 postea si persistit, uiscera & uenas maiores, ultimo partes expur-
 corporis habitum expurgat. Sed ijs qui pectus atri- get.
 ctum habent non conuenit, sicuti Asthmaticis, phthi-
 sicis & Empijs, nec non ijs qui peripneumonia labo-
 rant. Conuenit tamen uomitus gracilibus & facile
 uomentibus, quemadmodum Hippocrates indicauit. Aph. liij. libi
 Frequens interea uomitus, auditui, dentibus & inue- v.
 teratis capitis doloribus obest. Alui deiectio primum Alui deiectio
 & abunde intestina, uentriculum, uiscera, primasq; unde uacuet
 uenas, quæ Mesaraice dicuntur, deinde uenas maio-
 res, postremo minores & corporis habitum euacu-
 at. Sic & particularis euacuatio partem aliquam
 excrementorum onere pressam, leuat. Itaq; cerebrum
 & nares per palatū expurgantur, pulmones & pe-
 ctoris uitia per tracheam arteriam dum tussis exci-
 tatur. Arenule & pus per urinas. Vterus & he-

H a morrheia

morrhoides, sanguinis profusione. Atq; frequenter euacuatio sua sponte & citra ullam medicationem, sed naturæ beneficio, uel imbecillitate sequitur: Interdum externi subsidij ope quæ bipartito scinditur, uel enim legitima est excretio, quantitate uel qualitate negotium facessens exterminat. Altera uero huic contraria est. Vtilem enim & qui in nullo uitio est, humorum culpa seu inscitia medentium excludit. Nobis interea prospectum esse debet ut eos duntaxat humores euacuemus qui uiribus incommodant. Atq; uarijs subsidiorum generibus nonnunquam opus est. sicuti scalpello, aut hyrudinibus, aut medicamentis, quæ ora uenarum referent: Interdum medicamento purgante, quo noxijs humores è corpore eliciantur, deijcianturq; siue id uomitione, siue deiectione fiat. Sunt etiam inuenta ad hoc auxilij genus exercitia, frictiones, balnea, præsertim nitrosa, sulphurea aut bituminosa. similiter æstus & motiones & ex accidenti inedia. Rursus Errhina quæ uocantur, medicamenta, cerebrũ per nares expurgant: Apophlegmatismi per palatũ. Bechica medicamenta pectus & pulmones: sicuti diuretica renes & uesicam: Et hysterica uteri menses. Hæc medicamenta à loco per quem ducunt denominationem obtinent. Aluum insuper resoluunt balani & clysteres. Sed quia in usu exercitationeq; medendi uniuersalem euacuationem particulari

ticulari præferimus, primum à uenæ sectione, ut quæ
 omnium euacuationum simplicissima, auspicamur.
 Nec interea uenæ sectio, sicuti purgatio uitiosum
 quempiam humorem seligit, detrahitiq;: sed tam pu-
 tridum quam benignum. Alia tamen est ratio in cri-
 tics diebus, ubi infestum humorem concoctione præ-
 paratum ab alijs natura segregat & excludit. idq;
 sensim & per uias idoneas. quo tempore si uena in-
 cideretur, neq; in eam fortasse uiam traduceret, neq;
 tantulo tempore dum sanguis sua ui fertur, uitiosum
 humorem secernere ualeret. Porro sanguinis serum
 per summa innatat, urinæ haud absimile. Bilis te-
 nuis & florida concreti sanguinis pars fit suprema:
 Melancholia subsidet: Sanguis rubentior & pituita
 pallidior. atq; hæc quidem conspiciamur dum san-
 guis integer est & laudabilis. Ex quibus notum esse
 potest omnium humorū, qui in uenis reconditi sunt,
 incisa uena, æquabilem uacuationem fieri, quæ ad in-
 digentiam uniuersum corpus euacuat, non quidem
 æqualiter, sed ualidius partes quæ è directo & proxi-
 miores, quam quæ è transuerso & remotiores, quas
 potius reuellit & alio transfert. At uero purgatio
 quæ uel spontè interioreq; motu procedit, uel exter-
 no impulsu & medicamentorum administratione,
 non sic æquabiliter omnes, sed quempiam corruptum
 humorem (nunquam tamen sanguinem purum &

Humores in san-
 guine quomodo
 discernendi.

Purgatio dupli-
 citer fit.

syncerum) euacuat. Ceterum cui totus uenarum humor biliosus seu ardentissimus aut totus in Melancholicum uersus apparet, secunda uena non est, quemadmodum neq; ijs quibus magnopere pituitosus & crassus humor in uenas & corporis habitum effunditur. Sic enim Galenus prohibet uenam incidere cui sanguinis moles plurimum à qualitatis mediocritate recesserit, aut cui bonus idemq; purus sanguis & paucus est, reliquis uero succus plurimus. quocirca in simplici cacochymia non uenæ sectione sed purgatione

Quando purgatio sectioni uenæ præferri debeat.

utendum. Rursus in morbis ex plenitudine cum robur aut ætas non patitur, purgatio uenæ sectioni præferri debet. etenim uena intempestiue secta spiritum cum sanguine exhaurit, ingenitum calorem eripit, & dissipat. principes partes refrigerat & extinguit. Hinc hydrops, cruditas, cachexia, aliaq; incommoda.

Sanguis euacuatio quando fieri non debeat.

Vbi igitur alius humor sanguinem exuperat, sanguinis euacuatio fieri non debet: ueluti in ijs qui ictero, uel febre tertiana, uel melancholico affectu, siue naturali, siue acquisititio laborent. Sed humoribus quando uitium ex plenitudinis & cacochymie permixtione conflatum inest, uena secta est ex usu: graue enim & periculosam affectionem tuto & repente innuit, qualem nec inedia nec exercitium, aut aliud uacuandi genus posset expellere. Porro quum impuriore sanguine ex plenitudinis & cacochymie permixtio-

ne uenæ implentur, utrumq; euacuationis genus conueniet. Vt si adsit melancholica plenitudo, qua naturæ inclinatione sanguis in Melancholiam uergat propendatq; aut influentis Melancholiæ uitio contaminetur, antequam expurgetur, uenæ sectione erit minuenda, parcius tamen quam quæ biliosa est. At pituitosa plenitudo omnium maxime sanguinis emissionem recusat, eo quod uirium imbecillitate & frigore non mediocri polleat. At cum plenitudo seu bilis alterutrius fuerit, seu pituitæ, modica cacochymia labefactatur, sanguis quidem in primis detrahendus, tum alius moderatè deijcienda, ut noxius humor, qui superest expurgetur: Sin uerò maior cacochymia compareat, tum item sanguinis missioni primas concedemus, sed in minori quantitate, mox largius purgandum: quod si in uasis plenitudinis & cacochymiae fuerit æqualitas, ab utrolibet uacuationis genere, nullo delectu habito inchoandum. Verumtamen cum nimia uasorum plenitudo obstructions excitet, atq; idcirco purgationibus obsit, cum etiam medicamentum ex calore & trahendi facultate humores exagitet perturbetq; corpus: id sane in grauissimum discrimen pectoricos adducit. quocirca tum uenæ sectio præmittenda est: si uerò par insit remediorum necessitas, ipsa medendi ratio ab eo exordium ducere Galenus iubet, sine quo alterū tuto exequi non potest.

Venæ sectio
quibus morbis
conueniat.

Atq; imminuta plenitudine quæcunq; putrida aut aliter inquinata superant, ac resident per aluum, urinas & sudores exhaurire tentandum. Venæ sectio igitur morborum omnium quicunq; ex sanguinis affluentia & ubertate, uel ex quauis illius eruptione originem traxerunt, proprium est remedium, siue præsentēs fuerint morbi, siue tantum immineant. Eius generis maxime sunt febris synochus, tum ea quæ citra putredinem ex sola fit sanguinis effervescentia, tum quæ ex putrescente accenditur. Sic & phrenitis, ophthalmia, parothides, angina pleuritis, peripneumonia, iecoris, lienis, renum, pudendorum, uteri, inguinum, brachiorum, crurum, articularum, omnium deniq; tum internarum, tum externarum partium inflammationes, quæ Græcis φλέγμοναι nuncupantur. Fiunt autem dum aperta uena, rupta uel exesa, delapsus sanguis & abundantior congestus in tumorem extuberat. Istis finitimi sunt sputum sanguinis, incipiensq; tabes, sanguinis uomitio, & è naribus, utero, uel hæmorrhoidibus eruptio, atq; per horum initia statim opposito loco secta uena fluxionis impetum sistit, reuulsionisq; nonnihil ex affecta parte reuocat. Est igitur uenæ sectio proprium ac conueniens istis affectionibus remedium, ut quæ ex boni laudabilisq; sanguinis plenitudine ortus sui primordia acceperit. Qui uero morbi impuriore plenitudine

nitudine emerferunt, ut sunt istis plurimum cognati :
 ita & uena secta curari desiderant . In quo genere
 sunt febres putridæ tum continuæ tum intermittentes .
 quando scilicet putredinis atq; obstructionis præ
 cipua causa fuerit immodica plenitudo seu repletio :
 In hoc etiam genere consistunt capitis & aurium
 pulsans dolor, lethargus, uertigo, apoplexia quæ
 dam & Epilepsia, acris mordaxq; fluxio, cordis
 quædam palpitatio, arthritidis calida, & quæcunq; ad
 horum naturam pertinent . Sed in hac uerborum se
 rie, hæc febres duntaxat intelliguntur, quarum causa ex
 plenitudine nascitur . atq; in his saluberrimum est ue
 nam incidere . Cæterum quoties obtigerit infartum
 (ex quo febres accenduntur) alijs quibusdam ex cau
 sis enasci, nulla profundendi sanguinis necessitas
 compellit . Interdum citra multitudinem, uel eti
 am in penuria, uena inciditur dum à causis externis
 (quales sunt cõturbatio, dolor, ardor) in aliquâ parti
 culâ sanguis rapitur, & incumbit . tunc phlegmatis
 periculû imminet . Item in morbis consuetudinarijs,
 quæ modica plenitudine corripiuntur, anteuertere
 oportet & uenæ sectione prohibendû ne morbus fiat,
 sed multo adhuc magis cum immodica plenitudo for
 midinem & discrimen iniicit, uel ruptionis apertio
 nisq; uasorum, uel suffocantis obstructionis, sanguis
 omni abiecta cunctatione emittendus, tametsi non =

dum egrotet homo : maxime uerò si qua mariscarum
aut mensium aut narium , sanguinis consueta eua-
cuatio substituerit . Intemperantes & uinosi , phlebo-
tomie fructus & commoda minimè sentiunt . quin-
imo plerumq; ab ea leduntur , dum bidui triduiue
spacio sese magis quam ante crudioribus succis im-
plent . Tantum igitur momenti ac ponderis obtinet
moderata uictus ratio ad morbos deuittandos curan-
dosq; ut citra hanc nullius subsidij sit uenæ sectio .
Neq; uero sola missio sanguinis plethoram subtrahit
& diminuit , sed etiam balneum , frequens exercita-
tio , frictio , unctio calida & inedia , quibus certe om-
nibus summa uis & facultas exinaniendi tributa est .
uerum ijs non citra delectum utemur . Quæcunq;
enim plenitudo maxima fuerit , & uenas quoquo-
uersum distendit : aut moderata quidem , sed quæ uel
febrem uel phlegmonem præsentem iam habet , aut
quæ ex mensiū hæmorrhoidarū & huiusmodi eru-
ptione suppressa proficiscitur , ea nec exercitatione
nec multa frictione , unctione calida , aut balneo sine
discrimine curari potest . Hæc enim uacuandi genera
humores exagitant , pariter fluxionis impetum exci-
tant ac mouent , morbosq; ex plenitudine inuehunt
& augent . Neq; præterea inedia urgentibus illis uti-
liter & ut decet repente succurrit , ut quæ non nisi
tempore & dierum numero exinaniat . Adde quod
morbis

morbis presentibus inedia uigilias generet, adfertque
 inquietudinem, rosiones, nauseam & incendia: unde
 ad morbum plerumque addit & uirium deiectionem.
 Itaque ad unius phlebothomiae facultatem confugien-
 dum, quae intrinsecam molestiam prompte celeriterque
 uacuat, humorum acrimoniam reprimit & refrige-
 rat, illis uiribus aut nihil aut minimum offensis. Hip-
 pocrates morbos iam insilientes seu imminentes san-
 guinis missione anteuertere docet. Non illorum in-
 cursum, appulsumque expectare. Simili ratione Gale-
 nus ex Ephemera febre ab obstructione in synocha
 simplici, nullaque putredine implicata, sanguinem co-
 piosum trahit antequam materia putrescat. Eadem
 aut fortasse maior purgandi ratio in morbis ex ca-
 cochymia natis, presentibus quidem necessitas, im-
 minentibus utilitas ac securitas. Incidimus interdum
 uenam non morbi ratione sed causa uel symptoma-
 tis magnitudine: ueluti si in tumorem siue aquam
 intercutem, seu alium quendam frigidum morbum
 aliquis ex haemorrhoidum retentione aut menstruis
 suppressis inciderit: eo quod in uenis copia sanguinis
 affectum fouet, & quibuscunque potest modis exag-
 gerat. Plerumque igitur frigidus morbus egrotum sol-
 licitat, in quo solius causa gratia, ut dictum est, ue-
 nam incidimus. Causae etiam in exquisita tertiana
 depellenda rationem obseruamus. Haec enim tametsi
 febris

Venam non
 morbi ratione
 sed causa in-
 terdum inci-
 dunt.

febris est, uenæ sectionem minimè recipit. Sanguinis enim penuria & inopia inest. bilis ubertas & copia, quæ tanquam causa purgationem, non uenæ sectionem, desiderat. dysentericum, nec non lientericum alui profluvium sæpè cohibuit secta uena interior dextri cubiti: atq; tum causa in iocinore residebat, ex qua calidiore bile effusa uentriculum aut concoquendo interpellabat aut præpropere deijciendo lacepscebat. Interdum etiam tum morbo tum causis prætermisissis, quando symptoma quoddam perurget uenam tundimus. sicuti cum sanguis è naribus uel utero immodice prorumpit ad reuulsionem. Adhæc in febribus ardentibus, cum uehemens æstus uel sitis uel uigilia, ægotantem grauiter affligit, etiam si nulla plenitudinis sed sanguinis pauci & impuri nota existat, magna ex parte uenam incidimus, ut inde compresso ardore symptomatum sæuitia immitescat. Acerbi dolores, spirandi difficultas, huiusq; generis multa symptomata plerumq; ad sanguinis detractionem compellunt, quamuis nec morbus nec causa exposulet, quo consilio in asthma interim uena secatur, multoq; magis in pleuritide & angina, quam uel bilis, uel pituitæ uis & affluentia produxerit, Nec tamen ex quocunq; morbo uel causa si grauius symptomata adsint sanguis continuo mittendus. Absurdum enim esset in nephritico aut colico dolore, paralyti, cruditate uenæ

Venam non morbi ratione, sed causæ interdum incidimus.

Sanguinis missio in quibus morbis non conueniat.

tate uentriculi, hydrope & eiusmodi sanguinem mittere: sed in his duntaxat affectibus qui uel ex plenitudine initium sumpserunt, uel ex cacochymia quæ nequeat medicamento purgante statim & conuenienter detrahi. Itaque uasorum simplex cacochymia quæ purgationi cessura non est, urgente symptomate secta uena tolli potest. Hæc quidem tum temporis uiribus magis quam purgatio incommodat. uerumtamen ab impendenti periculo liberat. Duo autem obstant & impedimento sunt, quo minus facile cacochymia purgatione tollatur, unum quidem liquidum corpus & ad expellendum minime expeditum. Alterum cum noxijs humor uias medicamenti diuertit, seu cum pars affecta longè à uis purgationis seposita est. Porro si frigida pituita destillatio ex cerebro per ceruicem in humerum, latus & musculos fiat adeo ut pleuritidem excitet: similiter in fauces, pulmones, quæ aliquanto suffocationis periculum infert, quamquam humor frigidus sit, eiusdem tamen lateris secta uena interior nonnunquam subsidio est, & ex discrimine eripit. Est igitur in uenarum (quæ uariæ & multiplices existunt) præcisione delectus non mediocris adhibendus, qui omnes ex affecta partis situ, affectus magnitudine, & ex eius præsentis constitutione ostenditur.

Affectus quidem duplex est, uel enim nunc irrumpit
& illabitur

Affectus duplex.

Et illabitur impetumq; facit, Et tunc opposito loco
 uenam tundimus, ut fiat humoris reuulsio: uel impe-
 tus iam conquiescit, humorq; impactus iam parti in-
 hæsit, Et tunc propinquam uenam aperimus, ut fiat
 humoris illati deriuatio. Laudantur humorum cur-
 sus omnes, qui hoc modo per directum fiunt: aliter
 cum oblique in transuersum feruntur tanquam natu-
 ræ uim Et concitationem indicantes, improbantur.
 Pleuritidi dextræ nequaquam contrarium est latus
 sinistrum, sed inflammato cruri dextro contrarium
 est sinistrum. Hic enim communis Et directa uena-
 rum societas per quam sinistrum crus incisum euocat
 è dextro: At uerò è dextro latere nulla uena rectis
 fibris in sinistrum concedit. nam hic contraria prohi-
 bemus quæ in eiusdem recto processu quàm longissi-
 me sita sunt. Proinde unius lateris secta uena, alterius
 pleuritidem non adimit. Oportet igitur Et naturæ
 ratione Et Hippocratis consilio, uenam secare ab eo
 latere quod dolore sit affectum. Nec uero non solum
 in dextra pleuritide, uerum etiam in inflammatione
 iecoris (cui omnes uenæ sociatæ iunguntur) interio-
 rem cubiti dextri uenam tundimus, qua non compa-
 rente, mediam: si nec ea se profert, ad humeralem con-
 fugere melius est quam ad dexteram aduersi brachij.
 Quum mox ab emissio sanguine inflammationis do-
 lor placatur, si postea nullo ægroti uel assidentium
 errore,

Sanguinis non
 satis extracti
 in inflammatione
 agnum.

errore, recrudescet, signū est non satis sanguinis sub-
ductum esse. Quare quod deficiebat supplendum
erit, eadem uena de integro cāsa: Sed tantisper inter-
mittendum est dum aliquid humorum corporis remi-
gret in uenas, quod non ante quartam horam fieri
proditum est. Adhæc si plenitudo humoris biliosi la-
be contaminetur, interior cubiti dextri, uena tun-
denda: Sin Melancholici uitio perfunditur, sinistri:
ita quidem flagitante lienis situ. Quum uero ex cru-
dorum humorum colluue subortam plenitudinem
cognouerimus, ex utroque cubitu detractionem fie-
ri nihil prohibet. Eadem prorsus lex & in febrium
curatione obseruanda, siue ex continuarū siue inter-
mittentium sint genere. Quapropter Synochus tum
simplex tum putrida, & febris ardens & pestilens,
item tertiana & quotidiana tum assidua tum inter-
mittens, similiter & semitertiana, uenæ sectionem ex
interiore dextri cubiti postulant. Quartana uero
quomodocunq; progrediatur interiorē etiam sinistri
brachij tundi efflagitat. Interim per febres putredo in
has aut illas uenas sese magis infert, idq; citra phleg-
monem insignemue obstructionem, quod inde intelli-
gitur, dum per februm accessionem aut excandescen-
tiam. Alijs capitis & temporum arteriæ pulsant,
dolentq; uehementer, alijs pectus oppressum quasi
animam intercludit, alijs lumborum grauitas crucia-
tusq;

tusq; fatigat, alijs alie partes multo grauibus afflic-
 tantur pro ut putredo magis incumbit. Interea quæ
 eo febrium genere torquentur, in ijs secandæ uenæ
 delectus est habendus, qua parte afflicta pars magis
 quam reliquum corpus leuetur. quocirca si per has fe-
 bres caput male habet, tundenda est uena in cubito
 media, si pectus, respirandiq; partes, interior: si uero
 lumbi, uel interior cubiti uel inferior, in poplite aut
 malleolo. nam renum lumborumq; regio ambigit.
 Ex partibus quæ supra clauiculas sunt, perspicue re-
 uellit & uacuat incisa uena humeraria, celerius uas
 lidiūq; in cubito, tardius uero & segnius in eo manus
 ramo qui inter pollicem & indicem decurrit. Ex his
 uero quæ inter clauiculas & renes posita sunt, reuel-
 lit secta interior celerius & cum maiori ui in cubito,
 tardius uero & segnius in manus ramo qui inter an-
 nulare & minimum digitum porrigitur. Ex utrisq;
 reuellit uena media, siquidem ex communibus illa hu-
 merariæ & interioris ramis coagmentata & confla-
 ta est. Subter renes in quacunq; parte sint affectus
 secta in poplite uena maiore impetu & celeritate
 reuelluntur, lentius uero & infirmius, secta in mal-
 leolo. Phlegmone quæ rectos abdominis musculos
 uel supra umbilicum inuasit, retrahetur aperta in-
 ferioe uena. Quæ uero colum intestinum apprehen-
 derit (quamuis subter renes sit) reuelli tamen debet
 secta in-

secta interiore cubiti: quod uenarum ex Anathomæ origines deriuationesq; commonstrant.

Sed nunc singulas uniuscuiusq; partis affectiones persequamur. Capitis igitur ex plenitudine affectus, tum interiores tum exteriores, siue initium faciant siue magnitudinem summam impleuerint, reuellit secta in cubiti flexu humeraria uena, dextros quidem dextra, sinistros sinistra. Phrenitides & deliria, & apoplexiæ atq; uertigines, præcisis quæ pone aures sunt arterijs deriuantur. Qui priora capitis prehenderunt affectus, deriuantur aperta frontis uena: qui uero occiput & posteriora tenent, cucurbitulis ceruici humerisq; adhibitis, aut incisa uena puppis. Oculorum inflammationes & acres lachrymæ, primum eiusdem lateris humeraria est tundenda, deinde humeri ceruicisq; cucurbitulæ affixæ retrahunt inhibentq;. Deriuantur autem incisa uena, quæ in maiorem fertur angulum. Auribus inflammatis & parotidibus post humerariam secanda est uena sub aure. Gingiuarum maxillarumq; ac dentium calidiores affectus primum humerariæ uenæ: deinde earum quæ sub labijs extant sectionem poscunt. sicuti angina post humerariam earum, quæ sub lingua cernuntur. Pulmonum inflammationem reuellit pariterq; deriuat interior cubiti sinistri potius quam dextri. quandoquidem pulmonum uenæ ex dextro cordis sinu prodeunt.

I Eadem

Eadem ratione sanguinem tuſiſſendo reiſcientibus :
 item tabidis & palſitatione cordis laborantibus &
 id genus alijs effectiōibus, ſuccurritur. Pleuritidi
 tum interiori tum externa, ſimiliter pectoris & dia-
 phragmatis inflammationibus & ulceribus ſanguini-
 nem ſputo fundentibus, interior eiſdem lateris ſecta
 uena reuellit ac deriuat. Tumores qui uel axillas uel
 humeros male habent, niſi ad brachij flexum pertin-
 gant, eandem curandi rationem ſubeunt. Iecore in-
 flammato grauiterq; oppreſſo, interior dextra ſcin-
 ditur. At uero male affecto lieni ſuccurrit interior ſi-
 niſtra, in cubito quidem ualidius, in manu uero lan-
 guiduſtuſa. Deriuationem in ijs cum iam fluxio ſubſi-
 ſſit, Galenus cucurbitularum ope complet, quæ dex-
 tro Hypochondrio imprimantur: ſi iecur, dextro:
 ſiniſtro uero, ſi lien laboreſcit. Recens renum inflam-
 matio quam copia ſanguinis comitatur, ex interiore:
 uena cubiti reuellitur, dextra quidem ſi ren dexter:
 ſiniſtra ſi ſiniſter affligatur. Cum uero non immo-
 dica plenitudo premit, tutius ualidiusq; ex inferiori-
 bus reuulſio adminiſtrabitur, quæ è directo ſunt, uel
 in poplite, uel in maleolis. Per uteri affectus ſi men-
 ſes præter modum effluant, uena cubiti interior im-
 petum coërcebit, ſurſumq; retrahet: quemadmodum
 & cucurbitula ſubter mammæ infixæ. Suppreſſori
 autē menſes uena in poplite aut maleolo caſa, mouet.

Profluunt

Profluentes affatim hemorrhoides, secta in cubito uena supprimit: suppressas diducit & euocat secta in maleolo. At si qua inflammatio uel podicem uel partes obscenas uel uesicam, uel alterutrum inguem infestarit, modo non uenenatae cuiusdam pernitiei paraticeps ea fuerit, ex superioribus cubiti uenis multitudo submouebitur inhibebiturq; fluxio, secundum quam ex inferioribus (si magna premat necessitas) particularis reuulsio, deriuatioq; fiet. Similis est omnium quae crura inuadunt inflammationum ratio. quoties enim ingens adest plenitudo, effrenataq; fluxionis uis & incurisio, ex cubito sanguis primum: tum si non respondeat, neq; par sit, ex crure uel pede effundatur. Ceterum si ex longa consuetudine fluxuantes hemorrhoides cohibeantur, plenitudinem inuehunt. Galenus podagram arcet secta cubiti uena: Comitalem uero morbum, apoplexiam, & uertiginem, incisa uena poplitis uel malleoli.

Nunc de sanguinis mittendi quantitate agamus. Morbi igitur omnes supra enumerati uenae sectionem desiderant, dum modo suo genere magni & uehementes extiterint, aut si causa quae humoribus inest, multum accreuerit, uel dum symptomatis cuiusdam seuitia premit. Expendendum semper uiriani robur. siquidem omnium uacuationum uiribus maxime officit, quae sanguinis sit detractio. itaq; antea

1 1 quam

In sanguinis
emissione quæ
consideranda.

quam sanguis effundatur, duo hæc adsint. morbi magnitudo & uirium robur. Morbus primum magnus ac uehemens intelligitur ex genere: nam cuiuscunque partis sit phlegmone grauior deteriorque censetur, quam simplex illius intemperies. deinde ex partis usu atque præstantia, si ex principum partium est ordine, ut cor, cerebrum, & iecur: aut si contra intra partes abiectas & ignobiles recensetur. Præterea ex istarum situ, quarum aliæ principibus affinitate iunguntur: ut pulmones, latera, uentriculus & lien. Aliæ uero longiori interuallo desumptæ sunt, ut intestina, renes, uesica, artus, aliæque in extremis positæ. Ex ipso denique partis sensu, qui acutus est uel hebes. at causæ magnitudo ex humore qui in affecta sede est spectatur, nempe cum benignus aut uiciosus, uel putridus qualitateque contaminatus fuerit. Hic enim quicquid perniciosum est & mali moris magnum etiam nunc cupare consueuimus. Ex uasorum & uiscerum totiusque corporis plenitudine, uel inanitione, antecedentis causæ magnitudo deprehenditur, idque ex humorum inibi conceptorum puritate aut uitio. Symptomatis magnitudinem ex uehementia aut remissione eorum quæ incidunt dimetimur, nempe doloris, sitis, deiectionis appetentiæ, uigiliarum, & cæterorum quæ uires communiunt. Porro ualentes aut imbecilles uires ex operibus primum cognoscuntur, quod i. lib. de morbis

de morbis curandis abundè ostendimus. Urinæ & alui excrementa cruda, tenuia, & aquosa aut naturæ carnis similia, naturalis facultatis imbecillitatem commonstrant, quemadmodum uel retentio, uel alia quæuis oblasa functio. Vitalis facultas expulsiu paruo, obscuro, ac debili: item ex respiratione parua, difficili, crebra, ex uoce etiam exili & languida, quæ neq; pulmonum neq; pectoris uitio aborta sit debilis animaduertitur. Horum uerò contrariæ facultatis robur & firmitatem ostendunt. Animalem uim imbecillam coarguunt motus sensuumq; lesio, uigiliæ, deliria, aliæq; perturbatæ principes actiones: quemadmodum contrariæ illius constantiam firmitatemq; monstrant. Præterea si quis uehementi aut diuturno morbo, ut lyenteria, atrophia, marasmo extabuit, huic sanguis mittendus non est, etiamsi pulsus plenus existat & ualidus. Est quoq; considerandum ut euacuationis quantitas, sicuti aliorum medicaminum, certis legibus circumscribatur, ut uiribus quam minimum fieri potest, oblas morbi essentia dematur. Hæc morbi uiriumq; inter se collatio commonstrat. Si enim ualidæ fuerint uires, quantum morbus desiderat, erit euacuandum: sin minus ualidæ, moderatius: si uero deiectæ nihil prorsus. Porro in inflammationibus & ardentissimis febribus, atq; uehementissimis doloribus, usq; ad animi uiriumq; defectum (Græci λεπτο-

Sanguis quando ad animi deliquium usq; detrahendus.

θομίανι λιποσείκιαν nominant) sanguinis de-
 tractionem Hippocrates, & Galenus maximum esse
 præsidium literis tradiderunt: modo ægri vires id
 ferre queant. Sed timendum fortassis ne hac spe ægri
 in Syncopen, id est, virium omnium præcipitem lap-
 sum illabantur. Quare potius iteratione quam Græ-
 ci ἐπίκρσις uocant supplebimus, ne forte cum
 morbo æger de medio tollatur. Qui calidi & humidi
 sunt natura, copiosam uacuationem non ferunt: si-
 cuti qui plurimum ab his dissident, ut sunt frigidi &
 sicci. At multo humore in uenis recondito, qui abun-
 dant, ij facillime euacuationem possunt tolerate. Cor-
 poris habitus ex tenuatus, mollis & rarus, tum imbe-
 cillus tum multæ dissolutioni obnoxius est: contra
 uero carnosus, firmus atq; densus, pauca sinit è corpo-
 re dissipari. Qui autem præpinguis & obesus est,
 difficile uenæ sectionem admittit, quod exilibus con-
 stitutus sit uenis, quibus ex inanitis pinguedo facile
 stringit deprimitq;: ut inde metus sit ne natium calo-
 rem extinguat. In corporis habitu æstimanda etiam
 uenarum capacitas. nam quibus ample, & turgidæ
 spectantur, tolerabilior est euacuatio, quam quibus
 angustæ. Inter ætates quæ decrepita nuncupatur,
 quia uiribus est imbecillis, nullam uenæ sectionem to-
 lerat. Quæ inter pueritiam & senectutem media in-
 teruenit, dum firmæ sunt vires & corpus bene con-
 stitutum

In quibus sit ue-
 næ sectio tolle-
 ranlior.

stitutum nulla uacuandi praesidia metuit. Inferior puerorum aetas uiribus quidem abundat, sed quia corpus calidum & humidum, molle, tenerum, ac patens sanguinis emissionem non fert. Verum quidem aetates, in sanguinis educatione nullis annorum finibus Hippocrates (ut alibi etiam diximus) circumscripsit. At Galenus neq; ante annum 14. neq; post septuagesimum uenam tundendam consuluit. Nonnulli etiam nostro tempore in Medica facultate doctissimi, sexto aut septimo anno, tres quatuorue sanguinis uncias in pleuritide & interioribus inflammationibus nonnunquam detrahendas censebant. Spontè siquidè tum pueris, tum infantibus lactantibus sanguis interdum abundè prodit è naribus, nulla corporis aut uirium iactura. Est haud dubiè consentaneum, ut qui graues morbos experiuntur, iidem possint illorum quaedam remedia sustinere, leuiores tamen in pueris ob uirium imbecillitatem, & assiduum substantiae fluorem, unde noxius humor spontè uel naribus, raro corpore dissipatur. Aetas insuper quaecunq; firma sit potest euacuationis modum aliquem tolerare. Est quoq; ambientis nos aëris tenenda constitutio. Regio siquidem feruens & arida, multum innati calidi uiriumq; multum etiam peccantis humoris è corpore haurit. Hinc uires comminuuntur, pauciorq; sanguis manet in uenis: inde nos contractiones par-

cioresq; in sanguine mittendo esse conuenit. Regio frigidior ac humidior, calidum natium humoresq; intus cohercet, eosq; minimū dissoluit. quocirca sanguis abundantius effunditur. At in extremē frigida (quæ plurimum in Boream deuergit) sanguis ueluti congelatus uacuationi uix cedit. Inter has media largissimē sanguinis profusione tolerat. In anni temporibus uer sanguinem largius fundi permittit. quo tempore uenæ sectio præcauendis morbis idonea est. post uer autumnus, deinde hyems, omnium uerò minimum æstas. Cœli status quicunq; calidior obtigerit, ut in subsolana uel austrina tempestate, parcius: qui frigidior, ut ualido Aquilone aut Favonio, & ijs quoq; parce. In regione summē frigida & hyem dum Boreas præmit, prorsus à uenæ sectione abstinendum, solusq; Auster placidior illam admittit. In regione autem feruida & æstate, cum perflat Auster, uenam tundere periculosum: Sed cum Boreas æstum temperat, tutissimum. In uehementi pleuritide si fortè totius corporis sudor erumpat, aut uomitio seu alui profluium adsit, sanguis mitti non debet. Quibus tandem sedatis & paululum recreatis uiribus uena interdum tundi potest, Similiter ubi abundantius sua sponte dimanat, abstinendum à phlebotomia: si parcius & languidius fluat morbusq; interim urgeat, quod deficit uenæ sectione supplendum. Consuetudo etiam

Quando im-
pleuritide, san-
guis non mit-
tendus,

etiam nobis in uictus ratione, uitæ genere, & in euacuationibus obseruanda. nam qui liberalius pleniusq; uiuunt, copiosius euacuandi quam qui frugaliter. Sic qui uenæ sectionem iam sunt experti, non lasi tamen ob euacuationem uirtus, crebram facilius eductionem perferunt. Siquidem consueta etsi deteriora, minus offendunt. Adhæc non solū uires præsentēs emetiri, uerum etiam futuras prospicere acuti sapientisq; fuerit iudicij. Eodem modo in cœli constitutione si calida & sicca posthac euaserit specteturq; restrictus sanguis emittetur, quàm si frigidâ fore conijcimus. Item in prostrata appetentia, uel cum morbus deuorare non finit, ut in angina fauces præcludente, parcius euacuare monemur. Quibus etiam symptomata inopinata contingunt, ut sunt uehemens dolor, uigilia, & in primis syncope (hæc enim uel natura imbecilioribus, uel timore magno percussis, uel quibus os uentriculi amara bile perfunditur. Quum aliquid eiusmodi futurum suspicamur, etiam si uires non consentent, sanguinem tamen uel nullo modo, uel per parce mittemus: nisi forte huic periculo ante sit occursum. Porro si corpus pingue adfuerit, album, laxum & molle, tenuisq; succi plenum, adsitq; æstas, regio æstuosa, cœliq; status calidus & siccus, omnino huic sanguinem non mittemus, satis enim ex se ipso euacuatur. Parum etiam detrahemus in eo ipso ha-

Vterum geren-
tes quando pur-
ganda,

bitu si hyems adsit & frigida regio, coeliq; status A-
quilonius. Vterum gerentes & cacoehymia tentatae
mensibus tertio & octauo interpositis, purgationes
ferunt, & multo magis uenae sectionem, ut quae mi-
nus exagitet, minusq; foetui officiat. Atq; id media
gestatione longe tutius, quod sanguis magis redundet
& foetus minori egeat alimento, Saepe etiam graui-
da, supra mensem octauum nullo foetus malo sangui-
nis moderatam educationem perfert. Fieri etiam po-
test ut sanguinis copia in abortus discrimen adducat :
itaq; si grauida mulier morbo conflictetur grauiore,
sitq; ualentibus uiribus, & forti animo nec metu per-
turbatur & uasa plena sint, & non inedijs exinani-
ta, huic tuto aliqua ex superioribus uena incidetur,
ex qua sanguis sensum defluat. Inferiores pregnan-
tium uenas resignare minime tutum : periculum si-
quidem est ne menses una cum foetu euocentur. Est
praeterea uteri gestatio quemadmodum & aetas inter-
quantitatis obseruationes habenda. Multis argumen-
tis iam demonstratum est uenae sectionem hisce dun-
taxat opitulari, quorum causa aut in uasis concludi-
tur, aut e uasis in partem aliquam incubuit. Estq; in
primis animaduertendum ut interior illa morbi causa
tollatur. Idcirco cum uel plenitudo, uel aliqua eius-
modi causa subest, debet ea uenae sectione submoueri,
idq; mox & ineunte morbo. Sic febres ardentes an-
tequam

tequam sanguinis moles feruoris intendio torreatur, aut uehementior putredo inuale scat, acceleratū hoc remedium extinguit. Nec aliter interiores inflammationes hoc auxilij genere initio radicitus eruuntur, uirium, ut sæpe dictum est, robore semper habito. Qui in plenitudine aut fluxione alia remedia uelit producere, euerso medendi ordine affectum conduplicabit, uiribusq; negociū facesset. itaq; uenæ sectio morbis quibus conuenit incipientibus si decernatur, sublata multitudine, quod reliquum fuerit, facilius natura concoquet & euincet. Cum enim morbi inchoant, inquit Hippocrates, si quid uidetur mouendum, moue: Cum uero consistunt melius est conuiuiescere. Et cōcoctus iam humor medicamento deriuandus detrahendusq; est. Nam si quis hoc tempore uenam inciderit, humores quoq; utiles eliciet, & quod grauius est, eos pure sanguini exagitatione permiscebit, inquinabit, ac confundet, & naturæ officium præpediet et interpellabitq;. Quibus porro in morbis signa concoctionis manifesta apparebunt, non amplius uenæ sectione, sed uel purgatione uel alijs deriuantibus præsidijs reliqua curatio transigenda: nisi cruditatis signa (ut interdum fit) denuo se prodant, quæ prius essent ipsa purgatione concoquenda. In febribus uacuata multitudine, ubi quæ putruerant concocta apparent, per aluum, urinas & sudores, ea uacuare tantandum.

Aph. xxi.
lib. ij.

Aph. xxiiij.
lib. ij.

tandum. In pleuritide & peripneumonia, quæ putruerunt & in pus conuersa sunt, per sputa: In iecoris inflammatione: caua quidem per aluum (ut etiam in nostris comment. super Aphorif. Hippocratis diximus) Gibba uero per urinas: quemadmodum & renes: singula deniq; per loca proxima, & conuenientiora. Si metu, ignauia, alijsq; occasionibus uenæ sectio primis morbi diebus administrata non est, quocunq; die etiam uigesima, modo uires frant, neq; sint morbi diuturnitate collapsæ, illam incidimus. Concocta etenim morbi materia & ubi uires dissolutæ non sunt, non dierum numerus neq; à purgatione, neq; à phlebotomia dehortatur. Vt autem uniuersalium temporum, ita particularium & dierum, quibus morbi recurrunt delectus habendus, in his potissimum morbis, quorum certa est uel intermissio uel remissio. Vacuatio non excandescenti sed mitescenti morbo obferenda. Natura tamen plerumq; febrium maxime intermittentium inuasionibus, uomitiones & declinationibus sudores commode ciet. Nobis quidem tametsi naturam imitamur ducem, in accessionibus minimè solemus mouere, præsertim medicamentis, quæ multū uentrem deturbent seu uenæ sectione. Maxima igitur morbi tranquillitate tum purgatio tum uenæ sectio est administranda. Si spacia inter accessiones porriguntur, facile erit medium ipsum pro
rerum

rerum commoditate designare: sin angustum, diffi-
 lem: quod interdum uix occasio sese offerat, ut uel
 ante uel post uenæ sectionem oportune ægrum nutria-
 mus. In quibus morbis uel præcautionis uel cura-
 tionis gratia potestas datur, sanguini mittendo hora
 conuenientior erit matutina quàm pomeridiana. Sanguini mit-
tendo quæ ho-
ra conuenien-
tior.
 nam à solis exortu sanguis suscitatur uiget atq; do-
 minatur fluxuiq; fit aptior. A sanguinis missione
 æger sopore non torpeat, sed experrectus insomnem
 horam saltem unam maneat: Nec mittendus sanguis
 antequam cibum integrè ille concoxerit, sitq; alui &
 uesicæ munia exequutus: eò magis si uena quæpiam
 magnarum uenarum fuerit incidenda. Astrologiæ
 etiam obseruationes quantum ars Medica postulat
 non sunt negligendæ. Caterum in uehementi & suf-
 focante pleuritide uel sanguinis immoderato fluore,
 extrema uasorum plenitudine & alijs deniq; morbis
 qui nimium præcipientes sunt, nihil istiusmodi delectus
 habendus, sed quacunq; hora uehementer ij premun-
 tur, hac ipsa uenam præcidere fas est. Quinetiam in
 febribus alijsue morbis, qui per circuitus affligunt,
 quietis aut remissionis animaduersio multo præstan-
 tior quàm matutini temporis eius diei quo quis affli-
 gitur, & ut ad uenæ sectionē oportuna temporis oc-
 casio, ita corporis idonea præparatio adhibenda: qua
 neglecta egroto plurimum offensionis impendet. Si
 igitur

Igitur aluius astricta fuerit, balano uel clystere priusquam uena scindatur, est subducenda: uel si per assumpta malit, blando quodam medicamento, ne corporis uniuersa moles exagitetur, utendum: cuiusmodi est hierapicra, si febris non reclamet, uel Rhebarbarum, uel senna, uel Agaricus, uel aliud quiddam pro humoris specie. Porro in hydrope cachesia, iecoris uel lienis scyrrho, uel exigente alterius morbi importunitate, minime sanguinem educimus. Ante uenæ sectionē si uentriculi uitia adsint, ut sensus eximius, siue nausea, uomitus, fastidium, aliaue grauitas & dolor, siue præcordiorum tumor atque distentio, & alia id genus prius corrigenda, præparandaue illa erunt, postea idoneo medicamine purganda. Cum uena incidetur confricetur artus donec in calescat, atque pars ex qua educendus sanguis prona statuatur, Postea super eum locum in quem scalpellus adiget arctius uinciatur, ut magis uena in conspectum se offerat: infra etiam illigari mos est cum tremula inconstansque uena ad scalpelli quemuis impulsu subter fugit, aut è sua sede disilit. Constat autem quibus densa squallidaque cutis est, & quibus angustæ uenæ, aut in altum demersæ, multa carne uel adipe obductæ, ijs multo arctius uinculum injici debere quam quibus diuersa est constitutio. Minores pedum manuumque uenas in calentem aquam demittimus, quæ & profluentis sanguini

guini impetum facit: si nec sic quidem, uena in aperta promatur, eam quo loco inesse solet, digitorum contactu perquiratur, dum sanguinis fluxu, & illius incursione sit explorata sedes. hancq; signatam scalpello industrius artifex percutiat. Interdum iniecto uinculo arctiore, aliquid uenæ simile intumescit, quare uidendum ne pro uena, tendo uel arteria percutiatur. Vena quæ in articulis brachij flexu & poplite exstant, in rectum scissæ, tardius coalescunt: quod articuli motu uulneris labra dehiscant. neq; huiusmodi incisio tentanda, nisi cum iteratione est opus. Extra articulos, ut in capite, manibus uel pedibus, quæcunq; uenæ emergunt diuersa sunt ratione. nam in rectum apertæ, cicatrice celerius obducuntur, quod labra semper inter se cœant. Sub uena quæ basilica dicitur, fere comes arteria delitescit, & sub media neruus: utrisq; musculorum tendones plerumq; substernuntur. Cephalica licet difficilis, omnium tamen solet esse, ut antea dixi, tutissima. Si autem suspitio nerui aut tendonis compuncti fuerit (quod ingens dolor, stupor, resolutio, & brachij conuulsio cum tumore indicant) nec uulnus possit coalescere donec ab impendente phlegmone induratum sit, & dies duo, tresue dolor adsit, inhibebitur frotu tepentis olei: lapsa autem triduo si dolor conquiescat nec noui quidquam obrepat sinatur coalescere: sin minus adhi-

Observatio in
tundendis ue
nis brachiorum

nus adhibeantur aperientia, attrahentia, & qualia
 nervis compunctis conueniant, ut therebinthina ad=
 iecto interdum euphorbij momento. Aperta arteria
 sanguis emanat tenuis, rubicundus, igneus, & pulsus
 quodam exiliens. subsidio tum est emplastrum ex aloë,
 mirrha, thure, & bolo armeno, quæ oui candido &
 pilis leporinis sint excepta, ijsdem lintea ex liquore
 rosaceo imbuta insternetur. Emplastrum fascijs ob=
 uoluetur firmè ac tuto, ne triduo excidat, & hoc
 blande submoto simile imponendum denuo. Si ne ijs
 qui lem arteria coalescat tota transuersim discinda=
 tur, ut extrema utrinq; reuulsa molli carne obduca=
 tur. Si crassus porro uel uiscosus sanguis, qualis me=
 lancholicus inesse putabitur, aut cœli constitutio fri=
 gida sit, amplior fiat incisio: sin tenuis & aquosus,
 aut ipsa cœli constitutio calida, angustior ea fiet. Ve=
 na ut decet aperta uinculum à superiori parte laxa=
 bitur, quo inde sanguis uberius fluat: si sanguis rursus
 sit idoneus, sinatur: sin minus abunde & segnius flu=
 at, idq; sectionis errore, ea emendetur. Quod si san=
 guis crassitie aliaue ex causa id contingat, laborans
 pugnum arctè uehementerq; obducat, nervos, muscu=
 los, latera, tussi ac uoce ualida cõtendat, uulnus aquæ
 calide fomento proritetur. Qui uero cura, metuq;
 intercipientur & parcius sanguis emanet, ijs inter=
 missio fiat, donec uires recreentur. Emanantis san=
 guinis

Incisio
 quando loca &
 quando de augu=
 ta fieri debeat.

guinis quantitas æstimanda est ex morbi, uirium & plenitudinis necessitate: quod etiam tum color tum substantia indicabunt. Si fortè laborans labascit metu, terrore, uel stomachi demorsu, tunc recreandus est aquæ frigidæ conspersione in faciem: item ex aceto, uino, moscho, & alijs aromaticis naribus admotis. Si ne, sic quidem releuetur æger, uomitus excitetur, aut faucium titillatu, aut iniecto oleo, quandoquidem ijs impetus stomachi, cordisq; tædia robur expellet. mox uires instaurentur uino, succo mali punici, iure carniū, medicamento diamoscho alijsuē cardiacis. Detersum uulnus lynteo obsignetur uel rosaceo, uel dulci aqua imbuto: aut etiam oleo si sanguinē iterum fundere consilium est. Fasciæ ex linteo nec arctiores sint, nec cutem uulnerisue labra distorqueant. Si ictotendone aut neruo fluxionis aut phlegmonis metus sit, emplastrum è cerusa imponendum est: in ambitu uero cataplasma ex semper uiuo, solano, arnoglossō alijsq; frigidis. Sectus æger supinus recumbat, ut omnibus partibus in spinam dorsi summa sit quies, tanquam in corporis basim reclinantibus: & in quiete partes exhaustæ repleantur. Neq; ad consueta munia properet, neq; ullo exercitationis genere se fatiget, neq; uenere utatur aut in balneum descendat, ne sanguis & spiritus uehementius incitati dissipentur aut incalescant, qui sedandi comprimendiq; sunt. A

K uenæ

Post sanguinem
missum quæ-
nam alimenta
conueniant.

uene sectione non continuo indormiendum est, ne aut
languidior calor extinguatur, aut obruantur immi-
nuti spiritus. itaq; uigilans conquiescat, absitq; tum
animi tum corporis contentio. Hora una aut altera
à sanguine misso alimentum, exiguum quidem, sed
boni succi licebit offerre, quod promptè alat & quod
sit profligando morbo accommodatum. Duabus ab
hinc horis aut etiam citius, nihil uetat obdormiscere,
modo assidentes prospiciant, ne uel laborans in bra-
chium cæsum se deuoluat, uel uinculum dissoluat quo
sanguis dimanet, uel aliud incommodum sibi ferat.
Reliquus deinceps cibus non cum auuiditate, sed sen-
sim sumatur, ut quem natiuus calor imminutus possit
euincere. Porro si per uirium imbecillitatē non pos-
sit uniuersa uacuatio compleri, quum præstantior ui-
rium quàm morbi sit obseruatio, partiri eam uacua-
tionem cogimur, idq; summo iudicio, summaq; proui-
dentia. Partitio illa sit ex modicis interuallis, atq;
uel dissoluto uinculo, uel digito uulneri indito inter-
mittatur tantisper dum uires restitute sint, atq; hora
una interdum, nonnunquam duabus pluribusue ad
uirium instaurationem est opus. Galenus optimum
ducit non ultra diem prorogare, sed eodem die (si ui-
res sinunt) rursus sanguinem mittere, idq; in morbis
uniuersalibus quibus id conceditur. Ceterum in affe-
ctibus partium omnibus, præsertim in phlegmone,
tametsi

tametsi uires persistant uacuationem partiri nonnullis placet, semperq; post modicā sanguinis effluxionem, iterum mittere, maximè cum postremus sanguis corruptus apparebit. Primum quidem parcius, deinde liberalius: interdum & tertio mittendus. In pleuritide, phlegmone, alijsue affectibus quorum materia ē uasis in partium molem confluit, cum aut reuulsionis aut deriuationis gratia uena secatur, utilis est repetita sectio in posterum diem, quandoq; & in perendinum differre. Venenatam malignamq; inflammationem, ut pestilentē bubonem, aut carbunculum, non in posterum diem producemus, sed necesse est ipso die festinanter uacuationem iterare, ne pestilens contagio diutius hæreat in uenis. Caueat interim Medicus ne crebro audacterq; uenam aperiat, cum Galenus uix nisi ex necessitate pluries in anno id fieri permittat. Sanguinis essentiam & colorem postq; peluiculis mundis, terrenis, uitreis, stanneis, aut argenteis, non tamen æneis exceptus fuerit, inspicere oportet. Multæ igitur peluicule seponantur in loco mundo ubi nec pulvis nec fumus, nec uentus nec deniq; radij solares pertingant. Crassus enim & densus sanguis obstructionem significat: tenuis & qui iam refrigerescens minime durescit: is aquosus est & putridus: spumofus incendium innuit. Serum multum tanquam aqua citrina concretum sanguini innatans

Sanguinis essentia & color.

uel potum liberaliorem uel iecur infirmum (quale hydropicis) uel imbecillos renes uel eosdem obstru-
ctos ostendit. Color citrinus bilem, albus pituitam
uiridis bilem retorridam, liuidus aut plumbeus atram
bilem cum pernitie commonstrat: sicuti uariis uarios
affectus: & dum grana quædam permixta apparent,
elephantiasim ostendunt.

DE ANIMI AFFECTIBVS
seu perturbationibus.

CAP. XVI.

ANIMI pathemata seu affectus, inter res
non naturales ultimo loco ponuntur. Hu-
iusmodi fere sunt, timor, gaudium, tristitia,
uerecundia, & id genus. quorum motu & concita-
tione nostra corpora sæpe afficiuntur. Porro per-
turbationes quæ ex lætitia & iracundia suscitantur,
potenter ac subito mouent: reliquæ uero nec ualide
nec potenter. quarum aliæ si persistant corpus offen-
dunt, ut mœror & inuidia: quædam nihil aut parum
incommodant, ut uerecundia. In timoris emotione
sanguis & spiritus intro ad suam scaturiginē serun-
tur contrahunturq; , quo fit ut algeant partes in su-
perficie positæ, unde pallor & tremor sequitur. Ete-
nim metus eum è re formidabili nascatur, præcep-
subitusq; motus iudicium obiecti surripit, ijs præse-
tim qui-

tim quibus imbecilla mens est hinc pulsus celer, turbulentus, inordinatus, atq; inæqualis quando scilicet metus recens, ac uehemens fuerit, nam si inueteratus sit pulsus à mœstitia erit similis. In letitia fit motus non ualidus, nec feruidus: resoluitur tamen spiritus & animalis facultatis robur dissipatur. hinc pulsus magnus ac rarus, non tamen uehementia diuersus. Præ gaudio nonnulli pusillanimes ueluti quidam timore suffusi, perierunt. In mœrore sensim fit motus ad interiora, unde spiritus ad suam originem reuocati coarctantur, nec rursus (ut in iracundia) foras sparguntur, sed sese accendunt ac consumunt, unde temporis progressu potius quam uehementia humiditas absimitur & uirtus consopitur, fitq; deses. Præterea mœror haud leuiores quàm maximus timor adfert symptomata: quippe laborantes decolores apparent, refrigerantur, rigore concutiuntur: pulsus fiunt parui, tardi, languidi ac rari: quia ualida facultas non est, inde aliqui tanquam syderati & attoniti moriuntur. Iracundia feruidus quidam, irascibilis facultatis in corde sedem habens, motus est: in quo primum intus accenduntur sanguis & spiritus, deinde foras effunduntur, ac corpus totum inflammant, ita ut febrem sæpe generent. At excandescencia & furor qui ex uehementi ira excitantur, spiritus celeriter intro reuocatos accendunt. Ab ira fit pulsus altus, magnus, uehemens,

Iracundia.

celer & frequens. Hæ præterea emotiones quibusdam, cum in omni corpore, tum maxime in uultu quodammodo dignoscuntur: Læti siquidem frontem, oculos, totamq; faciem exporrigunt. Effunditur enim in has partes spiritus, qui cutem extendunt: mœsti uerò easdem partes in rugas contrahunt demittuntq; quæ si intro recurrentes spiritus sequantur. Excandescuntibus tota facies calet & rubet, oculiq; prominent ac scintillant. Spiritus enim & sanguinis feruor in corde calidos uapores suscitant: qui in corpus uniuersum maxime tamen in oculos feruntur. Itaq; frons rugosa tristitiæ ac feritatis est signum: contra uerò hilaritas mansuetudinis & clementiæ. Iracundiam porro colorum igneus calor ac scintillans splendor testatur. Harum quoq; affectionum notæ, natiuas temperaturas sequuntur, ut si oculi tactu calidi censeantur, minimeq; excrementosi perspicuè cernant, latas uenas easdemq; rubras habeant, temperamēta calida siccaq; esse testantur: quæ quidem dociles & ardua appetentes, audaces, animosi, iracundi, furibundi, implacabiles ac præcipites habentur. Cæterum si animi motus sint compositi, alijs signis erunt dignoscendi, quando quidem neq; pulsus, neq; causæ quæ pulsus uariant, illos prodere possunt. In summa tanta est harum affectionum uiolentia, ut interdum in grauissimos morbos & ad necem usq; (ut Historiographi etiam testantur) delapsi quidam sint.

Temperatura
calida & sicca
quos officiat.

DE

DE REB. PRAETER NATV-
ram. CAP. XVII.

IAM, rerum naturalium & non naturalium ha-
bita consideratione, superest ut affectus qui cor-
poribus praeter naturam accidunt (græcis αἰτίαι
λογικῆς καὶ παθολογικῆς dicuntur) persequa-
mur. Hi enim sunt causa, morbus & symptoma, Cau-
sa morbum praecedit & excitat, Morbus actionem ex
Galenī sententia, primario ledit, symptoma morbum
sequitur. Hi itaq; affectus res praeter naturam dicun-
tur, eo quod à naturali constitutione recedant. Causa
igitur quæ morbi efficiendi operam suggerit, uel est
externa, Græci παροξάνουσα καὶ ἐξωτερική, id est, euidentem
uocant, quæ extrinsecus adueniens, uehementer alte-
rat immutatq; corpora, ut frigus, calor, morsus uel
punctura & alia quæuis extranea lesio. quemadmo-
dum in nostra de morbis curandis methodo di-
ctum fuit. Interna uerò causa seu antecedens, quam
Græci παροξάνουσα καὶ ἐντερική dixerunt, in animato corpo-
re consistit, ut sunt humores praeter naturam affecti,
& immoderati, atq; incompositi animalis motus. Por-
rò causa tam externa quàm interna simplex est aut
composita. Causa simplex dicitur unius quatuor pri-
marum qualitatum intemperies, quæ si primo actio-
nem ledat, quantumvis corporis robur mediet, non

Res praeter na-
turam.

Causa duplex.

causa sed morbus dicetur. Itaque ex calidis, frigidis, humidis, siccisue causis: morbi ipsis qualitatibus similes gignuntur. Similiter ex motu multo & uehementi uel uiciniae & contactu rei calidioris ueluti ignis, aeris calidi, solis actiui, balnei aquae calidae, & aliarum huiusmodi rerum, morbi calidi oriuntur: qui quidem interdum uniuersi corporis habitum, sicuti febris non putrida, interdum partem aliquam, ut phlegmon

Causae organicae partes affligentes.

Erysipelas, & reliqui morbi calidi, offendunt. Causae uero tam internae quam externae quibus partes organicae seu instrumentales officiuntur, sunt ueluti in utero, quando foetus in eo male conformatus est, impedito naturali spermatus motu, uel ob materiae multitudinem uel quantitatem non idoneam. Altera causa si uel inter pariendum, uel dum fasciis infans inuoluitur, committatur error. Facile enim puellorum corpora quae mollia sunt, contorquentur: aut dum nascuntur, si obstetrices eos non recte suscipiant, aut postquam sunt editi, inepte inuoluant, aut ubi nutrices tenent uel erigunt, uel reponunt, uel lac exhibent, uel lauant. In his omnibus (nisi ut decet prospiciatur) singulorum membrorum naturalis figura & inuertitur & deprauatur. Praeterea si per reliquam educationem peccetur, uel ob immodicam plenitudinem uel motum incompositum: qui si uehemens fuerit, membrorum figura distorqueri potest. Huc pertinent

uarij

uarij affectus qui ob nutricum errorem ac imperiti-
 am (ut quæ nonnunq̃ ignorent quo pacto uincire
 oporteat) puerorum membra quædam aut supra mo-
 dum prominent, aut contracta sunt. Aliquando etiam
 eorum qui confracti membri figuram inuertunt cul-
 pa, Hæc adducere uolui, ut tenellæ etati accurata di-
 ligentia prospiciatur, sicuti prospectum nostræ inco-
 lunitati esse uolumus. Alter affectus præter naturam
 dicitur, qui actionis uel constitutionis uitium est,
 Sunt præterea morbi primi et simplices quatuor, qui **Morbi primi**
 reliquorum ueluti sunt elementa. Vnus quidem calor
 à naturali symmetria deflectens: alter frigiditas: ter-
 tius humiditas: quartus siccitas. qui quidem pro ex-
 cessus uel decessus ametria, corpus affligunt. Interea
 considerandum in partibus affectis, simplex ne sit par-
 ticula, quatenus sensus indicat, an composita: nam
 simplici accidere solent morbi, quos ex primorum ele-
 mentorum differentia primos & simplices esse dici-
 mus. Parti uerò compositæ reliqui morbi communes
 sunt. Cæterum præter naturam affectiones quæ in so-
 la qualitatum intemperie existunt, nō ita faciliè cog-
 noscuntur, nisi pars ipsa à naturali habitu deflexerit.
 Si igitur morbus partis similis seu simplicis, sim-
 plex fuerit, ab una quatuor qualitatū intemperie
 fieri est necessum: ut ambustio ab igni uel sole, uel **Morbi ab intē**
 alia re calefaciente. Ab intemperie quoq; frigida fit **peris frigida,**

morbus ut est congelatio totius uel partis, tanta sepe
 ut pars demortua cadat, uel si totum corpus obsederit
 morte absumatur. Solet huiusmodi affectus apople-
 cis, epilepticis, tremantibus & conuulsis accidere. Ab
 humida qualitate ut flaxitudo & mollietates, nulla fo-
 ris affluente substantia: uel sicca, perinde ac si pars
 salsa esset, ut metamus totius corporis uel partis, &
 huiusmodi. Si uero is morbus non simplex, sed ex qua-
 litatibus primis, sine affluxu mixtus fuerit, certum est
 eum pro qualitatibus dyscrasia à medio recessu mitem-
 aut seuerum esse, nam exiguae ab exacta utrinque sym-
 metria declinationes, haudquaquam morbi erunt, donec
 functioni noxam quae sensu percipiatur inferant, si-
 cuti Galenus lib. de morbo. diff. ostendit. Quae uero
 corpora medium inter utrumque excessum habent, op-
 tima ualitudine fruuntur. Sed morbi ex nudis quali-
 tatibus & sine materiae affluxu, haud facile (nisi mag-
 ni fuerint) deprehenduntur, quod si morbus ex intem-
 perie cum affluxu materiae accesserit, facillime cogno-
 scetur: siquidem morborum compositorum causas
 difficiles esse non possunt, ut quae ex simplicibus qua-
 litatibus constent, ueluti ex intemperie calida & hu-
 mida, quae sanguinea est phlegmone: Est enim haec af-
 fectio calidae copiosaeque fluxionis soboles, quemadmo-
 dum Galenus lib. 1. simpl. indicauit. Ex calido & sic-
 co humore ut est bilis, fit Erysipelas: Ex frigida & hu-
 mi-

Morbi calidi
 & sicci,

humida, qualis pituita, fit oedema: sicuti ex frigida & sicca, cuiusmodi Melancholia. scyrrius & quoniam hi humores persèpè inæqualiter miscentur, ab eo quod in mixtura exuperat, denominationem fieri etiam alibi diximus. sicuti in commixtione sanguinis & cholera, si sanguis ipse præcellat, tunc affectio Phlegmone erysipelatoza dicitur: ubi uerò flaua bilis præpollet, erysipelas phlegmonosum appellabitur. at ubi neuter uincit, sed æqualiter apparent accidentia, tunc uitium id alterutrius quomodo lubet appellatio nem retinebit. Eadem & aliarum mixtionum erit ratio, ueluti si multa bilis pauco humori pituitoso aut atrabilario misceatur: illud quidem Erysepelas oedematosum, hoc uero scirrhosum dicetur. Cum igitur morbus ex intemperie cum materie affluxu aderit, causam ab humorum qualitate, unde morbi fit generatio, habuisse necessum est: idque ex sanguinis pituita & utriusque bilis natura. Rursus frigidorum morborum causas etiam uariæ sunt, ut est uicinia & contactus rei frigida, qualis niuis & glaciei, seu aquæ in frigidantis, aëris frigidi, balnei aquæ dulcis intempestiui immodiciue usus: item immoderata exercitatio, quæ aliter calorem excitaret augeretque. Similiter res qualitate aut quantitate frigida, siue alimenti, siue medicamenti saccultatem obtineant, atque immoderata cibi & potus copia uel inopia, sicuti & immoderata Venere.

Morborum frigidorum causas

Horum

Horum quodlibet potest frigidum affectum inducere. Ex medicamentis etiam ueluti est papauer, Mandragora, hyoscyamus, cituta: quæ interdum præ nimio frigore mortem inducunt. Præterea ut constipatio refrigerationis subinde causa est, ita raritas, discutiendo

Morborum humidorum cause

natiuum calorem, corpus frigidum reddit. Sunt et alie cause ex quibus humidi morbi generantur: ut temporum constitutio humida, uel regione, uel cœli statu: item balneum aquæ dulcis frequens, præsertim mox à cibo, alimentorum quoque humidorum copia, et potus plurimus, motus mediocris post cibum, uita ociosa et ignaua, mollis æductio, animi tranquillitas, somnus plurimus: et alie in assumendis hume-

Morborum siccorum cause.

ctandi uim habentia. Cause morborum siccorum sunt ueluti, si quis plurimum transpiret et parce nutriatur, idque alimentis quibus siccandi facultas inest, et quibus facile ad siccum morbum perducitur. potissimum si cura et uigilijs homo torqueatur. similiter aeris nos ambientis siccae constitutiones et balnea ex aqua siccante, ut est marina, nitrosa, aluminosa, bituminosa, sulphurosa: et alia quæ uis astringendi facultate prædita: item medicamenta exiccantia sumpta uel admota. maxime quæ immodicè purgāt. Motus quoque plurimus, præsertim uacuo corpore et in aeris sicci constitutione, et ut semel dicam, omnia quæ naturalem exiccandi facultatem habent, siue assumuntur, siue

siue admoueantur, corpora aridiora reddere consueuerunt. Duo igitur in uniuersum esse morborum genera Galenus ostendit, alterum in simplicibus simplicibusq; partibus, quod etiam in compositis & instrumentalibus seu organicis commune est. uocaturq; unionis solutio: alterum ipsarum utpote primarum & simplicium particularum est, quod in calidi, frigidi, humidi & sicci intemperie consistit. Adhæc nonnunquam corpus alteratur omnibus causis conformi inter sese concordia conuenientibus, ob contrarias inter se facultates: atq; interim uincunt quæ uel numero plures sunt, uel tempore diuturniores, uel robore potentiores: interdum ex utrisq; ex æquo corpus noxam suscipit. Accidit autem (licet fieri non posse uideatur) ut idem corpus simul & calidius & frigidius, aut simul humidius & siccus q̄ pro naturali habitu, reddatur, uocaturq; hæc intemperies inæqualis, ut Galenus lib. de morb. caus. ostendit.

A figura etiam morbi desumitur indicatio. etenim uaciarum, uarorum, plancorum crura, minus ex pedite suo munere funguntur, eo quod ab idonea figura deflexerint. Sic de fracturis, luxationibus, simis à natura, ictu, casu, callo eminentiori articulis innato, corde, pulmone, uentriculo, liene, renibus, epate, & id genus dicendum est, quorum uitiosa si fuerit figura, totius instrumenti functio deterior reddetur. Præterea
multi-

Magnitudo in-
epta.

multitudinis magnitudinisq; cavitatum aut meatuum parti alicui debitorum defectu, partes organicæ læduntur, ut dum nimis patent, coalescunt, obstruuntur, à uiscidis crassisq; humoribus, cavitatem internam occupantibus: aut à uicina aliqua parte ingruente constipantur, præsertim si corpora exiccata fuerint, atq; corporum ipsorum (quibus huiusmodi sunt meatus) essentia, interdum uel indurata uel phlegmone prædita uel tabescens uel suppurata, uel inflata, uel dum alias aduentitia magnitudine turget: deinde sua mole cavitates occupans, meatus obturat. Magnitudo inepta, quoties supra modum attollitur, in quauis parte corporis, tanta nonnunquam & in toto corpore, ut uix moueri queat, fitq; ob materiæ utilis multitudinem: quia ualida est potentia: imminuitur uerò à causis contrarijs. Item organicæ partis affectio, numero decernitur, idq; super abundantia & nullo ex usu, ut sextus digitus in manu uel pede. Ptergion in oculo, atq; tuberculum in aliquo meatu, quod causa morbi nempe obstructionis est: aut è contrario si pars quædam perierit, quæ iuxta naturæ ordinem adesse debuit. Sunt etiam toto genere præternaturam tum causæ tum morbi contenta in abscessibus: ut pus, & reliquæ materiæ species. Interea abscessus ipsi melicerides, atheromata, steatomata, humbrici et ascarides: calculus in uesica & renibus, grauedo, & suffu-

Suffusio in oculo, uirilignes, lepræ, calli, acrochordæ
 nes: ex quibus quæ actionem primo impediunt, ut
 suffusio, morbi sunt. Quæ uerò non primo, morbo-
 rum causæ. Ex deficientia quoq; morbus has partes
 obsedit, idq; uel in partibus ipsis ex dimidio sectis, mu-
 tilatis, non formatis: uel in toto, ubi radicitus mem-
 brum aliquod amputatur, ut digitus, pes, ossa quæ-
 dam, dentes exesi, glandula indurata, uena uaricosa,
 & reliqua huiusmodi, quæ si actionem (ut iam dictum
 est) lædant, morbi dicentur: si uero partem actionis
 opificem refrigerent, uel ei non satis alimenti trans-
 mittant, morbi sunt causæ. Quædam etiam & morbi
 causæ, ut gurgulio exectus omnino, nam uocem lædit
 & pulmonem atq; thoracem refrigerat: in quibus
 non ad oblata ut partem, sed ad relictam morbus re-
 ferri debet. Affectus igitur, qui actionem planè uiti-
 ant, morbi erunt: qui uerò usum aliquem subtra-
 hunt, morborum causæ dicentur, proinde partes quæ
 duplicem uel functionem uel usum obtinent, ex unica
 quandoq; noxa duplicem habebunt uel morbi uel
 causæ rationem. Quod si pars aliqua utrumq; possit
 præstare, utpotè functionem & usum, sicuti gurgu-
 lio, eius abolitio una ratione morbus erit, altera uero
 morbi causa: & ad eandem causam quæ adhuc manet
 & seruata est, morbus est referendus, non autem
 ad eam quæ iam non est. Compositione etiam

Affectus qui
 morbi & qui
 causæ.

à naturali habitu aberrante morbi nascuntur: in
 positu quidem, ut sunt articulorum tum luxatio-
 nes tum cōmotiones. Item si uel intestinum, uel oment-
 um in scrotum deuoluitur hoc epiplocele illud ente-
 rocele appellatur. Connexus porrò uicinarum parti-
 um si à naturali ordine recesserit, impedit in ea parte
 motum articulis debitum. Huiusmodi erunt uincula
 lingue, & articulorum ligamenta, quæ quidem dum
 laxantur, intenduntur, rumpuntur: breuiora, longio-
 ráue fiunt quàm oporteat. Eiusdem notæ sunt labia,
 palpebræ, digiti, atq; aliæ eiusmodi partes, quum ul-
 cus præter naturam in his coalescat. Porro continui
 solutio in osse quidem fractura, quæ κατὰ τὴν γυναικῶν
 cis dicitur: in carne uero communiter ulcus: sicuti
 etiam uulnus & ruptio quæ Græcis ῥήγμα nuncu-
 patur. Siue igitur magnitudine, siue defectu, numero,
 compositione, à naturali figura deflectatur, siue id
 per accidens, ut in neruorum tendonum, musculo-
 rum resolutionibus, conuulsionibus, dissectionibus: ab
 eo unde talia originem habent, morbi indicationem
 desumimus. Præterea partes quædam præter natu-
 ram exasperantur, quæ antea fuerant leuia, aut leui-
 gantur, quæ prius fuerant aspera: illæ quidem ob a-
 cres humores: hæ autem ob pinguedinem & uiscosita-
 tem. Quapropter cum non apte inuicem inter se com-
 mutantur, affectuum causæ sunt. Exasperantur ocu-
 li non

li, non solum ob iam dictas causas, uerum etiam ob acres uapores, puluerem, fumū: Sic gula, uenter, intestina: & ob excrementa in ipsis genita, & ob ciborum potionumq; qualitatem. quibus uenena adnumerantur. quæ si ualentius exasperent, in carne ulcus aut erosionem: in ossibus uero cariem obducunt.

Hactenus de simplicium morborum differentiis egimus: consequens nunc est ut de instrumentariis dicamus. Sunt enim morbi quidam primi, ut diximus, et partibus simularibus proprii. ob id similes etiam dicuntur: alij instrumentarii, qui compositi sunt: unde phlegmone ad prima corpora, luxatio uero ad instrumenta pertinet. Cum itaq; membrum aliquod, simul & luxatione & phlegmone afficitur, luxatio quidem totius instrumenti primo morbus est, phlegmone autem neq; primo neq; proprie, sed per accidens. ita de oculis & lippitudine dicendum. & quemadmodum simplicium morborum, alius primo totius instrumenti morbus erat, ueluti suffusio: alius uero ex accidente ut in ceratoide: ita compositorum quoq; morborum alij proprie ad totum instrumentum referuntur, ut qui eius complures particulas simul infestant ex causa tum interna tum externa: alij uero per accidens: qui in uera quapiam particula consistunt, ut lippitudo: quæ in herentis membranæ ceratoidi phlegmone est, parti organice propria. Sic enim affe-

Morbi instru-
mentarii.

Lippitudo
quid.

L etus

Etus compositus dicitur quando duo uel plures morbi
 instrumentorum simul sunt, uel plures eius particu-
 las simul infestant, ut in oculis suffusio & ptergion,
 uel rheade: nam horum quodlibet proprius est oculi
 morbus. Sic in lingua magnitudo nimia & asperitas
 præter naturam. Per accidens ad totum instrumen-
 tum refertur morbus, quando similarium partium
 multi simplices morbi, uel compositus aliquis sicut
 in phlegmone, unam instrumenti particulam, aut sin-
 guli singulas offendunt. Sunt etiam morbi simplices in
 suis similaribus & organicis communes, ut in carne
 uulnus & ulcus: ruptio, contusio: Et in osse capitis
 rhegma, id est fissura seu rima, & thlasma, hoc est
 contusio, in capitis puerorum ossibus, quæ mollia
 sunt. In alio tamen osse fractura dicitur, & teredo, id
 est caries, quando scilicet foramen in osse apparet ab
 acerbis humoribus eroso. In neruo spasma, hoc est
 conuulsio & fibrarum neruofarum diuulsio, quæ ut
 rhegma à motu fit repentino, inæquali, ualido, in cor-
 poribus ad motum inductis, antequam frictione ad
 motum inductis, antequam frictione ad æqualitatem
 perducta & calefacta sint. Per hos enim affectus mul-
 tæ in his partes diuelluntur. Hæc ad partes similes
 proprie pertinent, per accidens uerò ad organa. Simi-
 liter utriq; parti, interdum morbi compositi simul
 inueniuntur: ut fractura cum ulcere, ulcus cum spas-

mo, erosione, ruptura. Interdum cum morbis partium
 simularium uel organicarum simplicibus uel compo-
 sitis: ut ulcus cum calore frigore, humiditate, siccita-
 te sola præter naturam: uel calore & humiditate, fri-
 gore & siccitate. Ex hac breui enumeratione causa-
 rum morborumq; simplicium et compositorum, cum
 in partibus simplicibus & primis, tum in compositis
 & instrumentalibus cognitio haberi potest.

His dictis superest ut ad tertium præter naturam Symptoma
 affectum, qui symptoma dicitur accedamus. Omnis
 quippe corporis affectus à naturali constitutione re-
 cedens, aut est morbus, aut morbi causa, aut sympto-
 ma. Illud tamen sciendum est, affectum et symptoma,
 etiamsi nomina sint latæ significantiæ, hoc tamen lo-
 co eam duntaxat significationem habent, ut sint præ-
 ter naturam affectiones. Nam affectus ipsi generali-
 ter si accipiuntur, non minus sanis quàm aegris eius in-
 sinuabitur significatio. Similiter symptoma causam
 & morbum comprehendit, et utrumq; speciatim hoc
 loco sumi debet. Hic enim symptoma omnis affectus
 est præter naturam, ubi causam morbi internam &
 morbum ipsum exceperis. Pathos alteratio est in per-
 petuo motu, & interdum à naturali habitu non desle-
 ctit. At symptoma non solum in motu, sed etiam in
 habitu quodam est et omnino contra naturam, quod
 non aliter morbum atq; umbra corpus sequitur. Por-

**Actiones anima-
lium tripliciter**

**Deprauati mo-
tus exempla.**

rò symptomata quæ speciatim dicuntur (de his qui-
dem in præsentia differimus) trifariam distinguuntur.
alia enim corporis nostri sunt affectus: alia functio-
num noxæ & priuationes: alia ad utraq; consequun-
tur: ut sunt excrementorum immodicæ tum excre-
tiones tum suppressiones. Similiter strepitus qui in
animante excitantur: atq; omnes reliquæ sensiles,
tum animales tum naturales differentię. Porro ani-
malium actiones tripliciter diuiduntur: ut pote in sen-
siles, motrices & principes facultates. quarum queli-
bet per suas differentias distinguitur. Nam sentiendi
animæ functio, quinq; modis perficitur: Nempe, uisu,
auditu, gustu, odoratu, tactu. Horum cuiuscunq;
actio aboleri debilitari uel deprauarij potest. Sed mo-
uendi functio certum sibi instrumentum uendicat, cu-
ius prima symptomata sunt immobilitas, & ad motũ
difficultas uel imbecillitas, & infirmus uel depraua-
tus motus. Præterea animæ functio, quæ à principe
potentia prodit, per imaginationem, cogitationem, et
memoriam diuiditur. Deprauati motus exempla sunt
tremor, palpitatio, concussio. sic & imaginationis no-
xam, Paralyfin, carum, catalepsin, delyrium: inter de-
prauatos motus collocantur. Est etiam infirmus ac
ueluti deficiens motus in ueterno & lethargo. de qui-
bus in nostris com. super Hipp. aph. diximus. In
cogitandi functione dementia quasi resolutio quæ-
dam

dam est. Stultitia siue fatuitas, ut dicitur, imperfectus ac ueluti deficiens motus est. Fieri etiam potest ut ambas actiones delirium obturbet, ut de quodam Theophilo Galenus lib. de sympt. diff. meminit. Memorandi etiam animæ facultati possunt accidere symptomata, tum in ægrotantibus, tum in his quorum iam finiti sunt morbi. Postq̃ de symptomatis quæ principem animæ potentiam offendere solent dictum est, ad aliud genus functionum, quas non naturales uocant, transeundum. Harum quidem singulis eueniunt symptomata. aut quia in ipsis abolitur omnino actio: aut perperam fit in attractrice: ut appetentia abolita, uel difficilis seu imbecilla & immodica ciborum cupiditas, atq; in concoctricis potentia cruditas, tarda siue difficilis concoctio: & per corpus digestio. Circa sanguinis generationem cum aut non fit, aut male fit. huc refertur etiam aqua intercus. At uerò circa nutritionis actionem si scopum non attigerit: atrophiam & phthisis accidunt: si uitiata fuerit, uutiligo, ophiasis, alopecia, & reliqua id genus symptomata. Item in expultrice facultate, si suum munus ipsa non obeat, seu non probe exequatur, symptomata ex utraq; bile consistunt. Est igitur ipsarum facultatum duplex

Duplex facultatum symptoma

symptoma: alterum cum male procedit actio: alterum cum omnino non fit, ut etiam in nostra institutione de morbis curandis scripsimus. Interdum etiam unicum

affectum, duo uel plura symptomata alterum ex alio sequuntur. ut ad imbecillum complexum fluctuationes, seu nonnunquam inflationes. Nunc ad reliqua symptomata, quæ retentrici potentie accidunt deueniamus, ut est singultus, ruptus & huiusmodi. Quarta, ultas est quam expultricem & propultricem nominamus. Huius priuatio in Ilei, id est, uoluuli morbi differentijs deprehenditur: imbecillitas uero in tardiusculis excrementorum deiectionibus. Sunt præterea symptomata quæ gustu et tactu deprehenduntur: ut ex sudore in os defluente, ac saluia quæ circa linguam continetur saporem inficiente. item cutis duræ laxæ, intentæ, aridæ, rugosæ, attactu. Porro symptomata causæ rationem obtinebunt in intemperie morbo. Quæ uero symptoma partibus, ob affluentem aliquem humorem accidunt, eiusdem quo prædicta, sunt generis. quippe alia obturationem aut astrictionem sequuntur. Quicquid interea reliquorum symptomatum est, siue uoces siue strepitus in animante sint, atque ea quæ à corpore excernuntur, & quæ declinentur in ipso, omnia tanquam soboles, inquit Galenus, à morbis originem trahunt, uel interuenientibus quibusdam symptomatibus. Interea faucium, asperæ arteriæ, pulmonum & thoracis morbi, uocis symptomata pariunt, quippe uocem reddunt clangentem, turbidam, tremulum & raucam: in alijs autem animantis partibus soni, stri-

ri, stridores sibili & id genus, idq; partim ob instru-
 mentorum angustiam & motum errabundum par-
 tim ob spiritus instantis abundantiam: uel quibusdam
 ex his, uel omnibus simul concurrentibus. At ea quæ
 præter naturam uel excernuntur à corpore uel deti-
 nentur, uel tota substantia, uel qualitate uel quantita-
 te à naturali habitu recedunt. Eiusmodi sunt ueluti
 hemorrhagia, id est sanguinis eruptio, quæ fit uel a-
 perto uasis osculo aut rupto uase, aut eroso. Muliebre
 profluium ob easdem causas fit, uel eò quod sanguis
 factus sit tenuis feri substantiam referens. Sudores
 quoq; uel excernuntur immodice uel præter modum
 retinentur, idq; uel necessario, uel ob cutis affectum,
 uel ob dictarum facultatem aliquam, uel ob humorũ
 ipsorum naturam. Similiter sub hoc symptomatum
 genere continentur dysuria, id est, urinæ difficultas:
 ischuria: id est urinæ suppressio, atq; stranguria quæ
 urinæ stillicidium seu fluorem, atq; diabetem nuncu-
 pamus.

Hemorrhagia.

Consentaneum nunc est ut præcipuas symptoma-
 tum causas inquiramus. Est autem causa cuius gratia
 aliquid fit. Et quemadmodum ex materiæ copia, acri-
 monia uel lenitate, morborum imminet afflictio: sic
 ex affectus excessu uel imbecillitate, symptomatis
 magnitudo uel imbecillitas nascitur. nam intemperi-
 es si parua fuerit, paruam quoq; functioni noxam in-

Causa quid.

fert: si maior ad incrementi portionem augebitur & offensa: si uero plurimum à naturali habitu recesserit actionem funditus abolebit. quemadmodum de aquosi humoris qui est in oculo quantitate, substantia, & colore, si parum à naturali habitu fuerit aberratum, parua quoq; inferetur actioni iniuria, si multum, pro quantitate crescet actionis noxa. quod si plurimum deflectatur, functio in totum peribit. Item illustrissimi splendores, sicuti solis, niuis & eiusmodi, uisum offendunt & corrumpunt, eo quod discutiendi uim plurimam obtineant. Porro cui spiritus animalis simul et multus fuerit & æthereus, is res quæ distant & uidere & exacte discernere potest: cui uero paucus fuerit, sed purus, is ut res propinquas plane discernit, ita distantes haud quā uidet: quod si crassior simul fuerit & multus, res distantes quidem uidet, sed non ad unguem discernit: quemadmodum cum humidior simul fuerit & exiguus, is neq; exacte neq; procul uidere potest. Præterea reliqua symptomata, quæ oculis euenire solent, ut sunt suffusiones (quibus uidendi facultas foris cernere uidetur) quæ in oculo apparent. Ad eundem modum quæ ex uentriculi uitio sursum rapiuntur. In aurium offensionibus haud aliter quam in oculorum affectibus accidit: Grauis etenim auditio & surditas animanti euenire solent: aut ob auris partem aliquam, aut ob neruum à cerebro descendens

scendentem, aut ob cerebrum ipsum, si ea in parte unde nervus oritur, oblesum fuerit. Huc pertinent & sordes illæ quæ creberrime in auribus gigni consueverunt, atq; partium constitutio, in his symptomatum causas ostendit, ueluti in lingua naribusq; indicari potest. Est quidem lingua duplici facultate prædita, per alteram quidem sentit, à tunica eam vestiente: Per alteram uerò uoluntatis imperio mouetur. In gustandi sensu eiusmodi depræhendantur symptomata: nam uel saporibus haud quaquam sentit: uel uitiose illos apprehendit: illic gustandi tum functio, tum facultas impeditur: hic uerò cum lingua alieno quopiam humore fuerit imbuta: sic ut omnia quæ gustauerit, uel salsa, uel amara, uel alium quempiam saporem absurdum habere uideatur. Similiter à naribus duplex actio proficiscitur. Nam oderandi & respirandi eis constituta est facultas. utraq; enim (quando scilicet morbus aliquis ita acciderit, ut meatus unde spiritus transire solet obstruatur) impediri potest, interdum & spiritus ipse in uentriculis cerebri contentus afficitur si calida uel frigida intemperie ipsius cerebri uentres oppleantur: deniq; tum contusiones, tum sectiones in his partibus odorum sentionem uel difficilem reddunt, uel omnino prohibent. Symptomatum etiam genera occurrunt, quæ ad attractricem facultatem pertinere dicuntur, ut ex cibis acidis acer-

Lingua duplici
facultate prædita.

Narium actio.

bisq; dentium stupor, & huiusmodi: Item nerui multas ob causas stupidi fiunt, adeo interdum ut sensum & motum amittant. sicuti in paralyfi, quæ si omnes neruos occupauerit, subito uniuersum corpus sensu & motu priuabitur, succedetq; interitus, eò quod spiratio prohibeatur. & tãto periculosior affectus, quanto cerebro propinquior fuerit. Vertebrae siquidem in inferiori loco affectæ (nisi ingens fuerit affectio) stuporem tantum sentient. At quibus quinta spinæ uer-tebra affecta est, eorum manus omnino sensum & motum amittūt: quibus uero sexta, ijs nō in totū sentiēdi mouendiq; facultas perit. quippe primæ brachij partes illasæ seruantur, sed id adhuc multo magis si septima tantū fuerit affecta. Porro quibus spinæ pars, quæ in ceruice est offensa fuerit, ijs omnibus uox abolitur. Ceterum ubi neruosæ partes difficulter sentiunt, pathema illud stuporem uocant. Oritur quidem cū alias ob causas, tum ob intemperiem, sicuti ob frigida medicamenta. Nec differt à paralyfi, nisi quod hæc maiora habeat symptomata. Ab stupore fiunt & ueterni, & sopores, ac stupores: a paralyfi neruorū resolutiones. Porro symptomata quæ uentriculi orificium offendere solent, sunt syncopes, id est præceps uirium lapsus, & cardialgia, id est, cordis dolor. Ad hæc dyspnæa hoc est, difficilis respiratio, fit uel ob præcordiorum obstructionē, uel ob cardiacā, ut uocant, syncopen: Et apnæa

apnæa quæ spirationis abolitio & strangulatio est, et morbus comitialis, qui fit, si instrumentorum (quibus respiratio perficitur) nervi fuerint resoluti. Mentis quoq; ab alienatio, delirium, & insania (quam Melancholiam uocant) inde euenire solent. quæ omnia per consensum accidunt. Abolita uerò & difficilis & deprauata appetentia, per se inheret. Abolitâ Galenus *Appetentia* uocat cum quis continuo nihil appetit: difficilem quæ imbecilla est: deprauatam, uerò ad qualitatis alienæ desiderium reducit. Hæc uocatur à nonnullis Canina. fitq; uel ob acidi humoris uitium, quo mordicus infestatur uenter: uel ubi totum corpus immodicè dissipatum, assidua indiget nutritione: quippe frigidi humoris uitium erosionem inducit, atq; cibi magis quam potus desiderium adfert, idq; propter refrigerationem. Et ut superius dictum fuit, interdum plura symptomata ordine sese comitantur, ut in uentriculo symptoma primum est inanitio: alterum inanitarum partium naturalis appetentia, hanc sequitur uentriculi succio, deinde suctionis sensus, postremo ipsa animalis appetentia, omnium ultima, atq; functionē aboleri contingit, si uel suctionis sensus pereat, uel succio non fiat, uel corpus non inaniatur. At deprauatas qualitates appetunt ij quibus uentriculi tunica malo quodam excremento sunt imbutæ. Hæc quidem mala qualitate seu appetentia, mulieres uitiosis humoribus refertæ, uexari solent, idq; cū uterū gestant, uocaturq;

Citta & malacia . Appetunt maximè acerba, nonnunq̃ acria, interdum cimoliam terram, uel testas, uel extinctos carbones, & id genus. At complures eò uitiō laborant, usq; ad secundum & tertium mensem: in quarto uero quiescunt: partim quod uomitione uitiati humores expurgantur, partim quia concoquuntur, ut pote quia paucū mulieres cibum absument ob fastidium: multitudo etiam humorum per uomitionem est imminuta. Etenim primis duobus mēsis fœtus paucum ad se sanguinem trahit, eo quod parum adhuc auctus sit: ubi uerò iam accreuerit, plurimo indiget alimento. quo tempore non id modo quod optimum est ē uenis allicit, uerum etiam aliquid uitiosi simul attrahit. ita fit ut uniuersum corpus plethoricum esse desinat, & minori humerum uitio crucietur. Accedit & malacia uiris, quod ipsis quoq; uitiati humores ad uentriculi osculum defluunt . Immoderatam quoq; sitim uitiosi humores, falsi aut biliosi, cum in tunicis uentriculi continentur, excitant. Est præterea aliud symptoma uentriculi orificium infestans quod *καρδιαλγία* Græcis dicitur, ad sentiendi facultatem pertinens, ex succorum acrimonia . Hunc affectum improprie cordis dolorem antiqui interpretantur, cum tamen non cordis sed uentriculi ipsius orificij sit affectus . Accedit & *Βούλισμος*, id est uehemens fames, quando scilicet uenter penuria, imbecil-

becillitate, & refrigeratione afficitur. Refrigeratur enim uentriculi osculum spiritu frigido, potione, cibo aut medicamenti suapte qualitate infrigiditantibus. Similiter ex consensu cerebrum, quia per neruosum genus cum uentriculo, sicuti per magnam arteriam cor ipsum, frigoris iniuria afficitur. Etenim arteria hæc (quæ maxima est) à corde per spinam incedens, primum quidem stomacho iungitur, deinde ipsius osculo, ac deorsum procedens, ipsi quoq; uentriculo secundum longitudinem subtenditur. Porro symptomata quæ à causis fiunt humidis, somnum inducunt & interdum pro somno, ueternum, grauemq; saporem. At siccitas immoderatio ac calor sicuti in phrenitide, ob succum quempiam & mordacem & calidum irritatum uigilias infert, quas neq; mæstitia neq; sollicitudo peperit. Et ut apoplexia actiones, sic profundus somnus sentiendi functiones offendit. In utrisq; enim deprauatus cerebri motus depræhenditur, atq; ob id particulatim reliquorum quoq; membrorum omnium. deprauato quoq; motu communi genere continentur, conuulsio, tremor, palpitatio, rigor, horror, singultus, tussis, ructus, sternutamentum, pandiculatio, oscitatio, stridor. Sunt & conuulsionum differentie, de quibus in commentarijs lib. 2. Aph. Hipp. meminimus. Per inuersiones & strabilismos conueluntur oculorum muscoli: hinc si uel manus, uel crus
uel

uel musculus, uel alia quæuis corporis pars extendatur, aut conuellatur, ad illum semper neruum qui partem mouet referenda est noxa. Iam uero gonorrhæa aliam constituit differentiā: si enim rigido penè semen effluat, ueluti conuulsio quædā, et si non rigeat penis, ad retentricis facultatis imbecillitatem referri debet. Est etiam inspirationis quædam species ad conuulsionem pertinens, quæ si conuulsis musculis inspirationem efficientibus accadat erumpatq; ad externam, non parum offendit. ob id Hippocrates spiritum offendentem nuncupauit. Præterea apoplexiam, neruorum per uniuersum corpus resolutionem sicuti et morbum comitalem conuulsionem satis esse constat: itidem stuporem imperfectam quandam resolutionem. Interea stupidarū partium offensa plures parit differentias, quàm testari sim coactus. Cæterum extensa manus duobus æque ualentibus motibus sursum quidem ferente facultate, trahente uerò deorsum insita grauitate. Sic et tremor duobus perficitur motibus, uno cum cogitur membrum ob grauitatem ad inferiora rapere: altero dum sursum fertur à facultate.

Tremor. Tremor igitur motus est compositus. sicuti arteriarū pulsatio, in his quidem quies sensu percepta δ'ιαστολῆς, id est distinctionem separat à συστολῇ id est contractione, nisi forte densissimus aliquando fuerit pulsus, ueluti in formicante pulsu uidere licet. Porro

ut in

ut in membrorum palpitacione fit motus paucus, tardus & rarus, ita in rigore fit multus, citus, & densus. Huc referuntur causæ quæ potentijs insunt, quæ quidem dum sanæ fuerint suas actiones perficiunt. Etenim uenter cibos concoquit, dum eos continet, si autem impediatur ex cruditate fiet symptoma. Porro cō Concoctio coctio alteratio est secundum qualitatem. Et cū altera trix facultas actione priuatur concoctionis uitiosa est symptoma. Interdum uentriculo haud quaquam affecto animans non coquit, aut propter ciborum potentiamq; immodicam quantitatem, aut malam qualitatem: aut quia intempestiue, aut non recto ordine ingeruntur: aut propter excrementum inutile, uel somnum breuem seu studij cuiuscunq; fuerit consideratio nis uehementiā. Si propter cibos symptoma acciderit facile corrigitur: si uerò ob extremæ potētiae casum in lienteriam, uel aquam inturcutem, quam tympanitem uocant, permutabitur. Quibus uerò ob potētiae imbecillitatē id euenerit, ij in eam speciem aquæ intercutis accidere solent, quæ Anasarca dicitur. Caterum omnis intemperies si uehemens fuerit, uires deijcit, & iuxta qualitatem quæ exuperat morbos gignit. ut si frigus uicerit frigidos: si contra calidos: idem in reliquis duabus appositionibus cōsiderare oportet. Atq; si ob frigoris uehementē intemperiem cibus omnino crudus permanserit, neq; sitiūt qui afficiuntur, neq; febriant: si uero

si uero cibus immodice fuerit calefactus, tunc quidem absq; putredine permanere nō potest. & qui hoc modo affecti cruciantur, malignis ac hecticis febribus interdum corripiuntur, quod si leue aliquod concoctionis uestigium cibus imprimatur, fueritq; ciborū natura aut modice temperata aut frigidior, acidi ructus excitantur. Sunt & alia non pauca symptomata, quæ actionum imbecillitate uel humorum qualitate (de quibus alibi dictum est) in uarijs corporum partibus consistunt. ut si fuerit multorum excrementorum redundantia, id ob alteratricis facultatis imbecillitatem accidit. Itaq; cum attrahendi uis succum multum alliciat, non potest alteratrix quicquid attractum est conficere, tum multa redundantia excrementa, ad expultricem uim minus probè imbecilliusq; suo munere fungitur. Multa apud Galenum lib. tertio de sympt. causis adhuc symptomata referuntur, ueluti in suppressione uel profusione sanguinis, alijsq; defluxionibus. Affectus igitur qui actionem uitiat morbus est. Hunc si quid assequitur: symptoma, & quod morbum excitat, causa dicetur.

DE CORPORIS HUMANI

morbis & primo de febribus.

CAP. XVIII.

Absoluta

ABSOLUTA quodammodo ea Medicinæ parte quæ Græcis αἰτιολογικὴ dicta est, de morborum generibus dicendum, ab ipsis statim febribus desumentes exordium. Primum igitur scire oportet quod in uniuersum sint morbi: deinde ipsorum species: postremo quo pacto cuiusq; sit sumenda curationis ratio seu methodus, de qua alibi scripsimus, atq; insequentibus dicetur.

Porro morbus omnis est uel ex in simplicibus, primisq; qualitatibus, nempe frigore, calore, humiditate & siccitate: uel organicis seu instrumentalium fabrica: hoc est, numero, forma, situ, magnitudine: sub qua concavum (quod substantiæ partis amissio est) continetur. Tertio in unitatis solutione, cuius multæ sunt species, utpote uulnus, ulcus, fractura, caries, spasma, contusio, ruptura: & id genus. Et cum omne simplex prius sit composito, iure optimo ab ipsis febribus, eisq; simplicibus incipiemus, quæ intemperaturæ sunt calidæ & siccæ. Atq; non solum unam actionem lædunt, sed omnes totius corporis facultates. Interea simplex affectus facilius concoquitur, & minus quam multiformis est periculosus. quod Galenus lib. 1. crys. indicauit.

Morbus omnis triplex.

Febrium qualitas.

Febris igitur natiuus est calor in igneum conuersus, qui à corde initium sumens, per arterias et uenas, sanguine & spiritu mediantibus, in uniuersum corpus diffunditur.

Febris quid sit.

M Cate-

Februm prima
diuisio.

L. 1. de diff.
feb.

Ceterum prima febrium diuisio in duas partes est distributa, aut cum simplices illæ sunt, utpote cum calor præter naturam in spiritibus, uel uasis, uel solidis partibus accenditur: aut compositæ cum altera febris species cum altera coniungitur. Galenus sequutus Hippocratem, febrem diuisit, primum in differentias essentielles, quæ sunt à caloris qualitate & quantitate: deinde in accidentales. Primum quidem ab accidente propinquo, postea à remoto. Et cum mordaces febres dixerit, non solum in manibus ægri calor expendendus, sed quia aer ambiens potest immutare, ideo in medium thoracæ ubi cor est, immissa manu calor mordax præcipuè deprehenditur. Mitiores eas febres uocauit, quarum calor blandus est & mitis ad tactum Medici. Sic & quod transpirat per cutim non acre & mordax, ut in illis, sed blandum: ut uidere est in pueris febricitantibus. Eiusmodi febres multæ sunt, ueluti diariæ, Epiale: nonnullæ etiam pestilentes in quibus pulsus & urina maxima ex parte fallunt: sunt enim similes naturalibus, Sunt & nonnullæ diariæ putrentes, quæ calorem habent acrem: aliæ non mordaces sed insurgentes: aliæ acute, quæ manus attactu iudicantur. Etenim febrilis calor in humore contentus ac subsidens, qua parte manus Medici admotæ est ac diu detenta, clementior fit & tandè discutitur. Porro febres in quibus mitis & blandus calor deprehenditur, ubi

tactis

lactu quis instat mordax & acrescit defluuium, & ob id incrementales dicuntur, cuiusmodi est quotidiana pituitosa. Itaq; Galenus exemplum ex ligno uiridi in primo de diff. febr. & nono Meth. adfert. ubi cutem febricitantium calidam semper esse debere dixit, ut poris apertis materia possit exhalari. Nam si cutis refrigeret clausis spiraculis, excrementa retenta febre augent. Quapropter in declinatione febris diariæ & biliosæ balneum consulimus, quod suo calore moderato rarefaciat cutim, euocet excrementa, & prohibeat alias accessiones.

Febres interea ephemeræ seu diariæ proprium & Febris Epheme
ra. inseparabile indicium est urinae concoctio, statim primo die, & ad hæc pulsus in magnitudinem ac celeritatem auctio: ita ut frequentia per exteriorem quietem minime seruet proportionem. Magis præterea proprium & inseparabile indicium est quod contractio, quæ fit in arteriarum motu, minime in celeritatem crescat aut si increseat id minimum est ac cognitu difficile, nec non paululum à pulsu naturali recedens. Quin etiam caloris suauitas & æqualitas sicuti inclinatio quæ cum sudore aut madore, aut uapore quodam suaui est quam integritas perfecta excipiat. Atq; ijs indicij febres diariæ promiscuè cognoscuntur. Sunt igitur febrium simplicium tria prima genera seu speci- Febrium simpli-
genera tria.
es: Ephemera, putrida, hectica. Ephemera seu diaria

M 2 fit quana

fit quando immodicus calor in spiritibus (ut iam dictum est) incenditur, fitq; ut plurimum à sanguine calefacto non tamen putrido, sicuti Galenus lib. 2. de diff. feb. testatur. Hanc febrem latini diariam simpliciter appellant, eo quod solui uno die naturali sit apta. ex solis aestiui calore, frigoribus, lassitudine, exercitio, seu labore motuue immoderato, item ex uigilia, ira, medicamentis acribus, atq; balneis calefaciendi astringendiq; ui præditis & huiusmodi, sicuti etiam in nostra de curandis morbis methodica institutione diximus.

Feb. Ephemera duplex.

Ceterum febris Ephemera interdum primo die propter causæ paruitatem desini, interdum uerò propter ipsius multitudinē ad tertium usq; diem extēditur, & tunc uocatur diaria plurium dierum, seu synochus non putrida. Quod si spiritus cum sanguine incaluerint ac diutius caliditatem retineant, tum Ephemera in putridam conuertitur, & cum id quod putrescere potest, depascentem semper calorem secundum cōtinuitatem habeat, non mirum si in heclicam quoq;

Feb. Ephemeræ una est accessio

degeneret: et progressu temporis in Marasmm. Porro in febre Ephemera seu diaria ab initio ad exitum usq; una est accessio, nisi ipsam excipiat ea quæ ex putredine humorum nascitur. Atq; in diarijs febribus causa effectrix abit quoties ab ira, dolore uigilia, cura sole aestiuo, fatigatione, bubone, uel pertinaci studio, cōstipatione, febris ipsa gignitur: manet uerò quoties
uel ab

uel ab extrinsecis, ueluti frigore, uisione, balneo aque aluminosæ, & alijs id genus: uel ab ipsa febre, uel cū stipatio aliqua inde facta est Præterea febris diaria ex se indicationem habet; sed cum hac, naturam, ætatem, consuetudinem, anni tempus, cæli statum, regionem et uires expendere oportet. In reliquis autem quæ accessionis suæ causam intus habent, prima indicatio ab ipsa sumitur causa, cum nec in pulsu, nec in calore, nec in lotio putredinis adhuc animaduertitur nota: atq; ex sola obstructione quæ ortum habet, ipsius obstructionis solutione curatur. Particulares igitur ipsarū febrium differentia una quidem cum effectricum causa amplius non est, ueluti uisio: altera cum adest ut constipatio, quæ est meatuum & cutis densitas. Hæc alias ex siccitate, feruore, fatigatione, seu ira prouenit alias ex frigore siue hoc simplex fuerit siue astrictoria quadam ui compositum. Porro obstructionum ipsarum alia est ex abundantia: alia ex qualitate succorum, qui lenti & crassi sunt.

Alterum genus simplicium putrida febris nominatur, quando ob calorem præter naturā, tum intra tum extra uasa humores putrescunt: Intra uasa uel unus duntaxat, uel simul inter se. & si unus tantum putruerit, febrem iuxta peccantis humoris qualitatem excitabit: ueluti sanguis, si exuperet & putrescat, synochium putridam generabit: quæ sola sanguinis detra-

Secunda febrium simplicium species.

Feb. ex sang:
putrefactio tri-
plex.

περίοδος
quid.

Feb. intermit-
tens duplex.

ctione antequam putresceret curari posse Galenus
lib. 9. Meth. & 2. Crys. ostendit. Aliquando etiam ex
mala qualitate sanguis corrumpitur, aut dum alteri
cuiuspiam humori putrescenti (cuiusmodi est bilis) per
miscetur. Porro febris quæ ex sanguinis putrefactio-
ne excitatur, triplex est species. Prima Græcis πυ-
ρετός ἐπιδεικνύμενος, quæ quotidie augetur, sitq;
ceteris periculosior. Secunda ἀκμῆς ἐπιδεικνύμενος, quæ
æqualiter affligit, Tertia παρακμῆς ἐπιδεικνύμενος, quæ quo-
tidie decrescit. Porro bilis si intra uenas putrescat
eam febris tertianæ speciem generabit quæ συνεχὴς
græco sermone dicitur. Hæc continuo affligit, quan-
tæ tertio die maior percipiatur affectus. Quod si intra
uenas cordi propinquas bilis ipsa conclusa sit, quæ si-
militer assidue uexat, ea tertianæ febris species erit,
quæ græcis καὶ σὸς dicitur, latinis uerò ardens. At
febris ex bile quæ extra uasa putret unum diem inter-
mittit, diciturq; à Græcis περιόδου, id est, interpo-
lata. περιόδος Græci uocant uniuersum spacium, à
primo insultu unius accessionis, usq; ad insultum alte-
rius, nos uerò circuitum appellamus. Præterea febris
intermittens duplex dicitur, aut enim ex pura bile
aut alio quodam humore mixta. Quæ autem ex pura
& syncera bile (quæ flaua dicitur) febris adest, statim
cum rigore inuadit, atq; causodes nuncupatur, & bi-
lis ipsius uomitu uel deiectione uel sudore, uel quibus-
dam

dam horum uel omnibus simul curatur. Huius febris longitudo est horarum duodecim, uocaturq; tertiana Feb. tertiana exquisita. exquisita. quæ quidem ex temperamento bilioso ac tempore, regione uictu calido & sicco, originem habet. Præterea bilis copiosior longiorem quam paucior efficit acceſſionem: tenuis breuiorem quam crassa. Sic & uires ualidiores breuiorem imbecilliores longiorem. Et corporis dispositio rara quidem breuiorem, densa longiorem. Ad hæc febres biliosæ maxime ardentes sunt, nam bilis statim incenditur eò, quod omnium humorum sit calidissima & simplicissima.

Cæterum febrī tertianæ exquisitæ si quid horum quæ dicta sunt defuerit hoc est, si acceſſionis tempus breue non sit uel initium cum rigore & non soluat ur uomitu, sudore, uel alui deiectione: amplius non erit exquisita, sed simpliciter tertiana dicetur. Quod si & intermissionem minorem habuerit quam pro sua natura, tertianam productam uocant. Feb. tertiana producta. Interdum enim horis uiginti quatuor producit ur, aut circiter triginta, uel ut plurimum quadraginta, & tum ex acceſſionis tum intermissionis tempore alimenta administrabimus. Consistit igitur febris tertiana plurima ex parte in corpore bilioso, uigente ætate, æstiuo tempore. Similiter regione, temperamento, aëre ambiente, calidis & siccis. Item labore, cura,

Febris ex flava
bile duplex ge-
nus.

uigilijs, æstu, & uictu parco, tum calefaciente tum ex-
iccante. Quin & immoderatus usus medicamento-
rum calefacientium & siccantium febrem tertianam
gignit. quæ quidem (ut etiam in nostris commentarijs
aphorismorum diximus) ultra septem circuitus non
extenditur. Sunt & cõtinue febres ex flava bile. harũ
duplex genus est. Vnum quidem earum quæ synochi,
id est continentes appellantur, in quibus una est ac-
cessio ab initio usq; ad finem, alterum earum quæ com-
muni sed ambiguo genere, continue dicuntur, quæ mul-
tis particularibus circuitibus constant. Atque harum
februm duæ primæ sunt differentie: nam earũ quæ-
dam principio ad finem usq; equaliter affligunt, quæ-
dam paulatim augentur, aliæ decrescunt atq; imminu-
untur, ut iam diximus. Sunt etiam quæ solummodo
tertio quoq; die habeant accessionem: aliæ die inter-
medio alteram accessionem inferunt. Ex continuis
quæ in die medio accedunt, quædam in forma quoti-
dianæ procedunt, duas accessiones similimas efficien-
tes: quædam uero duas quoq; sed dissimiles.

Februm itaq; simplicium ab humoribus, simpli-
ces differentie tres sunt numero, quædam enim & ut
plurimum ex flava bile, quædam ex atra & quædam
ex pituita. nam febres ex sanguinis putredine quo-
dammodo biliosæ sunt, eo quod sanguis ex moderato
calore generetur, flava uerò bilis ex maiore sicuti
atra ex

atra ex sufficienter immodico. Quicquid enim pingue & tenue in sanguine est, fit flaua bilis, crassum uero ac ueluti sex, quando immodice calefactum exaruit, atra. Flaua etiam bilis quandoq; in atram conuertitur, cum affata fuerit. Ceterum febris quotidiana exquisita, à pituita fit intra uenas putrescente, quæ assidue urget. Sed cum his humor extra uenas putret, interpolata est febris: quæ singulis diebus affligit egrotandem.

Tertia species est ἀπίαλος sic dicta quod leniter affligat, fitq; à pituita uitrea profunda corporis parte quadam putrescente quæ multum frigida est. Hæc rigorem cum febre eodem tempore et corporis parte infert. Et quicunq; hac febre laborant eorū corpus interius friget, exterius uero calidum sentitur. Huic contraria est λυπυγία quæ ex quotidianarum genere est, fitq; à phlegmate præter naturam calefacto ac incenso. Et quia ex dimidio uel parte aliqua phlegma in hac febre tantum putret, quotidie inuadit. Porro simplex ac exquisita febris ex pituita putri, quæ per membra sentientia pellitur, incipit cum frigore partium extremarum, difficulterq; accenditur: sed longum obtinet incrementum, quia humor, ex quo febris hæc fit, frigidus est & humidus. ob id natura pituitosis ac tempori, regioni, studio, uictui, alijsq; omnibus pituitosum humorem gignentibus accidere solet. simi

liter in regione humida, uita ociosa, simul cum repletionē & maximē quoties à cibo lauantur & multo magis post cibum pituitosum.

Feb. quartana.

Rigor febris in quartana & tertianæ qualis.

In quartana etiam febre solus humor melancholicus intra ueras putrescit. quapropter sine intermissione (quantū quarto quoque die manifestius) affligit. Si uero extra uenas humor ille putrescat, interpolatam (ut de alijs duabus speciebus dictum est) generabit. quæ quarto quoque die recurrit, & ob humoris crassitiam & frigiditatem tarde mouetur. Hanc febrem necesse est antecessisse quicquid colligit atram bilem ex uictu, celi statu, tempore, regione, ætate, & natura ægri melancholica, frigida & sicca. Atque rigor hanc febrem præcedens, nequaquam ei qui tertianam præcedit, similis est. In tertiana enim quasi pungi corpus sentitur: in quartana uero rigor similem frigidationi habet, qualis per gelu tempore hyberno percipitur, quemadmodum Galenus lib. 2. Cris. indicauit. Accessio præterea huius febris, longitudine temporis tertianæ similis est. Atque interdum accidit ut sit longior, quamuis exquisita, quoniam ex humore frigidior generatur. Est altera febris quartana ex bilis aduersione, quæ post feb. tertianam solet euenire, de qua in com. Aphorismorum nonnihil scripsi. Ex pituita igitur putri, quotidiana: ex bile flaua tertiana: & ex atra quartana efficitur, qui quidem humores si intra uasa

uasa putreant, ex continuarum sunt genere, si uerò extra uasa tum non continuæ sed intermittentes nuncupantur. atq; de his plenius in praxi quam Deo uolente sum editurus.

Nunc de tertia febrium simplicium differentia quam in solidis partibus fieri diximus. Hæc autem hectica dicitur: quæ magna ex parte ex febrib. adurentibus ortum habet, & temporis progressu fit *Tertia simplicium feb. diff.* Marasmus. Porro febris hectica cum ab initio procedit signa febris diariæ, ob mœrorem, iram, lassitudinem, magna cum uestione contractam habet. Distinguitur autem à Marasmo solo caloris affectu, nam hectica non solum sicca sed calida quoq; affectio est: marasmus uerò natium calorem extinguit, ac præcipitanter arefacit. Signa utriq; erunt oculi supra modum caui & quasi in fouea quædam reconditi, ob totius humidæ ipsius substantiæ consumptionem, unde ossa quibus palpebræ annexæ sunt, multum prominent. quinetiam lippitudines aridæ in eis uisuntur ac quædam squalida dispositio, qualis maximè inest eis qui per puluerem multum tota die sub sole calido iter fecerunt. Perit uiuidus color, habeturq; immoderatus squalor in facie, maximè circa frontem, atque ob siccitatem difficile palpebræ attolluntur, sed dormientium more conniunt, nec tamen somnus est illa affectio, sed uigilandi impotentia.

Carnas

Carnes præterea consumptæ sunt circum tempora, ita ut & loca collapsa cauaq; appareant, cutis ad tactum perquam sicca & ueluti corium, si digitis eam quis attollat sentitur, pulsus gracilis, durus, debilis ac frequens, calor in primo occurso debilis, sed paulo post acer & erodens, maxime ubi tangendo quis diu-

Marasmus. tius immoratur. Marcor seu marasmus incipit, quoties humor per corpus dispersus amplius fere, ne dum in ipso cordis corpore, inest. Pulsus etiam debilis, durus & frequens propter magnam cordis intemperiem. Et cum in hisce febribus hecticis leuitates intestinorum & fluores adsunt, seu statim ab initio, seu procedente tempore, marcor ipse subsequitur, nam humiditas abit.

Febris hectica triplex.

Ceterum febris hectica triplex est, quædam enim. Prima ac simplex & cognitu facilis: in qua diariæ febris (ut iam diximus) signa primo die appareant, atq; ex causa prægressa eius indicium sumere oportet, ut si ira præcesserit uel mæror & huiusmodi: & adhuc magis si ad secundum diem extensa, nequaquam desinat ad integritatem, sed neq; uehementior euadat.

Secunda dicitur media inter iam dictam speciem, & marasmodem, habetq; ambiguum ad curationem utraq; uersus momentum, & quæ Marasmodi propior est, magis periculosa: quemadmodum priori alteri propinquior spem obtinet sanitatis non parua.

Inte-

Interea cuilibet hecticae feberi proprium inseparabileq; signum est, quando ingesto cibo calor accenditur pulsusq; in magnitudinem ac uelocitatem increfcit, ita ut æqualis accessio esse uideatur, hoc est in qua nec horror exstitit, nec frigus extremarum partium, neq; somnus neq; pigritia insignis, uel in calore, uel in pulsu: imo nec paruitas, nec debilitas, nec aliud huiusmodi quicq;. Hæc una continua est febris, ueluti ea quæ synoches, id est continua, proprie nominatur, quæ occurrentem ueluti flammam manum imponentibus habere uidetur. Præterea quoq; pulsus uelocissimus maximusq; existit. In febre autem hectica neq; calor multitudo occurrit, & pulsus tanto minor, rarior, ac tardior est, quanto in synocho calor ipse mitior habetur, quemadmodum Galenus indicauit. Lib. i. de diff. feb. itaq; hectice febris indicium est, si exigua & æqualis semper sit à primo initio ad ultimum finem: proprium uerò eius quæ tabi affinis existit siccitas est: quoniam hectica febris sæpe absq; necessitate adest, nequaquam transiens in marcorem.

Præterea qui corporis habitum habuerit humidum febre hectica statim ab initio non intercipietur, sed qui sicciorem maximeq; si is calidus quoque natura sit, & uitam delegerit in labore, uigilijs, cura, ac uictu tenui, ex his statim ab initio febre hectica ex ira et morore solet corripì, atq; id multo magis quoties æstas et
consti-

constitutio calida est & sicca. Maximum quidem signum febris hecticae fuerit, si arteriae ipsae sentiantur calidiores, quam corpora quae circiter sunt, quod per alias febres minimè euenit, sed adhuc euidentius signum erit, ubi laueris, aut alio quouis modo rare feceris, ita ut humor quidam profluat, atq; calor ipse perspiret, quum moderatus calor in alijs partibus omnibus post talem perspirationem apparet, in ipsis autem arterijs nequaquam mitior priore. Sola ergo consistens hectica perspicua est, etiamsi marasmodus fuerit. Sed ubi cum aliquapiam fuerit complicata difficilior cognoscetur. Hac de tribus febris simplicium speciebus.

Feb. pestilens.

Sequitur ut de pestilenti de qua etiam alibi diximus, paucis perstringamus. Hac autem à putredine ortum habet, ob id sub putrida potest contineri. Incipit autem magna ex parte ex putridis exhalationibus cadauerum & paludum seu stagnorum, aestiuo praesertim tempore, interdum immoderatus calor circumfluentis aeris pestilentis febris est principium. promptissime quidem putrescunt quaecumque calida & humida, aut multa in locis calidis, nisi diffrentur & refrigerentur. & ij potissimum peste corripuntur quorum corpora obnoxia sunt putrefactioni. Quando igitur aeris temperamentum ab ipso naturae habitu immoderate ad humiditatem & caliditatem conuertitur, pestilentes ferè morbos oriri est necesse, atque eos maxime affici

affici, quorum corpora prius plena fuerint excrementosissimis humiditatibus. Ob id Hippocrates corpora humida statim exsiccare iubebat quando pestis iam imminere uidebatur. Et in siccioribus pristinam naturam custodiebat. quæ uerò excrementis plena corpora iudicauit, purgationibus deijciebat quæq; noxam inferebant. Sic & meatuum obstructions aperiendas liberandasq; ostendebat. Sed & corporum dispositiones dissimiles multiformesq; respiciebat. nam quædam uincuntur et facile ac promptissimè patiuntur ab agente causa, aliæ penitus impatibiles sunt, aut difficulter patiuntur. Signa per quæ pestilentem febrem deprehendamus, sunt deliria, flaua bilis, uomitiones, præcordiorum intensiones, exuperantes sudores, extremarum partium perfrigeratio, alui fluores flatulenti, biliosi, tenues. Ad hæc urina aque, biliosa, tenues, nigra, cum malis sedimentis & suspensionibus. Adsunt & stillicidia sanguinis, narium fluxus, ardores pectoris, sitis uigilia, mœrores, conuulsiones uiolente, & complura alia humanæ naturæ aduersissima. Considerandum quisnam sit temporis status: ut si aridum esse oportebat, & humidior sit redditus, necessum est ad siccitatem uictum conuertere, & humiditatem exuperantem siccare. Huius interea febris curandi methodus in libro quem de morbis curandis edidimus est tradita.

Com. ill. Epid.

Signa Feb. per
Silentis.

Hactenus

Febres compo-
sitæ.

Hactenus de simplicibus febribus, iam uerò de com-
positis dicere progrediatur. Febrium itaque implexus
fit quando febres ipsæ diuersis horis inuadunt. Com-
plicantur cum alijs eiusdem generis, ut continuæ cum
continuis: intermittentes cum intermittentibus: item
eiusdem inter se species: ut tertiana cum alia tertiana.
similiter & quartana cum alia eiusdem naturæ, quæ
quarto quoque die recurrat, interdum etiam differen-
tes genere, ut intermittens cum continua.

Ceterum febris tertianæ & quotidianæ quatuor
sunt complicationes. Prima est tertiana & quotidia-
na. Hanc græci ἀμειγνύου σφυγμῶν, id est quo-
tidianam continuam, illam uero τριτάτου uocant. Se-
cunda quando tertiana intermittens quotidianæ con-
tinuæ iungitur. Tertia ubi quotidiana intermittens,
tertianæ continuæ miscetur. Quarta ubi quotidiana
continua tertianæ continuæ copulatur. Eadem ratio-
ne febres quæ ex partium inflammatione oriuntur
nonnunquam complicantur, ut si partes diuersæ propri-
am febrem accendant, aut affectus unde oriuntur mix-
ti fuerint, sicuti in inflammatione Erysipelatode. At-
uerò nisi simplicium febrium species prius cognouerit
mus, minimè compositas assequemur.

Quotidiana
simpliciter.

Quotidiana simpliciter & sine adiectione ea dici-
tur, quæ singulis diebus accedens desinit ad integrita-
tem, quæ quotidiana intermittens dici potest: sicuti ea

quæ

quæ tertio quoq; die accedit tertiana . Altera ter-
 tiana continua est quæ continuo affligit, tametsi ter-
 tio quoq; die euidentior fiat . Semitertiana quoq; Feb. Semitertiana.
 assidue uexat, ex tertiana & quotidiana continua or-
 tum habens. Huius generationis duplex est modus, aut
 enim in unum tempus due accessiones concurrunt,
 quarum una iuxta naturam ipsius semitertianæ inua-
 dit, altera ab initio morbi usq; ad finem, quæ exquisi-
 ta semitertiana dicitur. Ex his igitur accessonibus al-
 tera præuenit altera cunctatur: aut ambæ eodem tem-
 pore fiunt . Similiter exquisita tertiana & quoti-
 diana continua coniunguntur, fitque semitertiana,
 quæ uel flauam bilem exuperantem habet, uel eam
 pauciores, pituitam uero copiosiores uel contra, et
 quotidianæ uel tertianæ pathemata certiora : uel si
 æqualiter, æqualia . Cæterum exquisitam semiter-
 tianam Hippocrates in lib. 1. Epid. horrificam conti-
 nuam & acutam uocauit. Galenus etiam lib. 2. Cryf.
 non pauca ad huius notitiam scripta reliquit. Interea
 semitertianæ (quæ extensæ etiam tertianæ à Galeno Lib. vi. Epid.
 uocantur) die uno magis quàm altero affligunt, atq; part. ij.
 ab exquisitis tertianis differunt : quod in his intra ho-
 ras duodecim exacerbatio circumscribitur : reliquæ
 uerò horæ febre uocant: illæ sine intermissione ut iam
 diximus, affligunt . Semitertianæ igitur ex intermitten-
 tium numero non sunt, quapropter periculo non ua-

cant, sed febres quarum paroxysmi tēpus non breuius horarum 24. est, omnes simpliciter tertianæ uocabūtur, quibus uerò dicti temporis interuallum breuius est, exacerbationes uerò longiores, protense tertianæ dicuntur. Sunt autem quatuor omnia interualla & ea plerumq; ad tria usq; perueniunt, secundum eum quē tertio quoq; die fit circuitum. Duæ namq; dies, duæ pariter noctes, accessionibus duabus interponuntur in omnibus illis quæ tertio quoq; die exacerbantur. Rarò autem febrem ultra tria interualla exacerbata et ad integritatem finientem Galenus lib. 6. Epid. repetiri testatur. Ex quotidiana intermittente & biliosa continua, horrida nascitur: Sed ex biliosa continuitate & ex pituitosa horrorem: sicuti ingeminationes ex pugna mutua, maxime quoties humores ipsi fuerunt æquales obtinet. Rursus febres horridas Hippocrates uocat, quibus per augmentū & incrementum accessionis: ut uocant, ægros horruisse significatur. Sunt adhuc tres febrium species, de quibus Aui-cēna: Prima, ubi corpus calore et frigore intus & extra præmitur, duplici materia phlegmatica: altera interius, altera exterius ad putredinem commota, quæ etiam quotidie affligit. Altera diurna est, ex phlegmate extra uenas die tantum putrescente & affligente. Tertia iam dicta contrariæ est, ut quæ per noctē præmat & affligat ægotantē. Sed nunc sequenti schemate, generationem dicta perstringamus.

Feb.

Feb.
igitur
quædā

Simplices: ubi
calor præter
naturā accen=
ditur in

Composita cū
altera febris al
teri copulatur
Vel generis

Spiritus et
tunc fit Feb.

ephemera

Vasis: et fit Sy
nochus

Paribus soli=
dis: fitq; Feb.

Vnius Diei

Plurium dierū

Non putrida

Putrida

Hectica

Marsinus

Eiusdem: ut cō
tinua cum con
tinuis

Diversi: ut in=
termittens cū
continua. Vel
etiā

Eiusdem spe=
ciei: ut tertias
na cū alia ter=
tiana.

Diversi: ut ter
tiana cū quoz
tidiana

Intra

Vasa

Extra

et exarescens
id est increfcens:
ubi plus est quod
putrefcit, quā
quod dissoluitur.

et exarescens seu
quod oeros, id est
equalitate affli=
ges: in qua equa
le est quod pu=
tret, ei quod dis=
soluitur.

et exarescens
hoc est decrefcens,
quādo id quod de
fuit, plus est quā
quod decrefcit.

¶ Quia ex quodidantur sunt genere.

DE RELIQUIS PARTICVLARIBUS MORBIS. CAP. XIX.

CAPITIS MORBI.

Alopœcia
Ophiasis
Ptilosis.

SUPEREST ut de alijs sigillatim morbis ordine dicamus. Ab ijs quæ caput inuadere solent sumpto initio. Et ut sunt uarij ita sunt diuersis appellationibus nuncupati, quas equidem à Græcis mutuati sumus. alioqui coacti fuisset in omnibus ferè noua uerba excogitare. Alopœcia igitur, Ophiasis & Ptilosis ex eo sunt morborum genere, in quibus naturale aliquid est deperditum. fiuntq; ex humoris superabundantis uitio. quod ex cutis colore dignoscitur, atq; pro humoris peccantis figura duntaxat dissident: Illa deciduum capillitium: hæc locum tortuosis spacijs serpentis instar capitis affectum glabrum efficit. Sed Ptilosis palpebrarum est in callum indurata crassities rubens, quam magna ex parte, ut postea etiam dicetur, capillorum defluuium committitur. atq; ciliorum pilos græci $\pi\iota\lambda\omicron\varsigma$ nominant.

Pityriasis.

Pityriasis, quam Aegineta porriginem. Et Cornarius in sua $\pi\iota\gamma\acute{\rho}\alpha\phi\eta$ pruriginem uertit, tenuium est fursurearumq; squamularum ex capitis ac reliqui corporis superficie nulla relictæ exulceratione decidua resolutio. Prouenit autem subeunte caput malo corporis humore: salsa ueluti pituita aut bilioso

scilicet

seu atrabilario sanguine. Excernuntur etiam à uestica Aph. lxxviii.
 laborante scabie, furfurosa quædam sed crassa $\pi\iota\tau\upsilon=$
 $\gamma\iota\sigma\tau\alpha$ ab Hippocratem lib. 4. Aphorismorū dicta.
 Exanthemata summæ cutis pustulae sunt, & exulce=
 rationes subrubrae salebrosæq;. Psyracia exiles sunt
 capitis excrescentiæ pustulis simillimæ quæ summam
 cutis superficiem exasperant. Achor affectio est
 in capitis cute tenuissimis foraminibus ipsam perfo=
 rans, ex quibus uiscida sanies excernitur, Latini ma=
 nantia ulcera (quæ in pueris plerumq; exoriuntur)
 & alij tineam uertunt. Cerion, latini Fauum ap=
 pellant, quod humiditatem mellis haud absimilem cō=
 tineat. Figura et aspectu præcedentem affectum æmu=
 latur, amplioribus tamen foraminibus humiditas in
 hac continetur, cuius originem ad nitrosam salsamq;
 pituitam Medici retulerunt. Sycofis tuberculum est
 ulcerosum, rotundum, subdurum, rubicundum cum
 dolore, latini ficum appellant. Nec solum capiti, sed
 reliquo corpori, præsertim circa pudenda, hæere so=
 let. Phthiriasis, pediculorum est generatio: quæ in
 pilis superciliorum, alarum, ac pudendorum: inter=
 dum etiam in uniuerso corpore erumpit. $\alpha\pi\delta\tau\omicron\iota$
 $\phi\theta\acute{\iota}\gamma\omicron\varsigma$, id est, à pediculo. Syriasis est partium cir=
 ca cerebrum eiusq; membranas inflammatio, infanti=
 bus accidens. In ea enim fit concauum synciput, con=
 caui itidem cum pallore oculi. Accedit etiam totius
 N 3 corporis

Cephalalgia.

corporis ariditas. Cephalalgia dolorem capitis significat, præsertim eum qui inueteratus non est. Contingit enim uel ex casu uel malo corporis temperamento. Interdum ex humorum redundantia, nonnunquam ex utriusq; culpa: aliquando etiam ex causis primitiuis et extrinsecus incidentibus sicuti in nimio aestu, frigore, temulentia, iniuriaue quacumq; alia capiti illata.

Cephalea.

Cephalea cerebri morbus est diuturnus inueteratusq; ac difficulter solubilis, qui à parua occasione uehementes etiam dolores concitat, adeo ut qui sic ægrotant non possint strepitum, uocem, luminis splendorem, motum, odores, neq; aliud quicquam quod cerebri repleat, sine dolore maximo tolerare, sed trāquilla omnia, et obscura loca, idq; ob doloris uehementiam querunt. Grauius enim quam Cephalalgia affligit. Porro qui Cephalea laborant, aliqui uelut malleo se percuti arbitrantur: alij caput sibi confringendi distendiq; putant, atq; non paucis ad oculorum usq; radices affectus percipitur: quin et accessiones ueluti in morbo comitiali intermittentes habent: unde perfectè liberati uidentur. Constat enim eos qui uictioso uictu utuntur, facile Cephalea corripì, quemadmodum Galenus, lib. 3. loc. affect. indicauit. Encasis capitis est dolor ex calore, uisionem seu ardorem uocant. fitq; ut plurimum solis aestiui uehementia.

Encasis.

Memit

Hemicranea etiam diuturnus affectus est, in altera
 duntaxat capitis parte, interdū dextra, interdum fini
 stra. Alij extra caluariam, alij in intinis capitis parti- Hemicranea.
 bus dolores sentiūt. Porro hemicranea ageneratur ex
 uaporosis halitibus sursum elatis, atq; biliosis excre-
 mentis in ore uentriculi accumulatis. Scotoma, la Scotoma.
 tini uertiginem appellant, magna ex parte ex frigidis
 glutinosissq; humoribus accidit, cerebrum infestanti-
 bus. Cause primitiue sunt res nō naturales, uapores
 crassos in cerebrum deferentes: ut coepe, allium, uinū
 potens et uaporosum: Cause uerò antecedentes sunt
 omnes humores: Coniuncte autem cause, sunt ua-
 pores mixti spiritibus. Et qui hoc affectu corripia-
 untur leui causa interdum concidunt, ueluti dum ex-
 trinsecus circumagi aliquid uiderint, uel ipsi in gyriū
 uertuntur. Præcedit primogeniam affectionem capi-
 tis dolor uiolentus, sonitus, & sibila aurium. Lædun-
 tur etiam nonnulli odoratu, Nec desunt quos offendat
 gustus. Interdum & per consensum fit uentriculi.

Phrenitis, est mentis uacillatio atq; cerebri uel Phrenitis
 membranarum eius inflammatio, nunc ipso pariter in-
 flammato, nunc præter naturam caloris abscessu æstu-
 ante, trahit originem: aut ex sanguinis redundantis
 copia, aut immodico flauæ bilis humore: aut flaua
 bile præter modum torrefacta, eamque in nigrio-
 rem tendente, unde grauißima phrenitis oritur:

nonnunq̃ cerebrum syncipiti compatiens ex difemi-
 natis hincinde in ipsum nervis affectionem contrā-
 hit. Si interea per summos ardentissimarum febrium
 uigores uel stomachi consortio, mentis alienatio acci-
 derit, phrenitis non uera dicitur, quæ alias delirium,
 quod Græci παραφρεσίνον nominant. Est autem
 delirium ut Gal. definiuit, deprauatus principis facul-
 tatis motus, à malis succis uel cerebri intemperie ortū
 habēs. Comitatur porro magna ex parte phreneticos
 per uigiliū: nonnunquam inquietus & turbulentus
 somnus: ita ut subinde exurgant, exiliant, seu horren-
 do furore correpti uociferantur. Alij quidem ob san-
 guineū humorem præpollentem hilares cum risu, alij
 uero propter flauam bilem impetuose insaniunt. Et
 qui ex atra bile uitium contraxerunt, sic efferuntur
 ut coerceri nequeant. Si interea per consensum dia-
 phragmatis error oriatur, inordinata erit respiratio.
 Conuelluntur namq; sursum præcordia et calore mul-
 to æstuantur: ueluti cum phrenitis, cerebri uitio conci-
 tatur: ardor, ruborq; subcruentus in facie cum uenas-
 rum extuberantia elucet. In uniuersum bilioso præ-
 pollente humore phrenitis cum uigilia fit: pituitoso
 uero superante, si quando contigerit, grauati somno
 Lethargus, sopiuntur. Lethargus, quem ueternum Latini uer-
 tunt, materiam phrenitidi contrariam habet: nempe
 pituitam, quæ cum cerebrum irrigat, in somnum co-
 git. co

git. Comitatur autem ueternosos, lenta quædam & ignaua febricula, pulsus adest magnus rarus & turbulentus: respiratio quoque ualde rara & debilis, segnes & languidos reddit hic affectus egrotantes. qui cum uocantur ægre respondent, obliuiosi desipiunt atque oscitant: cerebro etiam & ore aliquandiu distento manent. Porro Lethargus et Carus inter se differunt, in illo quædam lenta & ignaua febris, ut iam dictum est, sequitur, in hoc uero febris præcedit uehementior, sicuti in lib. 2. Aph. com. 45. etiam diximus.

Lethargus & Carus inter se differunt.

Caros affectus est quem sensuum motionumque uniuersarum priuatio citra respirandi offensam, consequitur, Arabibus subet. Catalepsis, quæ catoche etiam dicitur, subita est detensio & occupatio, tum mentis tum corporis, sensu ac motu priuati: ægro in ea corporis forma ac figura permanente, in qua fuit correptus. Et qui hoc detinentur affectu, uidentur interdum dormire, interdum apertis palpebris persistere, uel nutare, uel intentis oculis ueluti congelatis & immobilibus spectare ac intueri. Ephialtes, quem latini incubonem uocant, affectio est ubi aliquis noctu sese aggredi ab aliquo, aut prægrandi mole sese opprimi existimat. Id crapulosis potissimum & quibus stomachus humoribus crudis est refertus euenit. Affectus hic si perseueret, graue aliquod malum promittit: ueluti attonitum morbum, furiosam insaniam & morbum

Caros.

Catalepsis.

Ephialtes.

Epilepsia.

bum comitalem quàm primum uidelicet in caput uitij materia irrepserit. Caterum quæ Epileptici interdum, eadem noctu Ephialtici patiuntur. Epilepsia seu morbus comitalis corporis totius est conuulsio: quæ ex temporum interuallis accidit, cum mentis ac sensuum oblesione, nunc quidem pituitosum, nunc melancholicum humorem in cerebri substantia, partim in ipsius uentriculis causam habens. Accidit namque ut qui hoc morbo conciderit, neque uideat, neque audiat, neque ullo sensu quicquid percipiat, ac ne consequi quidem possit quidnam factum sit, siquidem cum memorie uiribus ratio quoque leditur. ueluti Galenus lib.

Apoplexia.

3. loc. affect. docuit. Apoplexia morbus est quem nos attonitum uocamus. fit enim quando communis neruorum origo afficitur, atque uniuersæ inde corporis partes sensu simul et motu priuantur: idque principibus anime functionibus oblesit. quod si in alterutram hominis partem sese obstructio insinuanit ὑμειπληξία, id est diminutam apoplexiam et ἀπλυσία, hoc est resolutionem nuncupant. Quocirca seruatur in apoplecticis exigua quædam respiratio: quæ si plurimum à naturali operatione recesserit, summam perniciem adducet: si paululum exiguam. Sanè omnium pessima respiratio est, quæ et intermittitur et magna cum uiolentia requiritur. Fit autem apoplexia ex gelida pituita cerebri, neruos insarienti.

Pessima respiratio quæ.

At pa-

At paraplexia resolutio est quæ sequitur apoplexiam, sicuti Galenus lib. 4. uict. acut. ostendit. Attenuati seu apoplectici igitur procumbunt sine uoce sine motu, citra sensum & absq; febre. **Paralysis** nervorum est resolutio à: orpore, sola magnitudine differens, quæ si omnes occupauerit nervos repente uniuersum corpus sensu & motu priuabitur. succedetq; promptissima mors: eò quod prohibita sit transpiratio, sicuti Galenus lib. 1. de symp. caus. indicauit. **Torpor** affectus est à refrigeratione, & compressione corporum nervosorum: aliàs uitæ ignauia, ciborum multitudine, crassitie aut solitæ excretionis suppressione cõpositus. **Melancholia** morbus, desipiētia seu alienatio quædam mentis est sine febre. Huius notæ communes sunt, metus, mœstitia profunda, odium & huiusmodi: Peculiares uerò gracilitas corporis, nigredo, hirsutum pectus, & austera quædam affabilitas. Plura in nostris commentarijs Aphorismorum, quæ ad hanc affectionem spectare uidentur.

Mania, fit ubi flaua bilis supra modum exusta, in nigram mutatur. Latinis insania dicta, quæ correpti effrenes redduntur. Differt à phrenitide quod in hac sit febris: Mania uerò citra febrem accidit. unde autem generetur etiam in com. Aphorismorum: aph. 46. lib. 2. ostendimus.

Lycan

Lycanthropia affectus est, quo qui afficiuntur sese in lūpum conuersum iudicant, unde per noctem domo egressi, lupos per omnia imitantur: interdū, uerò omnia metuentes latitant. Exoticus furor, est quando quis præ amore insanit. Spasmus neruorum affectio est quam conuulsionem uocant, fit enim quoties nerui & musculi præter uoluntatem conuelluntur, idq; multis modis: aliquando enim à plenitudine, utpote cum circa morbi exordium, uel nō multo post conuulsiones orsæ diutius manent: interdum à uacuatione, cuius rei fidem faciunt copiosi corporis sudores, aut uomitiones, excrementorum alui deiectiones, sanguinis profluvia, uigiliæ immodicæ, fames permulta, demiq; uehementes commotiones: atq; ubi aliquis subito conuellitur: à plenitudine id fieri est indicium, Verum si à febribus adurentibus totius corporis moles & nerui pariter aruerint, ex illaq; ariditate conuulsio fiat, exitiosissimum est. De triplici spasmō seu conuulsione in com. Aph. lib. 2. & alijs quibusdam locis indicauimus. Tremor hoc est tremor, affectus est duplici motu constans, ad superiora uidelicet & inferiora. Omnis porrò tremor generatim ex infirmitate neruorum ducit originem, ueluti in senibus apparet. Priuatim uerò plures & diuersæ causæ tremorem efficiunt, ueluti frigidius naturæ temperamentum, inportunus aquæ frigide potus, præsertim in febribus:

Præte-

Præterea & glutinosi humoris redundantia, nec non immodicus uini usus. Interea capitis solum affectus nō est: licet ab ipso uel spinali medulla nerui omnes originem ducant: sed aliarum quoq; partium neruosarum.

Catarrhus quem latini destillationem appellant, humoris est à capite in subiectas partes descensus, qui si in nares defluat, $\kappa\omicron\gamma$ & græcis nuncupabitur. latinis uerò mucus & grauedo. Si uerò per palatum in fauces deferatur, Catarrhus simpliciter uocabitur: Si autem idem excrementum in guttur & asperam arteriam delabatur, ita ut interiorem eius membranam salebrosam reddiderit (eum quidem uox rauca comitatur) $\beta\omicron\gamma\chi$ & appellatione græca nuncupabitur.

OCULORVM PATHEMATA.

ATROPHIA ex inopia nutrimenti est affectus, qui dum oculos contingit, eos exiliores ac depressiores reddit. Ectropismus, $\epsilon\kappa\tau\rho\iota\sigma\mu\omicron\varsigma$ etiam græcis dicitur, oculorū est expressio seu exitura, quacunq; causa fiat. Strabismus seu $\sigma\tau\alpha\beta\iota\sigma\mu\omicron\varsigma$ conuulsua musculorum, qui bulbum oculi mouent, est affectio, atq; obliquus aspectus seu oculorum distortio dicitur, ex qua sursum aut deorsum, uel in obliquum oculi detorquentur, unde qui sic afficiuntur strabones dicti sunt. Myopia quæ $\mu\upsilon\omicron\pi\acute{\iota}\alpha\sigma\iota\varsigma$ etiam dicitur lusciosa est affectio siue uitium oculorū,
quo

quo ab ineunte ætate pusilla propius admota cernuntur, remota uerò quantumuis magna fuerint, non item. & qui hoc correpti sunt affectu, lusciosi appellantur. Nyctopia, non morbi genus est, sed dum quis oculorum uicio laborat ut interdiu clarius cernat aduentante nocte, oculis sit hebetioribus: noctu uerò nihil uideat, quod uitium in foeminam benè respondentibus menstruus, ut Celsus testatur, non incidit, latinis nocturna cæcitas, & musitatio dicitur. Hebetudo oculorum græci ἀμβλυόπεια uisus obscuritatem uocant. Est autem obtusio uidendi, ex occulta quadam occasione proueniens. Caligatio, quæ Græcis μωρόωσις dicitur cernendi est impedimentum absq; manifesto uitio. Epiphora, quæ uulgo lachryma uocatur, est humorum in oculos influxus fitq; ut plurimum cum tumore & inflammatione. Raxis ruptura est ab ictu uel humore erodente. Taraxis quæ ophtalmia leuis seu non uera appellatur, humiditas est oculi cum rubore & calore præter naturam non ex internis causis, sed extrinsecis aliqua occasione aduenientib. sicuti fumo, sole, puluere, oleo. Sed de hoc & reliquis morbis in nostra synopsi plenius dicetur. Ophthalmia quæ latinis lippitudo dicitur membranae adnatæ est inflammatio.

Taraxis.

Ophthalmia.

Chemosis.

Chemosis, affectus est quo ex uehementiore oculi inflammatione, utraq; palpebra ita distorquetur per
artis

uertiturq; , ut egerrime subiacentes oculi partes te-
gantur , & album oculi nigro sublimius fit , ac rubes-
cit magnamq; nigri partem occupat . Pterygion, Pterygion
unguis. Corn. celfo dicitur. Estq; neruosa quedam ad-
nata membranula excrementia : quæ ab angulo ma-
iori, ut plurimum oritur & ad coronam usq; seu Irim
oculi procedit : adeoq; nonnunquam augefcit ut pu-
pillam superet & operiat . Phlyctenæ pustulæ
sunt exiguæ, super tunicam corneam eminentes .

Bothrion cauum, augustum, purumque in cornea Bothrion.
tunicula ulcus existit: latini fossulam appellant .

Cœloma, ulcus est , ut bothrion , sed minus pro-
fundum . Argemon ulcus est quod in Iridis circu-
lo nascitur , & ambientia comprehendit, ita ut ex-
tra Iridem subrusum : intra uerò album appareat .

Epicauma, sordidum est ulcus, impurum & cru-
stosum . quod dum expurgatur, sæpius humida quæ
sunt in oculo esluunt . Achlys, ulcus est superfi-
ciarium & caliginosum, quod in nigro oculi multum
apparet . Nephelion, eiusdem generis ulcus est, sed
caligine profundius & angustius, colore nigricans. la-
tinis nubecula. Pyosis & hypopyos, fit quando in Pyosis & hypo-
cornea oculi membrana nunc altius, nunc in summa su-
perficie suputatio nascitur, humanarum unguum specie
referens, unde Grecis ὀφθαλμὸς etiam dicitur.

Carcæ

Carcinoma seu cancer in cornea oculi membrana abscessus est, immensum dolorem excitans, ruborem & cruciatum punctorium usq; ad tempora infert. Proptosis uueæ membranæ procidentia est, ab erosioneruptioneq; corneæ contingens, quæ si exigua adhuc fuerit, modis omnibus (ut inquit Aegineta) muscæ caput representat unde *μῦν κεφαλῶν* nuncupatur. & dum aucta instar acini uueæ fuerit *σάφύλωμα* Græcis, Latinis, uuatio dicitur. Vbi uerò adeo egredietur ut extra palpebras emineat, *μῆλω* nominatur. Cum deniq; obcaluerit *ἄλως*, sicuti latinis

Mydriasis. clauus nuncupabitur. Mydriasis affectus est oculorum, quo non immutato calore pupilla naturali habitu fit laxior, & nonnunquam facultatem uisoria ex toto impedit: interdum ex parte tantum. Latini pupillæ dilationem & effusionem appellant. Phthisis contrarius plane affectus est, quo pupilla angustior, obtusior, hebetior, rugosiorq; redditur: & quæ cernuntur maiora esse apparent quàm sint. oritur ab ariditate. Latinis diminutio & tabes pupillæ dicitur.

Hypochysis Hypochysis & hypochima, est ubi lentus humor & glaciei modo, inter corneam & cristalloidem concretus circa pupillam subit latini suffusionem & ca-

Glaucoma. taraçt. a. appellant. Glaucoma cristallini humoris est uitium, quando scilicet ex humiditate in glau-

Aegilops. cum colorem mutatur. Aegilops tumens abscessus est

est inter maiorem hircum oculi & nares medius: qui ruptus si negligatur, in fistulam abit ad os usq; procedentē. Idem abscessus priusq; disruptus sit, Auicennæ garab. id est, fistula lachrymalis dicitur: atq; difficile hoc vitium eliditur, tū ob partium tenuitatē, tum ob

Fistula lachrymalis.

periculū quod ex consensu, oculo imminet. Encanthis oculorum labes est, quando maioris canthi naturalis caruncula exhorrescit, & ad nares protuberat.

Ryas eiusdem carunculae imminutio est. Epinyctis, ulcus est sponte sua nascens, quod aciem oculorū obtundit. & ad oculi angulum humor perpetuo manat. Emphysima palpebrae tumor est seu excreffentia & inflammatio, laxo tumori similis. Psorophthalmia pruriginosa palpebrarum scabies est, ex salso nitrosoq; humore originem ducens. Sclerophthalmia durities est quaedam & difficilis admodum palpebrarum commotio, cum dolore ac rubedine absq; humoris affluxu. Xerophthalmia, pruriginosus est palpebrarum affectus. Latinis arida lippitudo & oculi siccitas dicitur. Ectropion palpebrae est inuersio: propter cicatricem aut carnis excreffentiam facta. Trachoma, interna est palpebrarum scabies & asperitas: cuius duæ sunt species, quæ enim extensa ac rigida ueluti in fissuras exasperatur, σύκωσις dicitur: quod scilicet granorum ficus similitudinem habeat. sed cum inueterata fuerit & callosa tunc τύφα

ο λωσις

Ptillosis.

λωσις nuncupabitur. Ptillosis crassities palpebrarum callosa, rubicunda. quam magna ex parte capillorum defluuium consequitur. Agglutinatio palpebrarum quam Græci ἀγκυλοβλέφαρον ἢ ἀνκύλωσις uocant, affectus est ubi cum albo uel nigro, uel sibi ita inuicem palpebræ coalescunt ἢ conglutinantur, ut aperiri oculi non possint. Lagophthalmi dicuntur qui superiorem palpebram sursum retractam habent, ἢ oculis apertis ueluti lepores dormiunt. contrarius affectus est, Ectropion.

Lagophthalmi.

Hordeolum.

Grauedo quam Græci χαλᾶσις appellat, palpebrarum candidum (est ex humore otioso) tuberculum. Hordeolum, ab hordei grani longiusculi similitudine dictum est: ἢ est affectus qui in palpebra supra genas extrinsecus nascitur Græcis κριθῶν διαίτης. Hydatis, crassus essentia fluxus est, sub cute palpebrarum naturaliter conflatus, oculos aggrauans, præsertim tempore matutino. Et qui sic laborant, ad solis splendorem oculos sine lachrymis conuvertere non possunt. Phthiriasis est pediculorum in palpebris collectio. Glabricies palpebrarum, quam Græci μαδίαγωσις ἢ μίλωσις appellant, pilorum qui palpebris insunt defluuium est, ex humorum corruptela: Trichiasis, molesta est in palpebris pilorum oculos pungentium eruptio.

Trichiasis.

Dystrichiasis, est cum sub naturali ordine pilorum

qui

qui in palpebris nascuntur, alius ordo succrescit.

Phalangosis, pilorum est subnascentium duplex aut triplex acies, tum in superiore tum inferiore palpebra proueniens. Lithiasis est cum in palpebris gignuntur albicantia quædam et aspera calculi instar, unde in oculos grauitas compungens sentitur.

Ippos affectio est quæ statim enata, perpetuò instabiles palpebras efficit. Aporrixis, meatus à cerebro est in oculum descendens, ex capitis quadam oblesione corruptus. Paremptosis, affectio est quando scilicet aliquis humor defluens meatum uisorium, quo uidendi facultas ad oculos fertur, obturat. Symptosis uisoriij meatus est compressio, ex tabe uel imbecillitate. Hyposphagma et hypopion, ex ictu uel contusione sanguinis est, intra tunicas oculorum collectio. Cicatrices oculorum (quæ duplices sunt,) Græcis ὀφθαλμικαὶ nuncupatur, si in summa oculi superficie fuerint, νεφέλαια. Latinis uerò albugines tenues, Et ubi altius radices egerint, λευκώματα, id est crassæ albugines dicentur. Cicatrices oculorum.

MORBI QUI AVRIBVS adueniunt.

O Talgia, seu ὠταλγία, aurium est dolor seu passio ex quauis occasione. Dysicia, audiendi est difficultas quouis modo acciderit. Cophosis surditas est siue à principio, siue postea contracta sit.

O 2 Parotis,

Parotis, glandularum quæ auribus adiacent, est inflammatio. Phirea, oblongæ eminentiæ sunt glandularum auribus adiacentium. Cypsele & κυψελεῖς aurium sunt sordes, quæ obtusiores auditum reddunt. Thlasis, contusio & compressio eorum est, quæ sunt in auribus foraminum. Sunt & alia accidentia ut tinitus ex uaporibus scilicet seu flatibus genitus, seu pituita tum salsa tum alia.

NARIVM MORBI.

Ozena.

Polypus.

Hæmorrhogia.

Coryza.

Ozena ulcus narium carnosum ac putridum est, ex acrim humorum fluxione, unde foeditus odor expiratur. Polypus, tuberculum præternaturam est, in naribus obortum. Sarcoma caruncula est in naribus præternaturam excrecencia. Myza humor est ex naribus defluens Latinis mucus & excrementum narium dicitur. Hæmorrhogia, sæpe semper cum simpliciter profertur, sanguinis è naribus profluvium significat. alias profusionem sanguinis undecumque fluat. Coryza humoris est à cerebro in nares descensus.

FACIEI ACCIDENTIA.

Epeles.

Epeles, ἐφελῖς græcè nigrities est in facie et asperitas, ardore solis progenita. Phacos subnigra faciei est macula, lenticula similitudinem habens,

bens unde etiam lentigo et lenticula à latinis dicitur.

Vari qui græcis ἰοῦδοι appellantur, consparsi ac Vari.
foedi sunt tumores in facie, sed exigui ac duri.

DENTIVM AFFECTIONES.

Odontalgia, dentiū est dolor undecunq; fiat. Odontalgia.
Odaxismos pruritus est intra gingiuas, cū
incipiūt dentes erūpere. pueris omnibus cō
munis affectus. Odontophnia puerorū est dentitio, Odontophnia
ubi scilicet dentes è gingiuis prorumpūt. Hæmodia Hæmodia.
stupor est dentium. ex aciditate alicuius cibi: & præ=
sertim immaturorum fructuū. Gingiuarum inflam= Gingiuarum
matio quæ non soluta putrescit, à Græcis πᾶσις inflammatio
est nuncupata. Carnosa eminentia iuxta dentium
aliquem in gingiuis facta, ἐπὶ δὲ δὲ dicitur.

ORIS PASSIONES

Ranula quæ Græcis Βάτραχος nuncupatur, Βάτραχος.
tumor est cū inflammatione sub lingua: in pue
ris potissimū erūpens. Paristhmia latini ton
sillas uocant, & faucium partē & eius inflammatio=
nem significant. alio etiam nomine Antiades dicūtur. Antiades.

Vuea, ab uueæ similitudine, Græcis σαφύλη, ca
runcula est quæ ad extremum oris dependens cerni=
tur. Spasmus cynicus, distensio oris Cornel. Celso Spasmus cyni
interpretatur. Fit autem cū muscoli, qui oris ipsius cus.
partes mouent, resoluuntur. Aegineta caninam con=

Ancynoglosson.

Balbi.

Trauli.

uulsionem appellat. Ancyloglosson, affectio est in membranis linguæ, à prima interdum origine interdum postea, à causa quapiam externa. Balbi dicuntur qui pronunciandi literam uel sillabam præmittunt, atq; tardi incipiunt explicare quæ proponunt. Græcis *Τραυλῖ* dicuntur. Trauli appellantur, qui literam quandam exprimere non possunt.

Angina.

Aphthæ Vlcera sunt in oris superficie, nō admodum profunda: quæ nuper natis potissimum oboriuntur: alias sub candido colore, alias in ruborē languescente, nonnunquam eo colore qualis in adustorum crustis uidetur, quod omnium periculosissimum & maximè exitiale est. Angina quæ *συναγχη* Græcis dicitur, Inflammatio est gutturi uel faucibus adhærens, à suffocando dicta. Eius differentias in com. Aphorif. 16. lib. 3. adduximus.

THORACIS MORBI.

CAP. XX.

Asthma.

Dyspnoea.

ASTHMA, affectio est, qua laborantes tanquam à citatiore cursu agitati, conflictantur. Eius triplex est differentia. Prima quando sine febre crebra respiratione affliguntur, atque Asthmatici, hoc est, anhelosi nuncupantur: Altera eorum est qui suffocari timentes, ad respirationem recto pectore toto nituntur, uocantur à Græcis. *ὀρθόσπνοι* ab *ὀρθόσπνο* passione. *Dyspnoea* spiratio

Spiratio est & animi difficultas, quæ maxime propter
 crassos & uiscidos humores, bronchia pulmonū ob-
 struentes, accidit. quemadmodum Galenus lib. 7. ca-
 totop. indicauit. Pleuritis, membranæ costus suc-
 cinguntis est inflammatio. atq; uera cum fuerit sem-
 per comitem habet febrem: quæ symptoma eum sit,
 curatione non æget, sed causæ tantum ablatione. si-
 cuti nec in lethargo, Caro, ulceribus. Peripneu-
 monia pulmonis dicitur inflammatio, cū per se cum
 per accidens. Aemaptysis sanguinis est per sputum
 excretio. Græci αἱματωσύνη & αἱμαπτοῖη
 dicunt. Empyema, quod uomicam & purulentam
 excretionē appellant, in cauo specu thoracis siue in-
 tra succingentem costas membranam colligitur. Hoc
 uitio qui laborant ἐμπυϊκοί Latinis uerò puru-
 lenti & suppurati dicuntur. Phthisis præter om-
 nem corporis maciem & extenuationem, pulmonis
 etiam ulcera (quæ Græcis φθῶν nuncupantur) si-
 gnificat. Palmos affectio est quā latini cordis pal-
 pitationem seu tremorem appellant. Sparganosis
 distensio mamillarū ob lactis redundantiam dicitur.
 Atque lactis ipsius in grumos conuersio concretioq;
 θρόμβωσις nuncupatur.

Pleuritis

Peripneumonia

Empyema

Phthisis

Palmos

VENTRICULI AFFE-
 CTIONES.

**Cardialgia,
Syncope.**

**Appetentia
canina.**

Citta.

Dyspepsia.

Apepsia.

Bradipepsia.

Cardialgia Græcis *καρδιακὴ* dicitur, nō quidē cordis, sed oris uētriculi est affectus. Syncope, est animi deliquium seu uirū lapsus, oris uentriculi uitio cōtingens. Anorexia, ciborū est auersio, quādo scilicet stomachus intemperatura laborat: uel ab exuperante copia aggrauatur. Latinis abolita appetentia. Appetentia canina quæ Græcis, *κυνὸς ὄρεξις* dicitur, affectio est abolitæ appetentia contraria. Fames ingens quæ Græcis *Βούλιμος* nuncupatur, membrorū fit inanitione cū stomachi fastidio. Et est insatiabilis qua affecti cibum non sentiunt, sed tabe corpus potius consumitur. Citta, affectus est, quo mulieres uitiosis humoribus refertæ, infestari solent: præsertim cum uentrem ferunt. Latini malaciam atque picam appellant, sumpto ab aue sæpius sic affecta nomine. In hac affectione mulieres absurda etiam desiderant, sicuti terram cimoliam, carbones extinctos, lateres, carnes crudas, et pleraque alia. Dyspepsia concoctio deprauata est: quando scilicet in alienam qualitatem cibi permutantur. Apepsia, affectio est in qua non fit ciborum alteratio, sed secundum omnes qualitates, tales permanent cibi, quales absumpti fuerunt. Latini cruditatem nominant. Bradipepsia, tarda est concoctio, ut pote quando cibi in familiarem (sed longiori tempore) qualitatem, conuertuntur. Nausea, quæ *ναυτία* Græcis dicitur

cis dicitur ad uomendum est conatus. Singultus λυ= Singultus.
 γμός Græcis uentriculi est motus, ac ueluti conuul=
 sio, ab expultrice facultate, noxia expellere uolenti
 factus. Cholera, immodica est uentris perturbatio, Cholera.
 supra infraq; erumpens. Hinc cholericī dicuntur,
 quibus multa bilis per interna supernaq; deiici=
 tur. Celiaca passio, est in qua ob imbecillitatem
 uentriculi alimenta neque coquuntur neq; perferun=
 tur, idq; ob uentriculi & intestinorum imbecillita=
 tem. quemadmodum in com. Aphorif. ostendimus. Aphorif. lib. vj.

INTESTINORVM MORBI.

CAP. XXI.

DIARRHÆA, alui est profluuium, ex ci=
 borum uitio uel concoctionis defectu. Exci=
 tatur enim quando uenterculus circa imas
 partes multitudine & acrimonia humoris afficitur.
 dummodo firmæ sint quæ circa stomachum partes
 habentur. Lienteria digestionis est ablatio: ut dum Lienteria
 a re quapiam uentriculo. Dysenteria intestino=
 rum est ulcus seu exulceratio. Tenesmus, est cre=
 bra & implacabilis ad deiiciendum promptitudo,
 qua nihil præter exigua, cruenta, uel mucosa pro=
 pellitur, idq; propter ulcera in recto intestino orta.

Ileos, dolor est acerbissimus sublimiores intestino= Ileos

Lumbrico-
rum tria ge-
nera.

rū partes infestans. Sic enim Galenus lib. 6. loc. affect. scriptum reliquit. Fit autē ab inflammatione uel obstructione seu retensione excrementorum exiccatorum. Vocatur etiam uoluulus & chordapso, quæ affectio tenuibus intestinis grauissimas & lethales dolores infert. Lumbricorum tria sunt genera. Primi generis sunt rotundi seu teretes, et ij in gracilibus plerunq; intestinis consistunt, atq; superiorem uentrem subeunt, unde per os & nares præsertim à pueris nonnunquam reijciuntur. Alterius generis lati sunt et longi Græcis, κέσθια & ταυρία dicti. Tertiij ascarides nuncupantur, et ij breues sunt ac tenues, qui in extremo longaone potissimum reperiuntur.

Hæmorrhoi-
des.

Ragades

Hæmorrhoides uasorum ad sedem sunt sanguine excretiones, aut potius uenæ quæ in extremo recti intestini ambitu sunt constitutæ, sicuti in Aphor. 12. lib. 6. diximus. Ragades sunt rimæ in recti intestini musculo, qui Græcis σφιγξ dicitur. Sycofis ulcus est à fici similitudine dictus: Eius duo genera Celsus tradit. Primum durum est & rotundum. Alterum humidum & inæquale. Fit quidem utrumque in partibus quæ pilis teguntur. Latini mariscam & ficum appellant.

IECORIS ET LIENIS AF-
fectiones. CAP. XXII.

Hepatici

HEPATICI dicuntur quos ob iocinoris imbecillitatem morbus infestat. Sic enim Galenus lib. 3. de sympt. caus. scriptum uoluit.

Cachexia malus corporis est habitus, in quo aliquid mentum corrumpitur. Est autem quodammodo ad aquam intercutem dispositio, quod et Paul. Aegineta lib. tertio etiam annotauit. Icterus seu Ictericus morbus est quem Celsus, arquatam et regium appellat. Estque bilis modo flauæ modo nigrae per uniuersum corpus effusio. unde et bilis suffusionem, latini appellarunt. Color hunc morbum detegit maxime qui oculis suffunditur, in quibus quod album esse debet, fit luteum et ubi diutius morbus adest, corpus totum cum pallore ueluti inficitur. Hydrops, Hydrops aquosus est et præter naturam tumor. Eius triplicem differentiam in nostris Aphorismorum comment. atque lib. de morbis curand. ostendimus.

RENVM ET VESICAE Passiones. CAP. XXIII.

NEPHRITIS, renum est uniuersalis affectio. unde et nephritici dicuntur, quorum renes dolor afficit. Diabetes proprius renum est affectus, quem Græci etiam δ'ιψακτορ, id est, urinae profluvium appellant. Eius causa est res

Lithiasis.**Stranguria.****Dysuria.**

num imbecillitas, non potentium diutius urinam continere. In hac affectione egrotantes supra modum sitiunt, & exuperanter quod bibunt non mutata qualitate, per urinas deijciunt. Lithiasis, quæ renū est & uesticæ calculus, seu ipsius generatio. cuius materiam in commento Aphorif. 26. lib. 3. ostendimus. Stranguria, urinæ est stillicidium, atque immoderata urinæ profusio. quemadmodum Galenus lib. 6. locorum affect. indicauit. Fitq; uel ob imbecillitatem uesticæ uel ob urinæ acrimoniam. Dyssuria, affectus est stranguriæ contrarius. Est autem urinæ suppressio citra expultricis facultatis oblesionem.

GENITALIUM AFFECTIO- nes. CAP. XXIIII.

Satyriasis.**Satyriasmus.**

PHIMOSIS, uitium illud est quādo colis glans ita est contexta, ut nudari non possit. Huic affectioni contraria Paraphimosis. Satyriasis ut inquit Aegineta, genitalium est palpitatio, quæ aliquam seminalium uasorum inflammationem cum tensione imitatur, quæ quidem affectio, si in longum tempus protrahatur, genituræ conceptacula in languorem resolutionemq; aut conuulsionem præcipitat, extremumq; periculum infert. Satyriasmus & priapismus, pudendi sunt præter naturam erectiones, quæ non desistunt. sic enim Galenus lib. 2. Meth.

& in

Et in lib. de tumorib. præter naturam definiuit.

Gonorrhæa, est seminis assidua atq; inuoluntaria Gonorrhæa
excretio. quæ fit cole haud quaquam extenso: ex im-
becillitate retentricis potentie. Hernia seu ramex Hernia.

Græcis κήλη nuncupatur fit primum quando peri-
tonæo rupto intestina in scrotū delabuntur. Et tunc
Enterocèle dicitur, quod si omentum descenderit, Epi-
plocele: Si uero humor aliquis lentus in scroti parte
defluxus fuerit. Hydrocele nuncupabitur. At cum ca-
ro dura intra testium tunicas increfcit Sarcocèle is di-
cetur affectus.

VTERI PATHEMATATA.

CAP. XXV.

VTERI præfocatio, quam Græci πύρξις
ἐκ τῆς μήτρας uocant, est sui ipsius ad superiora con-
uersio seu recursus. Mola quæ μύλα Græ- Mola
cis est, congesta ac indurata caro in ipso utero existit.

Vteri præclusio, quam μύξις ὑστεραῖς uocant, fit
quando os uteri Et in conceptionibus Et dum phle-
gmone affectum est. conniuet. Phimosi, orificij aut
cervicis uteri est coarctatio, ab inflammatione. Ac-
cidunt etiam uteri condylomata, rhagades, scyrrhi,
thymi, procidentia, inflammationes Et carcinomas
ta. quorum nonnulla deinceps explicabimus.

ARTICV.

ARTICVLORVM AEGRI-
tudines. CAP. XXVI.

Arthritis.

ARTHRITIS articulorum est uicium, ex quo tū Ischias tum podagra nascitur. Quod enim in omnibus articulis est arthritis, hoc in imo iuxta coxendicem ischias: iuxta pedem uero podagra. Communem habent hi tres affectus redundantiam humoris. quemadmodum Galenus lib. 10. de comp. medicament. secund. loc. ostendit. Nodus callosa est & rotunda duraq; concrectio, iuxta nervosa loca maxime apparens.

DE TUMORIBVS PRAETER
naturam. CAP. XXVII.

Clauus

PARONIXIA, abscessus et aspredines, circa radices unguium dicuntur. Clauus, quē Graeci κλῶν appellant, tuberculum est rotundum & callosum, clauorum capitibus non ab simile, in calcaneis & pedum plantis ex oppressione quadam contingit. Hac affectione frequentius laborant qui longum iter facere coguntur. Pterygion in unguibus ex crescentia quadam carnosum est, partem aliquam unguis ipsius seu mauum seu pedum fuerit, operiens.

Pterygion.

Carcinoma

Carcinoma tumor est praeter naturam liuescens & inaequalis, qui quidem in qualibet corporis parte oriri potest. nunc citra ulcus, & hunc latentem Hippocrates

pocrates uocauit: modo cum ulcere ex atra bile origi-
 nem trahens. nascitur potissimum in superioribus
 corporis partibus circa faciem, nares, aures, labra,
 mammas foeminarum, quemadmodum Corn. Celsus
 indicauit. Lepra & psora, passionibus sunt summam **Lepra**
 cutem exasperantes, sed lepra profundius cutem ex-
 ulcerat, & piscium instar, squammulas ex se remit-
 tit. Psora uero summam corporis cutem uaria ero-
 sione figurat, fursureaq; magis quam squamosa ex
 se corpuscula edit. Lichenes, quas latini impetigi- **Lichenes**
 nes uocant, ex mixto quoque generantur humore:
 serosis nimium tenuibusq; & acris succis cum
 crassioribus mixtis. Quapropter facile etiam in
 psora & lepra transeunt. Est aliud etiam cutis ui-
 tium, quod Latinis Vitiligo nuncupatur. Eius **Vitiligo**
 duas esse differentias Leonhardus Fuchsius in sua me-
 thodo etiam indicauit. Vna quidem Græcis λεύκη
 dicitur, quæ coloris cuticulæ (sicuti etiam Paulus Aez-
 gineta prius indicauit,) est immutatio ex pituita pro-
 ueniens, quam uutiliginem albam appellamus.
 Altera, ἀλφός Græcis dicitur, quæ non ita pro- **Alphi**
 funde cutim deturpat. Porro alphi quidem albi sunt
 à pituitoso humore, ut iam diximus. Quidam uero
 nigri, à Melancholico. Eodem modo & uutiligo
 quam Auicennas Morpheam appellat, alba &
 nigra

- Exanthemata.** nigra generatur. Exanthemata, papularum sunt, sicuti Plinius inquit, eruptiones ex densatis in cute humoribus. de quibus libro de curand. morb. sumus locuti. Myrmecia & Acrochordon utrumque vitium exigua quædam est in cute excrescentia, callosa, & magna ex parte rotunda. Illa quidem latiori basi sessiliq; est extuberatio: hæc uero excrescentia exigua in summa cute indolens, callosa, in orbem magna ex parte circinata, basi angusta, quasi suspensa uideatur, quam latini uerrucam nominant.
- Ganglion.** Ganglion neruorum est concutio, ex percussu uel labore. In his præsertim corporis partibus proueniens, quæ uoluntariæ mouentur. Phlegmon tumor est dolens, durus & calidus: qui partes carnosas maxime occupat. Apostema, abscessum & dispositio nem Galenus esse dicit, in quo abscedunt atq; inuicem distant, quæ prius se contingebant corpora. Est interea duplex abscessuum genus. Vnum quando inflammatio in pus uersa, pus ipsum tanquam in sinu aliquo est collectum: Alterum cum nulla præcedente inflammatione humor aliquis aut spiritus uaporosus aut substantia ex utrisq; mixta, in parte aliqua statim ab initio colligitur. Aposcemma, est humorum qui prius unum aliquod membrum infestant eo relicto ad alterum, transmutatio. Steatoma tumor est præter naturam tactu lenis & colore non uariis, in quo

quo ueluti pingue quiddam subest. Atheroma, ite- Atheroma
 dem abscessus est specie et figura oblongus, in quo
 nonnihil pulti simile Galenus lib. de tumoribus præ-
 ter nat. et 14. Meth. contineri dicit. Meliceris tu- Meliceris
 mor etiam est rotundus et doloris expers, humorem
 melli similem habens. Gangrena, affectus est qui Gangrenæ
 ob inflammationis magnitudinem pars affecta emor-
 ritur, sed ubi exactè sensu locus carere cœperit, non
 amplius morbus ille Gangrenam, uerum syderatio-
 nem et Græci σφάκελον nominant. Atq; amputa-
 tionem ocyssimè requirit. Herpes affectio est ex Herpes.
 flaua bile, nullo alio humore confusa, in aliqua cor-
 poris parte consistens. quæ si essentia sua crassior et
 acrior fuerit, cutem ad subiectam usq; carnem exul-
 cerat, appellaturq; ἐγπης ἐδιδόμνος, id est herpes
 exedens. Quod si tenuis et minus acris calidaq; bilis
 illa fuerit, exiguas pustulas in summa cutis superfi-
 cie, millij seminibus persimiles, excitabit. Et ex hac
 similitudine Græcis κρυγείας, id est miliaris her-
 pes, nuncupata est. Erysipelas affectio est ex bilio- Erysipelas
 sa fluxione exuperante, sicuti ex sanguine et flaua
 bile calidioribus quàm oporteat. Porro erysipelas
 interdum cum exulceratione, interdum sine hac ac-
 cidere, tum in commentarijs nostris super Hippocra-
 tis aphorismos, tum in libro quem de curandis mor-
 bis præmisimus ostensum fuit. Bubo, inflammatio Bubo.

est, quæ in glandulis coli, inguinum, aliarumq; corporis partium adenosarum extuberrat, uenenatâ interdum ac pestiferam qualitatem præ se ferens.

Phygethlon.

Phima, glandularum quoq; est inflammatio, quæ breui tempore augetur, celeriterq; ad suppurationem properat. Phygethlon, caliditate simulac generationis celeritate. ab alijs tuberculis distinguitur. atq; tumor est non auctus quidem, ut Celsus testatur, sed latus. qui affectus glandulosarum partium est inflammatio. atq; ubi partes ob inflammationem ad scirrhum deuenerint, is affectus struma & chæras uocabitur. Cæterum Phigethlon Erysipelas, particeps inflammationis aut inflammatio Erysipelatis particeps nominatur, quemadmodum Gale. lib. 2. ad Glauconem manifestum fecit. Dothien, quem & furunculū appellant, tumor est abscessionis formam præ se ferens, ex crassis humoribus in carnosissimis plerumq; locis proueniens. In sola cute tolerabilis, malignus uerò & curatu difficilis, cum altius radicibus actis, prorumpit.

Dothien.

Oedema.

Terminthus, phymatis species ex Oribasio creditur, Est autem papula nigricans tibijs obueniens. Sic dicta quod Terebinthi fructus figura & magnitudine representet. Oedema tumor est absq; dolore laxus, ex pituitosi humoris confluxu. Emphysema, abscessus est seu tumor uaporosus sub cute, membranis: nonnunquam in uentre, aliquando in intestinis, interdum etiam in horum & peritonei medio colligitur. Auicenna,

enasci solent. colore uel subliuido, uel subnigro uel albo esse cōsuevit. Atq; ex ea dolor & inflāmatio (tametsi fabæ magnitudinem non excedat) uehementius torquent quàm pro ulceris magnitudine debuerint & dum aperitur apparet intus mucosa quedam exulceratio, uel ut Aegineta testatur, cruenta sanies. Epimyctides inquit, ulcuscula sunt sponte sua nascentia, facie pustularum, colore rubro: quibus discussis cruenta sanies defluit. Phlyctenæ parue sunt pustule ex serosis excrementis genitæ, nec dissimiles illis, quas aqua feruens aliqua in corporis parte solet excitare. Chimetla, ulcerosæ sunt affectiones ex frigore hyemali, quæ in puerorum manibus pedibusq; ut plurimum, eueniunt. hinc tumores illi quos perniones uocamus, in postrema calcaneorum parte oriri atq; extuberare solent. Apofyrma, auulsio seu detractatio dicitur, quando scilicet uiolento rei cuiusdam occurſu, aliquid è corpore eximitur.

Nome.

Nome, ulcus est quod ab ægris particulis, ad eas quæ integræ & sanæ sunt, suapte malitia serpat.

Chironia.

Phagedena, ulcus malignum est, ex humorum crassitiæ, quod unà cum cute partes adiacētes ac subiectas exedit. Chiroma, ulcera sunt inueterata, quæ ad cicatricem difficillime perueniunt. Telephia, ulcera magna & callosa sunt, quæ in pedibus ac cruribus emergunt. Cacoëthe, ulcus est in uniuersum,

Cacoëthe.

egerrimè

egerrimè ad cicatricem perueniens. Theriode, ul-
 cera sunt aspera & ferina. Colpos, cutis ulceribus Colpos.
 adiacentis multa est separatio, unde agglutinari non
 potest. Latinis sinus dicitur. Therioma, ulcus est
 quod per se, ut inquit Celsus, nascitur. interdū etiam
 ulcere ex alia causa facto, superuenit. color est liui-
 dus uel niger odor fœtidus & multus, humor similis
 est muco. Cæterum nec tactu neque medicamentum
 sentit, sed prurigine tantum mouetur, & ex eo non-
 nunquam sanguis erumpit. Syrix, latinis fistula Syrix
 dicitur, & est sinus callosus ex abscessibus plerunque
 proficiens. sumpta per translationem ab hirundi-
 num fistularum appellatione. Hyponoma & pa- Hyponoma &
 vatrinata pedum sunt ulcera longo itinere acquisi- paratrinata.
 ta. Hactenus de medicæ artis partib. quæ res
 naturales, non naturales & præ-
 ter naturam conti-
 nent.

MEDICAE

ARTIS THEORICAE

Liber secundus.

IN QVO DE SEMIO-
tice.

Blasio Hollerio, Viuariensi: Doctore Me-
dico, Autore.

CAP. I.



VNC ILLAM MEDICAE
artis partem prosequemur, quæ va-
litudinis utriusque signa indicat.
Græci $\sigma\upsilon\mu\phi\omicron\tau\iota\kappa\acute{\upsilon}\nu$ appellantur.
Hæc illam præteritorum cognitio-
nem, præsentium inquisitionem, & futurorum præ-
dictionem comprehendit. Horum omnium signa ex
urinæ, sudore, egustionibus, sputis, vomitu, pulsibus
sumuntur: præsertim autem per Crisim excernuntur.
Est autem Crisis, quæ Latræis incertum dicitur: subi-
ta ac repentina in morbis potissimum acutis muta-
tio. Hanc subitam mutationem perturbationemq;
excretionem quædam subsequuntur. veluti sudores,
sanguinis


Crisis

sanguinis è naribus uel alijs partibus fluxiones, alui
 & urinarum profluvia, uomitiones. quemadmo-
 dum in nostris comm. Aporismorum demonstraui-
 mus. Consueuerunt etiam quædam præcedere indicia,
 die quodam indicatorio, quibus Crisis futura cogno-
 scitur: ueluti dum egrotans difficulter trahit spiri-
 tum, delirat, caliginem uel splendorem sibi ob oculos
 uersari putat, uel lachrymatur, aut rubent oculi, uel
 tempora seu totum caput aut ceruix dolore affici-
 tur, aut rigor adest, uel dolet stomachus, inferiusq;
 labrum tremit. Cæterum si Crisis absoluta fuerit, ni-
 hil in morbo facit reliquij, sed subito egrotantem à
 morbo liberat: si uerò imperfecta Crisis seu deficiens
 habeatur, ex morbo quippiam relinquit, licet in me-
 lius mutationem efficiat. Verum de his iuxta Hip-
 pocratem & Galenum, alibi sufficienter tra-
 ctauimus. Interea quenam bona quæ-
 nam uel mala Crisis censeatur ac
 fiat, tabella sequens in-
 dicabit:

Aphor. xxxvij.
 lib. ij.

Crisis futuræ
 indicia.

2 4 Crisis



Tarde, si

Contraria his omnia deprehendantur,
ex morbi & ægrotantis natura, con-
coctionibus, accessionū circuitibus,
morbi specie, magnitudine, more.

Per excretio-
nem insignē,
si

Æger iuuenis & robustus sit.
Morbus acutus & calidus.
Crisis futura cito iudicetur.
Signa alicuius excretionis propria ada-
sint.
Nulla signa abscessus.
Pulsus uehemens & altus adfuerit.

Futura

Per absces-
sum, si

Æger non senex, sed infra annos 30
aut 35. atq; tum per hemorrhogiam
quoq; Crisis adesse solet, Supra ue-
rò iam dictum tempus, frequentius
per uomitiones, alui deiectiones,
urinarum profluvia, sudores.

Morbus chronicus, cū uirium robore.
Acutus morbus cum uirium imbecilli-
tate.
Vrinae tenues & crude longo tempo-
re perseverarint.

Signa futurae Crisis, in comment. Aphor.
compendiosè etiam diximus.

P. 5. Qualia

Qualia autem et quanta futura sint mor- borum tempora indica- bunt	{	Morbi natu- ra ex	{	Temperamento agro- tantis naturali uel acquisititio: Habitū gracili, carnosō & crasso.
				Sexu. Aetate Viuendi ratione Regione Anni parte Morbo populariter grassante.
	{	Morborum signa & tem- pora præsē- tia, ut	{	Si morbus plurimum moueatur ac pre- mat, acutus erit. Si parum & lentē pro- cedat, chronicus.

Hec ex humorum abundantia et cōsistētia
da. nam morbus qui sua natura uel humoris
te uel quantitate affligit, si celeriter moueatur acutus
est, breuiq; erunt ipsius tempora: si uerò lentē ac
de moueatur, chronicus. unde & tempora longiora
erunt.

Artificiosam coniecturam præcognoscendi mor-
borum

borum tempora universalia & ipsorum signa Gal.
lib. 1. de Crisibus indicat. Verum: calamitas huius secu-
li nos præcognoscere futura certa demonstratione nõ
patitur. quare non nisi ex signis apparentibus pos-
sumus tuto iudicare. Vt in febribus, si principium cito
præterierit aliâq; tempora usq; ad declinationem ue-
hementia fuerint, acutus erit morbus: contra uerò
chronicus seu diuturnus. Et ut morbi acuti ut pluri-
mum maligni habent calidam et subtilem: ita Chro-
nici ac longi ferè semper frigidam & crassam, quæ
difficilius soluitur. Idcirco in morbis semper cogno-
scenda ipsorū causa tum simplex tum composita: de-
inde tempora 4 sequenti schemate comprehensa.

EX SEQUENTIBVS ITAQVE
tabellis dierum indicum, decretoriorum, atq;
hebdomadum, nec non temporum
atq; signorum differentias
cognoscemus.

Indices. Decretorij. Indices. Decret. Indices. Decret.

	4	7	11	14	17	20
	24	27	31	34	37	40
Dies	44	47	51	54	57	60
	64	67	71	74	77	80
	84	87	91	94	97	100.
	Hebdomada					

Hebdomada tres dieb. 20. constituta.

Prima.	Secunda.	Tertia.
IIII. III.	IIII. III.	III. III.

Mors horum tempo= ra.	Vniuer salia.	Princi- pium idq; tri plici- ter	Exquisite initium morbi, est insultus primus seu inuasio.
			Principij in morbis augmentū, ad ter- tium usq; diem extenditur.
	Particu laria.	Singularum sunt accessio- num, à prima morbi inuasio- ne, usq; ad in- termissionem distinctiones in	Augmentum, quod incrementum, et ascensus di- citur, statim principium excipit, & ad uigo- rem usq; extenditur.
Status seu uigor, uehementissima morbi pars est, ex coctionum signis cognita.			
Declinatio, statim post uigorem sequitur: ubi affectus est mitior multo.			
			Principiū accessionis febrilis, quando scilicet extremæ partes incipiunt frigesieri.
			Incrementū, ubi frigus desint. et incalescit corpus, nō ta- men exquisito calore.
			Vigorē ubi calor equaliter in totum corpus diffunditur.
			Declinationē, quando immi- nuitur calor, remissiorq; fit.

Speciem morbi indicant, Græci παθογνωμονικὰ ἀpellant. quæ simul cum morbo oriuntur ac desinunt. ut in pleuritide febris, spirandi difficultas, tussis, lateris dolor punctorius, atque interdum pulsus serratilis.

Neccessario non adsunt, sed morbos interdum comitantur ἐπεφαυμένα dicta, quæ unà cum morbo minimè oriuntur, sed proprias ipsius differentias constituunt. ut in pleuritide sputum cruentum, dolor ad claviculam uel diaphragmatis partes: facilius in latus affectum ferre decubitus, somniorum spectra, uigiliae, delirium: & huiusmodi signa, quæ morbi mansuetudinem uel è contrario monstrant.

Signa
morbo-
rum,
alia

Decretoria quæ Græcis κριτικὰ dicuntur, in augmento potissimum apparent: idq; euidenti quadam euacuatione per sudores, hæmorrhogias, alui seu uesicæ deiectiones, uomitus copiosos, aut abscessus quosdam manifestos, aliqua in corporis parte.

Coctionis signa τειπσις nuncupata, quæ nunquam primo morbi initio conspiciuntur, sed principij finem ostendunt.

Cruditatis signa ὀματὰ, Græcis appellata, primo statim morbi initio occurrunt, & interdum postea. sicuti in comment. Aphorismi Hippocratis 12. lib. 1. ostendimus.

Porro

Porro coctionis & cruditatis signa, uel sumuntur ex alui recrementis, quæ inferioris uentris sunt coctionis uel cruditatis indicia: uel urinis, quæ uenosi generis coctionem aut cruditatem indicant: uel sputis & excreationibus, quæ instrumentorum respirationi seruientium coctionem uel cruditatem ostendunt. Hæc tria salutis aut mortis signa etiam existunt. quibus additur spiratio facilis uel difficilis, pulsus bonus uel malus, faciei sanis uel desperatè agrotantibus similima: decubitus, sudor, & id genus tum bona tum mala signa, ut in præsagijs Hippocrates docet.

DE VRINIS. CAP. II.

VRNA est humidorum, in corpore existentium, colatura: quæ per uenam cauam & urinarios meatus, in uesicam delabitur. In cuius inspectione quatuor sunt consideranda: utpote color, consistentia, quantitas, & contenta. Vrina porro alteratur & conficitur in uentriculo, perficitur in hepate, segregatur in uenis. & sic est recrementum primæ coctionis. atque affectiones uenosi generis, renum, & uesicæ magis indicat: Minus uerò quæ in habitu corporis sunt: thorace, capite, & huiusmodi partibus, quæ extra uenas sunt. Interea hominis

hominis temperati ac secundum naturam se habentis urinae, priusquam aegrotantis, cognoscendae. quae subflauae uel subruffae esse debent. reliqua etiam quae insunt, ad urinam hominis non male affecti referantur.

Primo igitur color in urinis contemplan- Vrinae color
 rius est, quemadmodum uel in primis albus: sub quo
 crystallinus, niueus, & aqueus pro intensa albedine
 purus, & summæ cruditatis ex frigido uel obsiru-
 ctione uel bile, quae uergit ad alias corporis partes,
 sunt inditia: deinde à summa albedine remissus color, Vrinae lactea.
 lacteas urinas reddit, ita dictae quod lacti similes exi-
 stant. sunt tamen meliores aqueis & crystallinis. Po-
 stea glaucus color ueluti cornu pellucidus est: dein-
 ceptus charopus color sub albidis cameli pilis uel un-
 gui lapillo non absimilis. Et hi duo colores remissae
 albedinis apparent, ob rubeae bilis transpirationem
 alio quodam loco retentae: uel potius ob debilita-
 tem uirtutis alterantis & concoquentis humores.
 atque ex illa coloris affinitate urina glauca, ex hac Glaucæ,
 uero charopa dicitur. Ceterum urina alba in ijs Charopas
 qui secundum naturam se habent, multam uini præ-
 sertim exilis assumptionem indicat, atque huius iu- Vrina.
 dicij fidem facit, ipsa urinae multa deiectione. alias ue-
 rò urinae quantitas moderata & mediocris atque
 ex proportionem hypostasim habens, frigidam he-
 patis

patis intemperaturam ostendit. Ad hæc urina multum alba, hypostasim ualde obscuram & occultam habens, senectutem secundum naturam uel à morbo demonstrat: alias uerò si densam & crudam hypostasim contineret, hydropisim, præsertim anasarcam, indicaret. ut etiam paulo post dicetur.

Urina alba & tenuis.

Urinæ albæ unde fiant.

Urina ruffa.

Urina subspicea

Alba & tenuis urina, interiorum membrorum & renum opilationem indicabit: sed in acutis febribus urina alba humorem qui eam tingebat, alio transmissum indicio est. In summa urinæ albæ fiunt aut à crassitudine et multitudine crudorum humorum, aut ab opilatione meatuum, aut potus magnitudine, cruditate, auersione humoris tingentis, frigiditate. interdum ab ægritudine, quando scilicet ualde albescentes cum tenui substantia exeunt. At uero quæ cum ægritudine excernuntur, minus albæ prædictis sunt, multum tamen humorem crudum uigere in corporibus prænunciant: & quo magis albæ urinæ color intenditur, eò peior existimandus, ratione ad sanitatem habita. Interea si matutino tempore urina fuerit candida, deinde ruffa excernatur, illo modo concoquere, hoc concoxisse iudicandum. atque postquam urina tincturam aliquam acceperit, à summè crudis secedere intelligimus. Primum quidem à iam dictis urinis subspiceæ, deinde spiceæ: uel ut alij loquuntur palidæ & subpalidæ subsequuntur. ille quidem mediocriter cœtæ,

ter coctæ, Sed spicea urina maiore colore intenditur, fitq; sub aurea: quam mediocrem & temperatam esse dicimus. inde aurea, quæ fulua dicitur, & ad puri auri colorem magis accedit. Subcrocea post ipsas succedit, quæ colore similis est carthami floribus. Et crocea (quæ à bile sufficienter cocta tincturam accipit) flores croci coricei representat. Intelligendum tamen cum flores ipsi aqua fuerint macerati: alioqui subrubei & rubei inspiciuntur. ueruntamen si urina hæc intensiorem acceperit, tum apparebit rubea, cærulea, uiridis & subnigra: ueluti è diuerso subcroceus color, (ubi calor non adest) succedit fitq; subaureus, spiceus, & subspiceus. Porro urina quæ subspicea et spicea apparet, maiorem concoctionem quam quæ superius memoratæ sunt, indicat. Videtur tamē cruda collatione ad mediocrem urinam habita, et cō magis à sanis distat, quo maiori albedine cernitur, minusq; fuerit cocta urinae substantia ueluti & contenta. Colores urinarum subaurei & subcrocei perfectæ concoctionis signum præ se ferunt, & quibus placida ac mitis est natura, ijs potius urina subaurea est: qui uero rubea bili secundum naturā affecti sunt, ijs apparet subcrocea. Aurea & crocea urina ultra prædictas intensiōē caliditatis præter naturam ostendunt, quæ sub tenues seu mediocris crassitiei si fuerint, hypostasim perpaucam, obscuram, aut nul-

Urina subcrocea.

Urinarum colores sub aurei & subcrocei.

Urina aurea & Crocea.

**Urina sub-
rubea.**

Urina uinea

lam habere uidentur. Veruntamen aurea intensum
calore potius, ueluti ob multorum ciborum acrium, uel
medicinarum acutarum, aut sanguinis feruorem ab ira.
Item ob intemperiem calidam in uisceribus, et affectum
temporis constitutioni similem: Contra uero crocea: ut
que per materie defectum potius fiat, uidelicet ob mor-
rorem, curam, uigilias, solis aestum, et id genus. Ab his
sequuntur urine subrubea et rubea, ex bilis et san-
guinis mixtione, que quidem aquam carthami et cro-
ci floribus maceratis intinctam referunt: uel subrubea
que cum armenico bolo et lemnio sigillo similitudinem
habent: rubea uero pomis puniceis rubeumque colore
pre se ferentibus, colore sunt similes. Subrubea uri-
na frequentius crassa apparet, interdum etiam tenuis:
illa melior, ut que uacuatione exposculet: altera uero
concoctionem seu preparationem, antequam corpus
euacuetur, faciendam indicat. Et quibus uehementior
febris solet accendi, ijs serosa quedam sanguinis super-
fluitas in urina apparet, et quo febris uehementior eo
magis color intenditur. sicuti et alij colores ex inten-
sione aliorum affectuum. Urina uinea iam dictis suc-
cedit, a uino nigriore ueluti colore hepatis, sic dicta.
fitque ex sanguine calefacto et adassato, siue ex motu
continuo alioque quodam excessu. atque uineus color usque
adeo in peius sese prodit, quantum a subrubeo discessit
rubeus, illo namque modo adassatur bonus humor,
transitque

transitq; uel ad rubeam uel ad nigram bilem, quorum
 passionēs ceteris peiores existunt. Passca urina ea **Urina passca**
 dicitur, cuius color magis quam in uinea est intensus,
 maximeq; similis passo, quod ex uua nigra decocta,
 uel musto ad tertias cocto, conficitur. Talis namque
 passeus color humorem biliosum aduri, ueluti uineus
 sanguinem indicat. atq; dum urina passca permanens
 est, arquatū morbum adesse demonstrat. Nigros co-
 lores omnes cognouerūt, ut qui euidentes sint in ex-
 tincto carbone, succino, pice, & atramento. Nigra **Urina nigra**
 igitur urina interdum caliditatis ad extremum per-
 ductæ est index, præsertim si uiridis aut aliqua ei pro-
 xima præcesserit: nonnunquam extremam frigidita-
 tem significat, quando scilicet liuida aut ueneta prius
 apparuerit, & utraq; perniciofa: tametsi in passio-
 nibus, quæ originem ab humore nigro traxerunt, u-
 rina nigra apparente, salutem futuram indicat: si-
 cuti in quartana febre, & alijs melancholicis mor-
 bis ac diuturnioribus. sed in ijs qui febre acuta la-
 borant, urina huiusmodi nigra semper mala atque
 mortis nuncia fuit. Venetus qui & ceruleus co-
 lor est ex puro albo & nigro æquali portione con-
 fusis gignitur. qui quidem in urinis quando sub-
 tenuis apparet, per superficiem fusi melancholi-
 ci humoris generati ostendit. Si uero uersus cras-
 sitiem uergat, tunc ob multam frigiditatem

**Urinæ color
 uenetus sine
 ceruleo.**

Q 2

fieri

Urina uiridis.

fieri iudicamus. & nisi præcesserit concoctionis signum, sed à malo ad peiore, fiat transmutatio, uirtutis mortificationem indicat. Viridis urinae color, brassicae, graminis, uiole herbae, aut smaragdi lapilli, colorem refert. fitq; ob excessum pessimae bilis exaugetae, quantitate & qualitate: atq; ad bilis atrae naturam iam redactae, unde tam mala est, quam longo tempore fortunaq; secunda atq; uirtutis constantia indiget, ut ad bonam reducatur. Ostendit enim humorem biliosum eò usq; super reliquos excessisse, quantum is color à ceterorum coloribus dissensit, suapte natura ad malignitatem procedendo. Et quò magis asfatus fuerit humor, eò magis color ad nigredinem intensus apparebit. Oleaceus in urinis color tripliciter distinguitur, primo euidentem olei colorem obtinet, & tunc urina communi nomine oleicolora dicitur, quae in principio nondum exacte eo colore urina huiusmodi tincta apparet. Altero modo tenuiorem coloris tingentis oleaginosum humorem urina possidet, quae expectatur in augmento morborum colliquantium. Tertio, oleaginosa urina olei coloris similis est, et generis appellatione oleacea dicitur, quae passionem esse in summo ostendit, utpote cum exacte pingue iam sit colliquantum. Haec urinae interdum liquefactae pinguedinis corporis uniuersi, interdum renum duntaxat indicia sunt. Si igitur paulatim eiusmodi

**Urina oleacea
triplex.**

modi color processerit, ita ut multo tempore confir-
metur, signum erit febrem per totum corpus esse dif-
fusam, si uero breui atq; cumulatim appareat, pas-
sio renum tantummodo demonstratur adesse, quibus
quoq; fidem faciet uehementia presentis caliditatis,
quæ tunc in renibus solis excitatur: illo nanq; modo
in corpore uniuerso ardor sentitur. Interea urina or-
leacea mortem ueluti nigram minatur. sicuti Actua-
rius lib. 2. de causis urinarum scriptum reliquit. Li-
uidus color plumbeus est aut plumbi similis: uersus
nigrum eatenus inclinans, quatenus à colore ueneto
recesserit, ueluti si nigra quædam ad alba in pari mi-
xtione se habeant, ut pix & cerusa æquali, ut di-
xi, portione, inde liuidus color exacte apparebit, qui
& uenetus (de quo iam diximus) appellatur, qui qui-
dem sub cæruleo continetur: & hic proprie color est
Cœli sereni. Sed quoniam cærulei quædam species est
penè nigra, ob id liuidum & cæruleum colorem eun-
dem esse quidam dixerunt. sed liuidus color uenetum
& cæruleum superat. atq; urina liuida ob plagas &
uerbera frequentius apparet, ostenditq; magnam san-
guinis mortificationem. Sanguis enim mortificatus
subnigrescere consuevit. Porro urina liuida et uene-
ta ob caliditatem non fiunt, sed interdum ob frigidi-
tatem, & interdum ob nigrum humorem, ut dictum
est. Hæc de urinarum coloribus. Nunc de consistentia

Urinæ color
Liuidus, seu
uenetus.

Vrinarum con-
sistentia tri-
plex.

ipsarum dicamus. Vrinarum igitur substantia seu consistentia triplex est, tenuis, crassa, mediocris.

Vrinæ ex in-
temperie.

Vrina crassa.

Tenuis urinæ obstructions demonstrant, & caliditatem genuinam decidisse ab eo quod conuenit: aut quia superata est ab aliqua potente frigidityte: aut quia extranea & corruptrix caliditas occasione aliqua præcedens ipsam caliditatem genuinam & naturalem occupat, ita ut hæc obscura fiat, atque ab actione propria prohibeatur. Huiusmodi urinæ magnam uirtutis debilitatem arguunt, & eò magis quo cum coloribus malignioribus inspectantur. Calidum enim innatum languescere significat. Neque refert siue innatum calorem siue genuinum & naturalem, siue à natura insitum dixerimus. Et qui ob nudam quamcunque intemperaturam ægrotant, urinæ perquam tenues apparent: minus uerò tenues naturæ oppugnante: sicuti mediocres, cum dominata fuerit. Tenuissimæ uero extremam quandam debilitatem naturæ atque cruditatem arguunt, ob defectum caloris genuini. Crassa urina pugnam quandam naturæ indicat, atque certamen ueluti mentis, ut dominetur materiæ: & iamiam fortasse dominantis, nisi apparuerint in urina substantiæ uehementer crassæ. Crassescunt etiam temporis progressu urinæ, ægritudinum initio utpote ob aliquam materiam plus iusto auctam tenues excernantur.

Bantur. Interdum etiam ab initio crassæ inspiciuntur. Porro urinae crassæ signa semper fuerunt humores quicumque aliquo modo uentrem superiorem & inferiorem, atque hepatis partes suas implent.

Vrina crassa

Mediocre in substantia urinam generant. Caliditas in cibo & potu assumptis, atque humoribus internis prædominans ut decet, ad concoctiones efficit. Si uerò acciderit aberrare, cruditas aderit.

Vrinæ quantitas.

Nunc de quantitate ipsarum urinarum quæ multa uel pauca uel mediocris esse dicitur: excessu uerò plurima uel pauciora. illa quidem copiosis humida qualitate cibis profluit, copiosa quoque uini præsertim albi, aquosi & exilis: medicamentis etiam diureticis: similiter & intemperie circa renes calida: ut in diabete, in qua sitis supra modum urget, idque ob immodicum calorem consumentem: & retentricis renum potentie imbecillitatem. Talis quidem urina alba & tenuis est, atque hypostasi priuata.

Vrina in hydrope.

In hydrope, præsertim anasarca, urina multa & aquea est, crudam diuersamque hypostasim continens. Quinetiam multa urina spectatur in ijs, qui pauca excernunt, ob naturalem quandam uentris siccitatem & caloris mediocritatem: sed et maiorem & crassiorem hypostasim habet.

Urina propor-
tione minor.

Copiosa quoque urina in febrientibus per Crisim
nonnunquam excernitur. Rursus urina propor-
tione minor quam mediocris effluens, per horum con-
traria euenit. nam dieta siccior paucam urinam gi-
gnit, sed subcroceam, atque hypostasim minorem sed
crassiorem quodammodo quam mediocris possidet.
Item humores, alimenta, pharmaca glutinosa & ob-
struentia, paucam urinam generant, eo quod exitus
opportunos arctent. hypostasim etiam paucam et te-
nuem habet. Præterea urina minor proportionem exit,
cum multa fuerit uentris euacuatio, eo quod super-
fluitatis multitudo per illas partes fluxerit, & ad te-
nuitatem declinat, tenuem quoque & per obscuram
ac minimè lenem cōtinet hypostasim. quales etiam u-
rinæ in senectute spectantur, ueluti etiam in sequen-
tibus dicetur. Pauca etiam urina producitur ex uehe-
menter febrientibus. nam calor qui febris quantita-
tem indicat, corporis humiditatem depascitur. Nec
multa quoque urina ab exercitijs uehementibus, quæ
corpus exiccare consueuerunt: nec cum aliquis uaso-
rum urinalium affectus est, ac dolore afficitur.

Urinarum
contenta.

Hactenus de urinarum coloribus, consistentia,
quantitate compendiose, loquuti sumus: nunc de ipsa-
rum contentis eadem uia & ratione dicamus.

Contenta urinarum tria prima & præcipua
habetur quæ Græcis nominibus ὑπὸς αἰσῶς, ἐν αἰσῶ-
ς, & αἰσῶς

γρυα & νεφέλη nuncupata sunt. quæ quidem in
 urinis eorum qui secundum naturam se habent, co-
 lorem, substantiam, qualitatem, & locum cuiq; sibi
 conuenientem, ut retineant necesse est: reliquis etiam
 quæ requiruntur decenter obseruatis. Hypostasis
 quidem in matulæ fundo, deinde in superficie, tum
 demum in utriusque extremitatis medio conspicitur.
 Et cum in matulæ parte inferiori subsidet ὑπὸς α-
 σις, ut iam dictum est nuncupatur: Latini subiecta
 & subcidentia: quæ si tertium siue supremum locum
 obtineant, capitis dolorem non mediocrem adesse si-
 gnificabūt: alterum contentorum in medio totius al-
 titudinis ipsius urinæ consistit & tunc, ἐν αὐτῷ γρυα
 dicitur. Latini sublationes et sublimia uocant: sic quæ
 ab utrisq; extremis secesserunt siue inferius siue su-
 perius quam medium, sublimia, sed parum proprie
 nonnulli uocarunt. nam quæ medium locum obtinent
 exactam rationē sublimitatis sunt adepta. Tertium
 in summa urinæ superficie uel paulo citerius natat,
 νεφέλη Græcis, Latinis uerò nubes & nebula me-
 taphorice. Interea non aliter in contentis quam in li-
 quore tria erunt considerata, utpote substantia, co-
 lor, & quantitas. Substantia aut erit tenuis aut cras-
 sa aut mediocris, atq; urinarum contenta, quæ secun-
 dum naturam sunt, mediocris consistentiæ erunt, al-
 ba, leuia & æquabilia. Sunt autē leuia quæ continua

Tria in con-
 tentis consi-
 deranda.

Q 5 sibi

Hippocrat. li.
prolag.

sibi sunt, & tanquam unum coactum corpus, nullo modo huc aut illuc compulsus seu aliqua ex parte dissolutum. unde Hippocrates, Urina optima est quæ albam, leuem & æquabilem hypostasim habet. Quæ autem contrario modo se habent, alia auxerunt continuitatem, & tenacia euaserunt: alia continuitatem disciderunt, & reddita sunt aspera. atque tenacium contentorum, alia uel modice affecta, ualde commotam matulam esse oportet, ut illa dissoluantur: alia adhuc magis affecta: sic ut etiam commota matula modice dissoluantur: alia insuper usque adeo tenacia, ut non facile dissoluantur, cum iam glutinosa sint. Contentorum asperorum alia modice affecta sunt, ita ut uisus capiat partes eorum iam discretas, alia magis affecta, unde magis apparent & conspiciuntur, uisusque magis capiat altitudinem & latitudinem corporis urinæ: alia uerò plurimum ad omnem altitudinem, latitudinem, atque magis longitudinem, perinde ac esset in frustra incisa.

Concoctionis
tertiæ indicia.

In contentis quæ mediocria sunt, leuia & æqualia, coctionem naturalem indicant: aspera uerò concoctionis defectum. Cæterum contenta quæ superfluitates quædam sunt terciæ concoctionis: maiora, minora, aut mediocri quantitate in urinis esse contingit. Verum si alba, leuia & æqualia fuerint, atque substantia mediocri, & ad fundum

dum matule concesserint , tunc tertia concoctio secundum naturam perfecta est , contrarium uero , corpus non benè habere & sanitatem deprauatam esse demonstrant. Magna in urinis contenta facilem concoctionem & ualidum calorem naturalem , otium , & uictum copiosum & ad digerendum facilem indicant. Interdum etiam non parua quædam retentio euaporationis in uniuerso corpore , magna in urinis contenta producit. Tenuia contenta & pura nec facile assurgentia , quando matula commouetur , magnam debilitatem nature in tertia concoctione adesse significant: Crassa uero apparentia contenta , nec male olentia , tunc non saniem sed crudorum quorundam humorum in urinis separationem significant. Et ut multa contenta in urinis , multum nutrimentum & robur alteratricis potentia : sic pauca , ob inediam , exercitia , opilationes , & tardas concoctiones fieri dubium non est.

Nunc de contentorum coloribus secundum naturam , quos nemo esse uehementer albos aut subspiceos dixerit , sed mediocritatem inter ipsos obtinent. Contenta uero præter naturam uehementer alba si fuerint , humoris alicuius phlegmatici recrementa sunt : aut pus summæ coctus , quod ab aliquo interno membro proficiscitur.

Colores

Contenta
nigra.

Subrubea &
rubea conten-
ta.

Colores subspicei & Spicei boni non sunt, nisi mediocres fuerint, à mediocri scilicet bile, siquidem bilis contenta per se mala sunt. quippe quæ exhaustam esse bilem rubeam in tertia concoctione (quæ fit in uenis) significant. Contenta nigra pessima sunt, quæ superatam uirtutem à multitudine malorum humorum indicant, nisi talium humorum sequestratio ac separatio fiat, sicuti in morbis melancholicis, ueluti feбри quartana. Adhæc non minus periculosa contenta ueneta, liuida, & eo magis quod uersus fundum matula contenta recesserint. Subrubea atq; rubea contenta cruditatem quandam in tertia concoctione, ob rubeæ bilis excessum demonstrant, nec uacant periculo, nisi minuatur excessus, ut facile uirtus ad se reducatur. Contenta ueluti cruore suffusa, peiora sunt rubeis contentis, sed meliora liuidis & nigris. significant enim sanguineum humorem non omnino elaboratum esse. Fusca in urinis contenta & liuida & nigra mortificationem uirtutis uitalis aut humoris melancholici abundantiam præ se ferunt, nam ubi sanguis uersus fuerit in colorem nigrum, uirtutis remissionem, & (ut iam dixi) mortificationem, tormenta, uerbera, aut aliud quid simile, portendit: tunc enim natura tanquam superfluum illinc deriuat atq; urina eiusmodi excrementis tingitur. Sequitur nunc ut de orobea, surfurea, laminea atque similacea hy-
postasi,

postasi, quæ semper fundum matulæ petit, aliquid dicamus. Orobea igitur hypostasis (quæ ab orobo seu eruo deglubro nomen accepit) in urinis apparet, ubi caro (pingui iam consumpto) incipit imminui. significat enim corporis uniuerſi uel renum duntaxat collicationem, sed in his qui toto corpore febriunt, oro-bea hypostasis, corporis totius liquefactionem significat: qui uerò febre nō affliguntur, horum renes soli hanc affectionem ferunt, & in matulæ fundo tantum subsidet, quantum de carnis substantia depascitur.

Hypostasis
quæ semper
malulæ fun-
dum petit.

Furfurea hypostasis, à similitudine eorum unde nomen deducit appellata, peior est prædicta, & melior quam laminea. apparetq; dum febris in profundis uasis infixæ est: interdum etiam solius uesicæ patientis signum. quod concoctione, cruditate, febre, ac febris absentia, ut est de orobea dictum, distinguitur. Quibus namq; in urina crassa (inquit Hippocrates) fursurea simul prodeunt, ijs uesica scabie laborat. Fursurea igitur contenta, quæ totius corporis assumptione fiunt, febris & urinae cruditati iunguntur: contra uero quæ malè affectam uesicam significant, sine febre cum urina cocta & partis affectæ molestia. Laminea hypostasis, quæ laminarum instar, lata & tenuis est, qua solidæ corporis partes tabescere significatur contingit, interdum & renum uitio, ut in orobea: sed potius exulceratæ uesicæ est signum. unde Hippocrates, Si

Hypostasis
furfurea.

iiij. Aphorif.
lxxvij.

Hypostasis
Laminea

Bl. Aphor.
lxxxj.

Similaceæ

**Capilli figuræ
in contentis
grinarum.**

tes. Si quis sanguinem & pus & squamulas min-
gat, grauisque ad odor fuerit, his uesticæ exulceratio-
nem patitur. Similacea hypostasis, quæ crassi
furfuris speciem refert, prædictarum pessima est:
quæ si ad album colorem tendat, solidarum partium
collicationem: sin uerò rubea sit, sanguinis assati
indiciu erit, & utraque ab hectica febre incen-
ditur. Accidit nonnunquam ut bona hypostasis
cum malis quibusdam & incoctis humorum por-
tiunculis, ueluti ramentis, & contentis uersus au-
reum uel album uel propinquum colorem, conspi-
ciatur. quæ si multa fuerit semicoctam materiam es-
se indicat: sin uerò pauca, moderationem & ex
mala uictus ratione conquistam. Et quo maiora
ramenta fuerint, eò maiorem caliditatem osten-
dunt. Interdum etiam in contentis ueluti capilli
subalbi inspiciuntur, renum quandam passionem
indicantes. Cum uero conspiciuntur in ipsis con-
tentis plura ac diuersi generis corpora, & in ipso
urine sinu dispersa, tum dolores in corpore diffu-
sos hominem corripere est indicium. Porro
contenta si omnia continua & leuia manserint, ni-
hil noui in homine productum esse significant: sin
uerò fuerint aspera atque ueluti dispersa. non par-
uam perturbationem generatam in profundo corpo-
re ex aliquo adulterino, (nempe calido & humido,
atque

atque uiolento) spiritu denunciant. Quod si aliquid
 ualde crudum contentis immisceatur, id spiritus ui-
 olentia pulsum ad sublimes partes indicat, dolo-
 remq; sensibus infert. Iam uero de locis contento-
 rum dicamus, qui tres sunt numero. Etenim contenta
 quæ ad matulæ fundum sibi sedem uendicant, hypo-
 stases, quæ ad matulæ medium eleuantur, sublimia: et
 quæ ad ipsam urinæ superficiem, nubes: sicuti antea
 diximus, appellantur. quæ omnia bona si fuerint &
 moderata, nihil noui in corpore humano significant:
 si uero, cruda atque specie diuersa, contrarium.

Contentorum
 loci.

Superest ut de ijs quæ in urinæ superficie na-
 tant, nonnihil etiam breuiter attingamus: cuius-
 modi sunt liquida quædam, araneæ, & olei uelu-
 ti puncta, nunc pauca, nunc plura, nunc tenuia,
 nunc crassa: qualia in pingui iure refrigerato inna-
 tare uidentur: quæ alicuius collicationis siue totius
 corporis, siue renum indicabunt. Verum si parum
 apparuerint & sese resoluerint, difficultatis nihil
 adesse significant: si perseverarint, tanquam princi-
 pium collicationis id timendum. Innatant quo-
 que bullæ quæ ob spiritus extranei, præsertim cras-
 si, uehementiam fiunt: & capitis dolores & re-
 num, atque pulmonis defluxum indicant. ha-
 rum aliæ perquam magnæ, aliæ perquam par-
 uæ, aliæ mediocres existunt: Et quædam ex his

Vrinis Inna-
 tantia.

per

per omnem superficiem urinae apparent, quaedam contra in sola corona circumiacent aut aliqua eius parte, siue in pluribus sparguntur: item uel in media urinae superficie uel in altera sola medietate superficiei, aut alio modo inordinato et complicato, tam per coronam quam superficiem innatant: Et quae in corona spectantur uel singulae uel binae, ternae, alioque numero consiſiunt: dispari etiam magnitudine. Sic de ijs quae in matulae planicie fluctuant, tum sparsae, tum sociatae. Intelligendum tamen non est de bullis innatantibus, quae fiunt cum urina mingitur, sed de ijs tantum quae remanent postquam quieta fuerit, atque omni ex parte refrigerata. nam bullae eiusmodi urinae quiescentis et refrigeratae, à praestantiore quadam causa generatae uidentur: quae uero paulo post quam intumuerunt dissoluuntur, debiliores habent causas & perquam facile solutae abeunt. Atque urinae cum subalbidis & spicis, aureis, & subrubeis coloribus maxime conspicatae sunt: non autem cum nimium albis coloribus unquam uisae sunt, neque rubeis, quia spiritus ad eas non possunt generari ubi excessus est calidarum dominantium. Sunt enim bullae spiritus adulterini signa, & quae in corona sola integra serie collatae sunt: atque si contigerit ut colore humoris tinctae sint urinae, maiorem capiti affectionem adesse significant. Quae uero sparsim in corona manent, à debiliore

Bullarum signa.

debiliore fiunt causa: uidelicet spiritibus debilioribus,
 & minorem tolerabilioremq; dolorem inferunt. Ve=
 runtamen eò maiores dolores capiti adesse ostendunt,
 quo cum intensius aureo colore inspiciuntur. indicant
 enim magnā nocentis spiritus seuitiam. Bullæ albæ Bullæ albæ in=
 uel albis uicinæ in superficiario et circulari urinae am superficiario
 bitu consistentes, paruum aut nullum capiti dolorem
 adesse denunciant. quod si tum fuerit urina tenuis,
 habueritq; contenta non omnino cocta, caloris na=
 turalis imbecillitatem indicabunt: si uerò crassa fue=
 rit urina, tum spiritus proprius est humori ipsius uri=
 nae. In urina tenui & hypostasi priuata, bullæ renum
 opilationem potius indicant. & quas uersus mediam
 superficiem urinae pendere uiderimus, affectionis re=
 missionem ostendunt. quinetiam bullæ aliæ in urina=
 rum superficie pallentes, nihil super capite demon=
 strant, sed solum multam naturæ debilitatem: & ma=
 ximè quo plures fuerint opilationes, & humorum
 cruditates: Interdum naturam indulgere concoctioni
 indicant, cum pridem uisæ nullibi fuerint. Quin &
 in his qui seminis fluxu, quem gonorrhæam dicunt,
 laborant: bullæ densius in urinis apparent. idq; in
 linea circulari, quæ circumducitur per ambitum uri=
 nae, superficiarium coronam uulgato uocabulo dictū.
 ubi notam bonam malamue pro humoris transmu=
 tati exuperantia licebit intueri. In aureis siquidem

R urinis

urinīs & rubeis uineisq; & alijs id genus, si alba fuerit corona seu albicans, bona in urinīs est nota, quia natura incipit dominari: sed in uiridi & passēa urina, si corona sit peioris coloris, contrarium: & inde malum coniectare oportet, tanquam malos humores dominari: qui quidem nocentes pari uirtute & mensura urinas si tinxerint, nulla corona euidenter expectari poterit: sed si uirtus uincēs aut uicta manserit, urinae colores hoc uel illo modo apparere necesse est. Porro urinae aureae rubeae, aut uineae alioque colore tinctae si in febre uehementi praecesserint, et ad alium colorem (febre manente) mutantur, nec Crisis signum laudabile adsit, tunc phrenesis expectanda. & eo grauior, quo praedicti colores fuerint peiores. Ex odore urinarum ingrato & malo, putredinem aliquam membri interioris iudicare licebit, itaq; si puris aliquid urinis adfuerit, putredo euidenter est causa: si uero odor malus absq; pure, & mediocria uideantur concoctionis signa, particulae alicuius mortificationem adesse creditur, & cum malis signis corpori uniuerso.

Urinae phrenesim indicantes.

Urinae citra hypostasim.

Nunc de urinīs quae citra hypostasim apparent, quarum aliae perquam tenues, aliae tenues quidem, sed non multum, quaedam etiam tenues, etsi mediocribus spissiores uideantur. Cum igitur tenuissima urina atq; uehementer alba hypostasim non habet, tum non contemnendam opilationem uasorum, aut indecentem

tem

tem frigiditatem: atq; cruditatem demonstrat, magis aut minus pro excessu uel defectu à mediocritate.

Spicea & subspicea minorem opilationem non tamen minorem cruditatem ostendit. Aurea & crocea urina minorem opilationem sed cruditatem, tanquā naturalem caliditatem expugnasset adulterina caliditas. Quinetiā eiusmodi urinae hypostasi priuatae, prouenire possunt ob ingentes dolores, immensa exercitia aut materiei defectum. Rubra & passae urinae dominantium humorum qualitatem atq; proprietatem ostendunt.

Urina rubra & passae.

Superest nunc ut de morborum quorundam particularium urinis dicamus, & primo de febribus. ab ephemeris seu diarijs incipientes, quae quidem ab ira, tristitia, curis, aestu, frigore, inedia, cruditate: uel alijs quibusdam causis: de quibus antea, generata sunt. Sunt autem urinae accidentium indicia quae circa humores, in uenis manentes existunt. In hac enim febre non nisi ex calore urinae alterantur, humoribus tamen in uenis prius alteratis, idq; in omnium febrium ephemerarum specie. Et priusq; illi alterentur, febris fit solutio, maximè si noctam fuerint rationem uictus conuenientem. Quae autem febres ex humorum putredine accenduntur, aliae sunt deficientes seu interpolate intermittentesue: aliae continuae quae

R 2 assidue

Febris tertiana
puræ urinæ.

Urinæ impu-
rarum tertiana-
rum.

Febris quarta-
na urinæ.

assidue uexant. Sed primo deficientium urinas declarabimus. Tertianæ igitur puræ febris cum sit, urinæ spectantur aureæ & crocæ, substantiam mediocribus crassiorem habentes. atque primis diebus nullum coctionis signum euentissimum subsistit, idque ratione cruditatis & alicuius opilationis. Tempore uero procedente, signa coctionis apparent. Ceterum bilis dominante atque putrente in uenis, urinæ crocæ & rubæ interdum apparent, frequentius tamē passæ, uirides, & nigræ: atque si contenta adsuerint, ea apparebunt biliosa & ualde mala. Impurarum uero tertianarum urinæ, aureum colorem excedunt, & ad uineum attolluntur, substantia etiam crassior quam in exacta tertiana. Plura etiam signa cruditatis circa contenta cernuntur. Ceterum tertiana impura magnitudine & qualitate bilis, tertianam puram superat, ita ut longiore tempore ad concoquendum sit opus, nam bilis maior & deterior est. Quartanæ febris, quæ a liene trahit originem, urina deficit in substantia, quippe quæ tenuis est atque alba, & hypostasi priuata in principio: temporis uero processu, præsertim diebus remissionis, apparet in ea hypostasis cummulata, tametsi urinam ipsam interdum turbidam apparere cōtingat. Porro in melancholicis humor si quando putruerit ac per corpus discurrerit, febrem quartanam intermittentem efficiet, in cuius paroxismo

urine,

urinae, quales iam diximus, apparebunt. sed cum humor ueluti ad exitum producitur, tum urinae apparent uenetæ atq; nigrae. Et hæc quidem morbi solutionem indicant. In febribus quartanis ab hepatis calida intemperatura, urina subrubea & rubea cernitur: crassior mediocri, hypostasim ut quantitate moderatam, ita dissimilem continens, & ad colorem aureum interdum uergens. Hæc febris quartana notha dicitur. cuius urina nonnunquam in totum crassa & rubea spectatur: iuxta humoris implicati ac dominij qualitatem. Amphemerina febris, id est quotidiana Febris quotidiana urinæ. cum adest, urina est tenuis & alba ac ueluti aquea, atq; hypostasi priuata in principio, sicuti de quartana dictum est, sed in progressu fit crassa, hypostasim cumulatam & crassam (humore iam concocto) habens. Febrium coniunctarum atque continuarum urinæ tendunt ad deteriora. in quibus contenta quoque mala spectantur atq; uaria, pro qualitate humorum excedentium. Generantur enim febres putridæ uel à pura bile putrefacta uel à sanguine aut pituita aut melancholia: uel ab omnibus mixtis, ueluti à duobus aut tribus humoribus complicatis, sed quæ ex simplicibus humoribus ortū habent, earum causæ & iudicia facile concipiuntur. Complicatarum uero difficilis exacta cognitio. Continuarum igitur februm Febris continua rumurinæ. à putredine primum urinæ alterantur ad aureum,

R 3 rubeum,

rubeum uineum, & passeum colorem, ut fuerit humorum qualitas & quantitas. In febre continua ob putrefactam pituitam, urinae apparent subalbidae & crassae, ueluti glaucae & charopae. Cumque colores uel albi uel diuersi apparent, contenta ipsarum in principio concocta non cernuntur, sed dissimilia: procedente uero aegritudine, facilis concoctionis apparent signa. Interdum etiam post febris uigorem contenta cumulata & crassa subcidere spectantur: cum putredo quae in uenis erat, ab eo tempore principium repetat. In erysipelate, igni sacro, & similibus affectionibus admodum calidis, & in membro aliquo principali, tunc urinae multum alterantur, idque magis si partes principes ac nobiliores & affectus calidissimi fuerint: primum quidem tenues & absque contentis spectantur. Hepate igitur & pulmone patientibus ob aliquem eiusmodi aestum ex humore quodam, urina spectatur per quam rubea atque sanguinea & uinea, pro affectus magnitudine & qualitate. Ipsis affectibus si cerebrum aut septum transuersum aut uenter patiatur, tum urinae minus alterantur: patientium uero dictas affectiones in liene, urinae color malus apparet: ob nigredinem humoris, qui in eo abundat, si per urinas minuatur, sed horum febris minor quam in praedictis existit. Uterus, renes, uesica, colon, & po-

Urina in affectionibus calidis.

& podex si afficiantur, urinam alterant, sed minus
 quam cerebrum & septum transuersum. Interea
 menses absq; ratione si retineantur, post mensem in
 contentis ramenta rubea innatare apparebunt, &
 procedente retentione plura ramenta expectabun-
 tur, & urinae color ad subrubeum & rubeum ten-
 dit. Membrorum affectionum quæ extrinsecus longe
 distant à caloris fonte, urina mediocriter mutatur, al-
 teraturûe, & concoctionis signa apparent, cum nul-
 la febris putrida ab illis membris accenditur: contra
 uerò quæcunq; membra interna ab aliquo influente
 humore frigido patiuntur, siue cerebrum sit siue epar,
 pulmo, septum transuersum, uenter: siue particula
 alia horum membrorum: illa quæ longius à fonte calo-
 ris seposita sunt minus alterantur, atque frigidi &
 crudi humoris actiones ostendunt. Et huiusmodi
 urinae albæ & tenues spectantur, atq; frequentius
 contentis priuatæ: tametsi nonnunquam crassæ cum
 crudis & pituitosis contentis pro qualitatibus & quan-
 titatis dominio & passionis excessu. nam si frigidi-
 tas excesserit, & usq; ad cor peruenerit, deijcit ue-
 hementer ipsius cordis robur, caloremq; naturalem
 interdum extinguit. præterea si frigidam intempera-
 turam cor patitur, urinae mediocriter alterantur, in-
 clinantes ad albedinē atq; contenta aderunt cruda et

Quid urinā &
quid pulsus
indicet.

quantitate mediocria. Nec longe aliter in conco-
ctione debili urinæ profluunt. Caterum qui animo
seu spiritu aut nervorum genere affectionem quan-
dam patiuntur, non facile per urinas fit iudicium, nisi
uenarum genus sensum membri suscipia. Urinæ si-
quidem melius ostendunt quæ humoribus & conco-
ctionibus insunt: pulsus uero alterationem factam in
spiritibus & uenoso genere. atq; in affectibus cordis
& ad uires primum considerandi. Urinæ porro ro-
bur & imbecillitatem iecoris, & aliarum partium
naturalium indicant: sicuti alui deiectiones uentri-
culi & intestinorum. Contemplanda semper in uri-
nis substantia, color, & contenta: nec non temporum
differentiæ. Solent namq; interdum urinarum sub-
stantiæ alterari, nec semper eodem modo permanere
atq; maiori motione in eis, quam in coloribus mutan-
dis est opus. Interea mutationes huiusmodi uel ordi-
nate sunt, aut nullum ordinem seruant: ut si color &
substantia in urinis complicantur, deinde alteruter
uel ambo alterentur, postea in primum statum re-
deant, hæc uarietas ordinata dicitur: contra uero si in
ordinatis relictibus & temporibus colorum & sub-
stantiarum fiat mutatio.

Colores unde
sunt.

Colores uarij fiunt cum ab uno in alium fit tran-
situs seu transmutatio: ut si urina nūc appareat alba,
cras aurea, postea aliter: uel contra quomodocunque
contin-

contingat, & tunc coctionum differentias siue bonas siue malas considerare licebit. Interdum enim in totum crassæ apparent, nullam sequestrationem habentes: interdum in eis subcidit ad fundum matulae id quod crassius est, reliqua urina crassa etiam remanente: nonnunquam omnis crassities ad fundum consedit, quæ nunc magis nunc minus suffundit. Idem & in tenuibus fieri contingit: interdum pendentia uidentur, & aliquando attolli usque ad superficiem urinae: nonnunquam leuia, interdum dissipata, alba, quædam alia in alios colores mutata, & aliquando tenuia effecta ex crassis, & crassa ex tenuibus: nonnunquam è superiori loco decidunt ad inferna, interdum contra ab inferiori ad superna feruntur: idque cum diuersis coloribus & substantijs, in quibus multa reperiuntur uarietates.

Huc de matulis, loco congruo, & tempore spectanda^{Matulae,} urinarum referamus. Matulae igitur ex vitro albo & tenui esse debent, ut exactius colores appareant. Virides enim non solum de coloribus aliquid immutant, sed substantiae quoque iudicium peruertunt, & in eis contenta exacte non apparent. Figura ipsius matulae admodum patens non sit, ut altitudini quoque locus sit, per quem contenta contineri ualeant. Ne sint etiam extraneæ figurae, ueluti arctæ nimis aut latæ, altæ, crassæ uel duplices, sed quoad

fieri poterit simplices & leues non multam urinam ad fundum cōtinentes, sed in triplici dimensione æqua proportionē respondentes, ut quantitas urinarum quæ omnino & perfectē excipienda est, contineri possit.

Locus in urinis inspiciēdis commodus.

Locus in urinis spectandis commodus erit non umbratilis, nec pellucidus, sed inter hos medius, quo manifeste contenta uideantur. Quod sicubi loca sint, ualde obscura, transferenda urina ad locum sublucidum ubi latentia pateant. At si urinae in matulis factæ, attactu subcalidæ fuerint, in eis minus exactē spectantur contenta, substantiæ, & bullæ: sed color perfectē apparet: ubi autem refrigerata urina fuerit ac subciderit, eadem hora, aut alias intra sex, inspicienda, atque si frigore uel alia occasione turbata uel incrassata mutatione fuerit, ad ignem posita ac dissoluta inspiciatur, nam in aqua calenti aut super cineres calidos posita, hypostasis dissoluitur, permiscetur & suam sedem deserit, crassas urinas nedum tenues commouere oportet, priusquam omnia uiderimus: ne contenta in concussa suam sedem effugiant & bullæ aut spumose quædam superfluitates enascantur, & inde flatulentos spiritus adesse iudicauerimus. Bullæ huiusmodi siue in urina fiant, siue ex motu & concitatione generentur, auriscalpio attactu euanescent, idq; ob acrimoniam biliosi recrementi.

Nunc

Nunc de urinis secundum etatem, sexum, naturam
 les quasdam temperaturas, exercitia, anni tempus, re- Urinæ iuxta 28
 giones & alimenta dicamus. Infantibus igitur aquo- tates.
 se tenues & crudæ minguntur, principio dum febre
 tentantur, ab obstructione & uermib. In iuuenibus
 autem temperatis & etate florētibus, urina erit sub-
 aurea & subcrocea, & mediocris hypostasis. Senum
 subtilis & alba paucam hypostasim habens, quæ ad
 cruditatem inclinât: et quo magis processerit etas, eo
 magis ad frigidum declinat, atq; urinæ albiores & te-
 nuiores redduntur. Puerorum urinæ ut parum à sub-
 aureis & subcroceis recedunt, ita substantia parum
 excedunt iuuenum urinas, et hypostasim cumulatam
 congregatamq; continent. Et quo pueri fiunt natu-
 maiores, eò intensiores colores urinarum aderūt, sed
 hypostasis quantitas minor. At uerò quantū etas ad
 senectutem declinat, tantum etiam urinæ ad album co-
 lorem recedunt, hypostasisq; minor & obscurior fit.
 Plura igitur contenta expectabuntur in pueris quàm
 in iuuenibus et senibus, ratione quietis & facilioris
 concoctionis. Mulierū otio
 Mulierum uigentis iuuentæ atq; tem-
 peratarum, urinæ non multum recedunt à colore sub-
 aureo & subcroceo uersus album tamen declinantes,
 & substantiæ subtiles quodammodo sunt: uerunta-
 men hypostasim congregatam magis uidentur habe-
 re quàm uirorum urinæ, substantia uerò pellucidior
 quo-

quodammodo quam in uiris expectatur. Plura contenta in mulierum urinis quam uirorum duabus de causis Actuarius existimat, nempe quod superfluitatibus abundant, & natura humida sint, hoc ex semine & naturali genitura: illud à debili concoctione. Genus siquidem muliebre domesticum est, paucis exercitijs utens, atq; remissam habens naturalem caliditatem, comparatione cum caliditate masculorum habita, unde concoctiones debiles efficit.

Urinæ virginum.

Virginum urinæ puræ & claræ absq; macula iudicantur. Grauidarum mulierum dum sanæ sunt, urina albam nebulam in modum bombacis optimè carpti, in hyeme possident: in æstate uerò colorem sanguineum. Possunt ex accidenti alios calores aliaue contenta possidere. ob id in utero gerentibus, febribus pestilentibus, cutis, partium extremarum & pectoris affectibus, atque infantium morbis, fallacem urinam nonnulli protulerunt. Alij quidem in ipsis grauidarum mulierum urinis imaginem quandam propè matulæ fundum apparere, idq; primis temporibus, et sunt minus albæ minusq; subtiles, quam mulieris non grauidæ. Quidam in lapide marmoreo aut re multū frigida, gutta urinæ mulieris grauidæ super posita, in lactis essentiam (colore non immutato) conuerti autumant.

Urinæ ex in-temperia.

Nunc de urinis quæ ex in temperie simplici indicantur. Itaq; ex quatuor qualitatibus

bus duæ sunt passiue humiditas: & siccitas: illa si excesserit, urinæ naturalem colorem in aqueum uergentem obtundit: siccitas uero minuit urinæ humorem, & contenta: splendorem uero ac fulgorem atq; colores mediocres & substantiam gignit: modo defectus nutritiue humiditatis non defuerit: hypostasis uero, etiam si secundum alia mediocris, substantia tamen crassiora cernitur. Caliditas supra modum paulo excedens, urinam subauream atq; subcroceam: sed aucta ubi fuerit, eam efficit auream atque croceam. Præterea conturbantur & crassæ urinæ ubi cruditas uincit. Et qui plusquam par est laborant & sese exercent, ijs urina subcrocea & crocea apparet, hypostasis parua & tenuis subsidet, eius etiam colorem contingit alterari, atq; interdum liquamen quoddam apparet: præsertim in ea quæ ex multum fatigatis emingitur, idq; uel à renibus uel alijs quibusdam corporis partibus aliquo pingui colliquefacto, ob caloris excessum. Eorum qui in otio & quiete uiuunt, urinæ ad albedinem tendunt, ob paucitatem calidi motionem habentis, in quibus hypostasis maior, crassior & crudior subsidet.

De urinis quæ per anni tempus, regiones, & mutationes apparent nunc dicamus. Vere igitur quantum tempus ad calidum processerit, tantundem urinarum colores à subspiceo & spiceo discedentes procedunt

Urinæ iuxta
anni partem
& ætates.

procedunt ad colorem subaureum & subcroceum: hypostasis uerò à crassiore incipit mutari in tenuem.

**Urinæ iuxta æ-
statis tempus.**

Cum æstas incipit tum urinæ apparent subaureæ & subcroceæ: substantia uerò mediocris: hypostasis tenuior mediocri apparere incipit alba, leuis, et æquabilis: procedente uero æstate & ad summum accedente, quantitas humoris minor ex proportionē spectatur. At uero ubi autumnus accessit, tum colores reuertuntur ad mediocritatem, sed fulgor & tenuitas adhuc remanent: hypostasis est obscura et adhuc parua, alba, leuis & æquabilis, procedente uerò autumno ad mediocritatem secundum omnia redit urina.

Cum autem sol fuerit circa solstitium hyemale tū quantitas urinæ ex proportionē redditur, & color in albedinem uergit: hypostasis maior: reliqua uerò mediocria. Procedente hyeme urinæ substantia est seu inæqualis, nam interdum crassa, interdum tenuis spectatur & candida: quantitas uerò humoris maior ex proportionē rei ebibitæ. At uerò contenta huius & maiora sunt & incocta. Vbi autē æquinoctium uernale adest, tum hæc dissepantur atq; diriguntur ut redeant ad mediocritatem.

**Urinæ ex intem-
perie alimento-
rum.**

Urinæ secundum regiones, temporum urinis proportionē respondent. Cibi & diætæ calidiores uel frigidiores, sicciores uel humidiores tales urinas produciunt, quales gignunt prædictæ intemperaturæ.

Eorum

Eorum qui dormiunt per passionēs seu ægritudi-
 nes & non per naturam, urina ad album colorem
 uergit, cuius substantia crassa aut tenuis est: conten-
 ta uerò plura apparent sed incocta. Qui uerò per
 naturam dormiunt, urina minus alba est, quippe quæ
 spica spectatur: cuius substantia ad mediocritatem
 dirigitur: quin etiam contenta sunt maiora & benè
 concocta. Somnus enim hominis sani & secundum
 naturam se habentis, fit ob humiditatem suauem at-
 que mediocrem caliditatem naturalem: somnus uerò
 hominis aliter affecti, fieri solet ob humiditatem mul-
 tam, præsertim pituitosam, atque ob alimenta & me-
 dicamenta frigida.

Urina dormien-
 tium.

Rursus qui uigilarunt sed non per naturam aut
 aliquam ob causam, urina circa principium minimè
 mutatur in substantia, colore & contentis: proce-
 dente uerò tempore dissipantur ac deficiunt conten-
 ta, fitq; urina ipsius liquor tenuis color uerò ad al-
 bum & aqueum uel ad aureum & croceum, oleace-
 um & nigrum iuxta causæ mutantis proprietatem
 uergit. Eorum qui multum comederunt ac bibe-
 runt urina est subtilis & alba, & interdum absque
 hypostasi, & qui media laborant urina est flammea,
 id est, aurea & crocea ac tenuis apparet, cum exiguis
 contentis. Et qui fame premuntur horum urina est
 tenuis & alba, & priuata hypostasi cum quodam
 splendore.

Urina uigilan-
 tium qualis.

lana

Urinarum con-
tenta in seni-
bus.

Urinae quae
februm initijs
malae.

In senibus iam dicti colores non ita mali, atq; in iu-
uenibus & etate uigentibus: praesertim si contenta
nulla appareant, aut parua sint, & minus mala. So-
lent enim apparere in summa cruditate & frigidita-
te atq; longa debilitate, nec non in paruis opilationi-
bus. quae si manserint, capitis difficiles pulsus, obe-
nebrationes, uertigines, morbum comitalem, cibo-
rum fastidia, caninos & rerum ad nutriendum mini-
mè conuenientium appetitus, artuum dolores, ner-
uorum motiones difficiles, renum & capitis diuersas
passiones & graues, atq; tabidam ex aegritudine ses-
nectam, ostendunt. Et qui student ipsis opitulari &
ferre suffragia, considerent aetates, temperaturas, con-
suetudines, sexus, anni tempus: & interdum anteactam
uictus rationem. Porro urinae quae remissae albae sunt,
ut lacteae, glaucae, charopae & similes, in initijs &
& incrementis febrium, sunt malae, & eo magis quo
uehementiores sunt febres. in ijs enim multitudo ma-
teriae putrescentiae augeri cognoscitur: in febrium uero
declinatione sanitatem indicant, praesertim si multi-
tudo urinarum excesserit. Idcirco considerare opor-
tet aegritudinis malignitatem, & quanto tempore ad
concoctionem indigeat ubi cruditas adest. In diabete
si neq; coloratum urinae corpus & imminutum sit, fluo-
rem urinae ad malum procedere indicat: & naturam
antea defatigatam, à morbo superari est timendum.

Lam uero

Iam uerò quid ex urinis præuidendum paucis cō-
 plectamur. Sed quia spiritus (cuius receptacula arte-
 riæ sunt) primum sentiunt & corporeis mutationi-
 bus alterantur, à pulsibus præuidentia factæ sunt fir-
 miores tum demum humores post spiritus sequuntur
 & hi cum alterati fuerint in urinis signum exhibent
 suæ alterationis. Februum indiabete itaq; magni-
 tudinem atq; uirtutis cōstantiam expulsuum attactu
 colligere licebit. Consideranda etiam excrementa, cō-
 stantiāne fuerint: item faciei color & alia de quibus
 alibi diximus, nam hoc loco de his tantum quæ ad
 urinarum inspectionem pertinent, dicere constitui. In
 febrientibus igitur eiusmodi urinas (de quibus iam su-
 mus loquuti) mingentibus sitis interdum minor erit
 quàm quæ ratione febris spectatur, atq; in mutatio-
 nibus urinarum febris solutionem, quemadmodum
 ex concoctionibus qualitates crismus prospicere o-
 portet. In hominibus autem sanis si eiusmodi urinæ
 apparuerint, mediocritatem à frigiditate offensam ar-
 guunt. Subspicea & spicea urina in febribus non
 spectatur, & si contigerit ut cum ipsis urinis febres
 adsint, hæ imbecilles ac facile solubiles uel ephemera
 esse possunt. Et si ardentiores præcesserint & huius-
 modi urinæ postea apparuerint febrem solui indi-
 cant. Urinæ subaureæ & subcroceæ mediocres cum
 sint, non possunt nisi mediocria incommoda indicare

S ueluti

ueluti assiduas rerum acutarum commessationes uel immodica exercitia, & id genus.

**Vrinæ aureæ
ac crocæ in
quib. peiores.**

Auræ & crocæ urinæ in senibus & mulieribus atq; cæteris id genus, peiores sunt quàm in iuuenibus & ætate florentibus. quia maiorem causam in illis arguunt, ueluti febrem ex bile iam crocea per totum corpus diffusa.

Vrinæ subrubæ & rubæ in adolescentibus, iuuenibus, & ætate florentibus, non multum auctant lesionem indicant, sed in senibus & ijs qui iam pridem naturalem caliditatem imminuerunt, sunt pessimæ. Plurimo siquidem tempore egent ad concoctionem, ubi non paruus metus est, ne defessa uirtute solutio passionis sit mors. At in adolescentibus & uigentibus ætate sanguineum humorem auctum esse potius indicant.

Vinei urinarum colores creduntur peiores esse subrubeis atq; rubeis, illi enim bilescente potius sanguine exoriri solent, nam cū sanguis ab aliqua causa alteratur ad mediocrem speciem bilis, tum eiusmodi colores spectantur, atq; interdum bili eo modo excedente sitis non modica exoritur, somni perturbati, siccitas oris, febris acuta, deliria, tussis cum dolore hepatis: quæ mutationibus dolorū iudicantur quàm sint mala indicia: atq; per singulas coctiones iudicamus solutionis celeritatem.

Vrinæ

Vrinae passae cum multitudine & crassitudine, corruptionem in hepate bilis ipsius accumulatae significant, ex qua arquatos maximè fieri uidemus. Quamobrem non aberrauerimus eiusmodi urinis spectatis, si auriginem homini aduenturam pronunciauerimus. Veruntamen cum non adhuc inflammata est materia (quoniam inflammatis prouenit materiae excretio) paruae quaedam & manifestae febres suboriuntur, atq; sitis perquam modica quibus accidentibus pleriq; decipiuntur.

Vrinae passae multae.

Viridium urinarum colorem, ubi de urina uiridi dictum fuit, descripsimus, qui si oleaceus fuerit, ob collicationem pinguedinis eius qui aegrotat, generatur, & febrem hecticam adesse arguit, grauioremq; affectum indicat quàm qui simpliciter uiridis exsistit, nisi paulatim retrocedat, & ad naturalem conuertatur. Quod si huiusmodi urinae & quaecunq; suapte natura male sunt, si peiores indies reddantur, praedicere decet periculum imminens, atq; cautè conuersari cum aegroto periclitanti, ne maleuoli nos in calumniam rapiant. Fit autè uiridis color in urinis ob maximam bilis adustionem, & praxeia quibusdam est nuncupata, cuius accidètia haec sunt, utpote insania, febris asidua et deficiens, uomitus atq; bilis purae excretio, uirulenta, adusta: sitis asidua, aestus, lingua sicca, hypochondria subcōtracta et similia. Vbi si uirtus

Vrinarum uiridis color unde fiat.

robusta fuerit & colores remittantur, mutanturq; ad meliores, spes est ægotantem superesse: si uerò perseuerarint & malignos esse non desistant, metus est non paruus, ne ob spasmus à siccitate & aestu, somnus profundus & malus hominem capiat. Venetæ urinæ & liuidæ atque nigræ frequentius ab humore melancholico colorem accipiunt, & interdum ob alias causas, quas antea adduximus. Huiusmodi urinæ si melancholia uel febris quartana adfuerit, uel lien tumefactus, & hoc humore repletus solutionem affectionis indicant: in alijs uerò febribus uel mediocribus & diebus non criticis, mortem minantur. Neque uincetur ægri ipsis urinis apparentibus, etiam si duo bona cum uno signo malo pugnarent.

Hactenus de præuidentijs urinarum, nunc de earum substantijs agemus. **Vrinarum substantia.** Vrinarum igitur substantiæ mediocriter crassæscientes uirtutem quodammodo confirmari ac corroborari significant. Urinæ uerò substantiæ tenues si persistant, arguunt passionum quæ corpus occupant accidentia tum manere, tum etiam fortasse increfcere. Increfcunt accidentia uirtute naturali cessante, & adeo defessa ut affligentibus humoribus aduersari non queat. Quod si immodicæ tenuitatis fiat remissio, & accidentia diminuuntur, uirtus ad se quodammodo reducta paulatim concoctionem inducet, atque in urinis id tenue appellatur, quod

quod maximè est pellucidum, & in quo uisus per omnia facillime transit. Crassæ urinae post tenues morbi declinationem in febrib. futuram ostendunt, natura enim materiam concoquere incipit, & superat. Quod si unà cum accessu febrili urinae crassæ appareant, quæ temporis progressu non desinant crassescere, neq; si desuerint attenuantur, neq; si ad meliores colores mutantur tum uirtutis infirmitatem adesse cum humorum multitudine & periculo significant.

Sed ex contentis nunc iudicia prosequamur. Ut igitur contenta alba, leuia atq; æquabilia omni tempore apparentia, sanitatem indicant: ita è diuerso tantum ab his imminuitur, quantum ab exacta sanitate recessisse poterit iudicari. Eodem modo de cæteris contentis si à suo loco descuerint, nam quæ à fundo matulae uersus supremam regionem eleuantur, spirituum copiam sursum contenta erigentem, attollentq; ostendunt, arguuntq; illa loca corporis male esse affecta, atq; contenta accidit impelli, habitatio ne humani corporis, locorum, & matulae. Quinetiam contenta eò peiores affectus enunciant, quo magis ad fundum matulae concesserint, ueluti concedunt eò contenta secundum naturam.

Contentorum pessima erunt nigra si fuerint sublimata in medio: deinde descenderint ad fundum: Contenta uerò bilea, sanguinea & rubea rationem

Tenue in urinis
quid dicatur.
Crassæ urinae
post tenues.

Urinarum con
tenta unde ele
uentur.

Contenta pessi
ma.

mediam obtinent. De hypostasi orobea, fursurea, laminea, & similacea dictum fuit, ubi de contentorum coloribus agebatur. Veruntamen si eiusmodi contenta plura & peiora processerint, naturam defecsam esse ac deficere pronunciandum: Contra uerò si pauca et ad meliora continuè uergant, salutem aegrotanti aduenire iudicabimus. Ex bullis quoque urinarum indicia quædam sumimus.

Bulle 3

Bulle igitur in urinis hominum secunda. n naturam se habentium, fieri dicuntur ex spiritibus infrigidatis, præsertim si fuerint magnæ, diffusæ, & absque ordine. In febricitantibus uerò urinarum bullæ quæ nondum uisæ fuerant, febris solutionem prope futuram significant, uigoremque præterisse, suntque ueluti obscura quædam concoctionis signa, atque nuncia contentorum materię iam coctæ. Interdum pro bullis non apparentibus adsunt crassæ spumule, non secus atque in uino nondum satis defecato solent innatare. At uerò si bullæ, cum febris adest, appa-
Bulle cum fe-
bra.
 ruerint, & processerint, dolores magnos & periculosos ostendunt, maxime si cum tenui substantia urinae ueluti corona innatarint: cum crassa substantia uero tanquam cum modestiore bullæ etiam moderatiores fiunt. Præterea bullæ quæ capitis dolorem innuunt, si breui dissoluantur, dolores quoque breui soluturos ostendunt: maiores uerò & diffusæ per
 matulam

matulam absq; ordine, dolores qui præcesserunt dissolui indicant. Quia uerò bullarum dolorem capitis significantium, aliæ per totam coronam urinae disseminantur, & capitis totius dolorem innuunt: aliæ per dimidiam tantum coronam sparguntur, quæ medietatis ipsius capitis dolorem arguunt, sed quantum dolor ille fuerit ex coloribus discendum. Colores igitur ipsius coronæ urinarum si peiores fuerint Vrinæ color quàm qui sunt substantiæ urinarum bene habentium, malos iudicabimus, et eò magis quo peiores appa-
parebunt.

Vrina male olens cum malis contentis & sub- Vrina male olens.stantijs, corruptionem & mortificationem corporis totius indicat, nisi forte pus subciderit, quod possit natura expelli. Quantitatem putrefactionis atq; qualitatem humorum arguunt, tum substantiæ urinarum tum contenta. Quinetiã si collicamina contigua urinis innatent, et arenæ ueluti apparuerint, id malum est, quia renes laesos uel corpus non absq; collicatione præ se ferunt. De urinis citra hypostasim & ipsarum causa quædam in his quæ præcesserunt, significauimus. Atq; huiusmodi urinae in sanis corporibus cruditates et opilationes ostendunt, quæ si in longum tempus protrahantur facile ab agitudine, eum qui tales excernit, corripit indicia sunt. Itaq; febrium deficientium tertianæ inquam quartanæ et amphemerinæ ab

Cordis ad ca-
lorem febrilem
alterati, urinæ,

opilatione, cruditate, & humorum multitudine ip-
sas accendentium generantur: atq; in initijs urinæ
frequentius absq; hypostasi cernuntur, ut alibi dixi-
mus. Ab his igitur sumpta coniectura præuidere po-
terimus morbi longitudinem. Oportet enim à diebus
cruditatis coniectare tarditatem ac distantiam remis-
sionis atq; ab initio concoctionis præuidere celerita-
tem crisis seu iudicij. Rursus corde, corporis hu-
mani parte præcipua, ad calidum præter naturā al-
terato, febris excitatur: & urinæ fiunt subrubeæ,
rubeæ uel uineæ. Pulmo si præter modum incaluerit,
primum aureas, deinde si creuerit calor, urinas ru-
beas, fuscas, seu uineas cum mala spiratione, siti,
linguæ siccitate & nigritia efficit. Frigiditate uero si
affectus sit pulmo ipse, respirationes primum erunt
tardiores, postea etiam pauciores & absq; siti: &
aërem quem spirant frigidum sentiunt. horum urinæ
ad albedinem sed non uehementer tendunt, nam pul-
mo membrum calidum est, quo uel parum ad frigi-
dum alterato urinas albas producit. Hepar si à ca-
lida intemperatura fuerit affectum urinas aureas &
subrubeas producit. Eius si caue partis inflammatio-
ne laborent, tum sitis adest, & uomitus sæpius exci-
tatur. Porro si hepar intemperatura mediocriter fri-
gida laboret, urinæ profluent spicæ & subspicæ:
Aucta uero si fuerit frigiditas urinæ apparebunt al-
bæ, cum

*bæ, cum quadam interdum crassitudine. Stomachi
 intemperatura calida qui laborat, id per urinas non
 facile cognoscitur, sed frigida intemperatura ipsius,
 urinas albas reddit: calidior uero aureas & croceas.
 Lateris dolores urinæ initio subrubeæ, deinde rubeæ
 & uineæ indicant. Septum transuersum à calore
 exiguo, spirandi difficultas non adest, et urinæ tenu=
 es sunt, interdum etiam conturbatæ & crassæ Simi=
 les eueniunt urinæ in renibus & uesica affectis. In
 flammato podice & hemorrhoidibus absq; ratione
 retentis, præsertim si multo tempore sanguinē pro=
 fundere soleant, et in multum sanguineis, tales erunt
 urinæ quales in retentione menstruorum. Cum
 manus aut pedes affecti fuerint, & corpus per se ali=
 as sanum sit, urinæ mediocriter alteratæ ad eam mor=
 bi naturam qua ægrotabunt. Non ignorandum ta=
 men membra calidiora facilius à causis calidis altera=
 ri & conuinci, quemadmodum frigida à frigidis. Præ=
 uidere oportet urinarum mutationes siue ad bonum,
 siue ad malum, & utrum longiore tempore fiunt, ita
 arguunt ægritudinis tempus multum protrahi. ut si
 primo die urinæ concoctæ apparuerint, tertia uel
 quarta ægritudo soluitur. Quod si secunda uel tertia
 concoctæ fuerint, ægritudinis solutionem ad septi=
 mum usq; peruenire solet. In ægritudinibus acutis
 urina quæ in morbi uehementia excernitur multo*

peior apparet, quàm quæ temporibus remissionis. Morborum seu ægitudinum motiones tardiores & moderatiores si fuerint, temporis processu ægitudinem solui iudicabimus, modo uirtus constet: si uero ipsæ motiones seu paroxysmi concitatiores & in morbis acutis nullaq; appareat concoctio, non paruus aderit metus ne defatigata uirtus propriam actionem amittat, præsertim dum in urinis, concoctio non est. quamobrem pronuntiandum periculum. Hæc de urinis, quæ quidem ut succorum qui in uasis sunt, qualitatem indicant, ita sudor aliq; per uniuersum animalis habitum apparentia, eos qui illic sunt affectus, demonstrant, quemadmodum Galenus libro 4. sanit. tuend. scriptum reliquit.

Excernuntur & sabulosa quedam per urinas, quæ uel renes uel uesticam male affectam denunciant. Plura quoq; in commentarijs quos super Hippocratis aphoristicas sententias edidi, habentur ad hoc nostrum institutum maxime conuenientia, & quibus compendiose à nobis tradita non suffecerint. Actuarium quem sum breuiter imitatus, perlegant, uel Georgium Vallam Placentinum, aut Bartholomeum Montagnanã, Gordonium & reliquos. qui de urinis, et alijs eiectionibus in commune, aliquid ediderunt. Iam uero sequentib. schematis summatim ad memoriam complectamur, quæ præcesserunt.

Urina

Colore	Albo sub quo com- prehen- duatur.	Crystallinus,	Niveus.
		Aqueus,	Lacteus.
		Glaucus,	Charopus.
		Sub palidus,	Subspiceus.
		Palidus,	Spiceus.
	Aureo feu rufo unde.	Subflavus.	
		Subcroceus.	
	FLAuro post quē	Subrubeus, bolo armeno seu le- nij sigillo similis.	
		Vineus, uino nigro aut he patis co- lori similis.	
	Rubeo et puniceo cui succe- dunt.	Passeus, uinum coctum aut cerasi fructum ad nigredinem perdu- ctum referens.	
Venetus, ex puro albo & nigro æqualiter confusus.			
Viridis, smaragdi lapidis colorem representans.			
Oleacus, ex olei similitudine dictus.			
Liuidus, plumbi similitudinem ha- bens.			
Nigro quem se- quitur.	Imperfectam cōcoctionem simplicē quamlibet in- temperaturam caloris natiui imbecillitatem.		
	Tenuis.	Cruditatem Iecoris & re- num obstructionem.	
		Indi- cat.	

Consisten-
tia.

Indi-
cat.

VRINA
cognos-
citur.

Consisten-
tia.

*

*

Crassa et
turbulen
ta.

Humorem crudum & frigidum,
Item, Excessum materiae seu hu
morū in uentriculo, intestinis,
iecoris parte caua.

Mediocris hæc optima est, ut quæ nullum pa
tiatur excessum.

Plurima
ut

Ex multis cibis humidioribus &
largiori potu.

Medicamentis urinam prouocan
tibus.

Intemperie calida circa renes, ut in
diabete.

Alui siccitate.

Hydrope, præsertim anasarca.

Retentione reliquarum uacuatio
num.

Quantita
te :

A siccitate ciborū, & potus pauci
tate.

Vehementi exercitio.

Humorum, alimentorum, pharma
corum, crassitie, uiscositate, len
tore & tenacitate.

Pauca ut

Copiosa uentris deiectione.

Febris uehementia.

Expultricis renum facultatis im
becillitate.

Conten

* Cōtentis	ὕψος αἰσῖς, quæ in fundo matulæ.	Tenuia.	Multa.
	ἐν αἰώρημα, æquis spacijs in medio altitudinis consistit.		
	νεφέλη, in summa urinae superficie natat.	Craffa.	Pauca.
		Media.	Inter utranque media.

Præter iam dicta adsunt colores uarij, utpote albi, nigri, uirides, et qui sub ipsis sunt. Similiter & circulus ille superficiarius, quem coronam appellant, in cuius ambitu spuma, uesiculæ seu bullæ apparent, quarum significationes antea diximus, adhæc pus pinguedo quædam, & interdum uermiculi, ex intensa putrefactione. Nunc concoctionis & cruditatis signa breui schemate ostendamus.

Cocta.	Colore	Subruffo.	} Infundo apparens.
		Subflauo.	
	Consistentia mediocri.		
	Conten- to.	Albo.	
		Leui.	
		Aequali.	
	Odore non ingrato.		
	Excretionem tempestiua.		

Vrin.

Vrina

Vrina appa = ret uel	Cruda tantū.	Colore	Albo.		In urina me dio.
			Palido.		
			Flauo.		
			Subrubeo.		
		Consi = stentia.	Tenuiore.		
			Crassiore.		
		Cōten = to.	Subalbo.		
			Palido.		
			Et aliquantum in = equali.		
			Odore non admodum foetido.		
	Excretionem intempestiuā.				
	Cruda et ma = ligna si mul.	Colore	Viridi.		In superiore parte.
			Liuido.		
			Nigro.		
			Tenuissima.		
		Consi = stentia.	Crassissima.		
			Oleoginosa.		
		Conten = to.	Viridi.		
			Liuido.		
			Nigro.		
			Multum in = equali.		
	Odore prorsus foetido.				
	Excretionem omnino intempestiuā.				

Hec de urinis et earum cognitione. multa etiam in commentarijs,
quos scripsi super Hippocratis aphorismos adduxi.

DE SVDORE. CAP. III.

SVDOR tenuissimum est excrementum, quod partim ab insito calore partim uiolento motu erumpit. Huiusmodi excrementum ex alimento membrorum abundat, & succorum qui toto corpore insunt qualitatem prodit, nō secus atq; urina eorum duntaxat qui in uasis continentur. Sudorum differentias Hippocrates in sequentem modum proposuit. Sudores inquit optimi sunt in omnibus acutis morbis, quando in diebus decretorijs fiunt, & integre febrem soluant. Boni uero quicunq; ex toto corpore procedentes fecerunt ut homo facilius morbum ferat: si uerò nihil horum præstiterint inutiles sunt. Pessimè uerò sunt frigidi & circa caput, uultum, & ceruicem tantum: hi enim cum acuta febre mortem prænunciant, cum leuiore uerò morbi diuturnitatem. Ex his distinguere sudores etiam docet, ut si in die decretorio seu critico fiant & integre morbum soluant, erumpantq; è mole corporis uniuersa, optimè erunt. Præterea sudor qualitates humorum in corpore peccantium prodit, idq; dignoscitur cū quid ex sudore in os sponte defluit, percepto uidelicet sapore. atq; ipsum qui egrotat sudorem suum gustu attingere interdum iubemus, quo certius internoscatur. At foetidus & male olens sudor humorum in corpore corruptorum arguit. Siue igitur criticus fuerit sudor
siue

Progn. xxxij
lib. i.

Aph. LXXI.
libro VI.

siue symptomaticus humiditatē superfluam euacuat. Sed in his qui secundū naturā se habent, si copiosi defluant sudores alimentorum præsertim humidorum, abundantiam uel humorum repletionem arguunt. Illis uiuendum parcius: istis purgatio conueniet. At uero sudores qui per morbos exeunt nunquam cohibendi, nisi excessum habeant, quos Græci δ'αἵμα φογῆτικός appellarunt. Et quibus arida & dura cutis obtenditur absq; sudore morituros docet Hippocrates: contra uero quibus laxa & rara, cum sudore multo uel paucio iuxta corporis raritatem, excrementorum tenuitatem & abundantiam necnon facultatis retentricis imbecillitatem. Adhæc sudores in morbis frigidi calidis deteriores: inde colligitur quod illi ob materiam copiosam & crassam diuturnos ac solutu difficiles morbos significant: Contra uero calidi, qui ad exitum facilem habent materiam: unde citius ac facilius affectus curatur. Plura in nostris commentarijs Aphorismorum secundum Hippocratem quæ hoc loco repetere non licet, nedum plurima quæ apud authores sparsim habentur, ut qui artem medicam compendiose instituam. Tandem sudores optimos, bonos, pessimos, malos & nihil promouentes hoc sequenti schemate cognoscemus.

Sudor

Sudor.	Calidus.	Ex toto corpore.	Integre morbum soluens, optimus.	
			Morbum imminuens, bonus.	
	Frigidus.	Ex parte corporis.	Faciliorem.	Morbū Bonus.
			Difficiliorem.	reddens. Malus.
			Ex toto corpore pessimus.	
			Ex capite, collo, ceruice, malus.	

Inutilis sudor is dicitur qui neutrum horum facit, utpote qui non exit à toto corpore neq; morbum imminuit. Exire à toto corpore expultricis facultatis robur ostendit, ut in febribus: exire uero à parte aliqua tantum, eius imbecillitatem demonstrat. Vnde Hippocrates. Qua parte corporis sudor, ibi morbus.

Aph.
XXXVIII.
lib. III.

DE EGESTIONIBVS. CAP. IIII.

ALVI deiectiones bonæ optimæq; sunt molles & coherentes, subruffæ nec admodum graue olentes, & eo tempore quo secunda ualetudine consueuerunt, redditæ: atq; proportioni cibi ingestæ respondentes: malæ uerò & præter naturam duræ, diuulsæ, aqueæ liquidæ, albæ, ruffæ aut flauæ, crocæ, spumosæ, uirides, æruginosæ, nigrae, liuidæ: quæ tanto peiores, quanto ab his qui secundum naturam excernuntur distare apparent.

T Mollis

Lib. i. de Cri-
lib. Cap. xj. &
in Com. prog.
Xij. lib. ij.

Mollis & constans siue coniuncta deiection, ualde
dam concoquendi uim ac digestionem optimè fieri
ostendit. Coloris non meminit Hippocrates, sicuti
etiam Galenus testatur. Et quæ præter modum sœ-
tide sunt putrefactionem & humorum corruptio-
nem indicant. Cum enim consueto tempore ege-
runtur uim expultricem ac propulsoriam bene uale-
re ostendunt: Contra uerò si consuetam horam anti-
cipauerint facultatis retentricis imbecillitatem, si
tardius, coëctricis arguunt. Celeris interea deiectionis,
ciborū inseparabilia symptomata sunt excrementorū
humiditas, alimentiq; per corpus imminuta digestio.
Præterea deiectiones cibi ingesti proportioni respon-
dentes nullam causam habent superfluitatum in in-
testinis. Neq; præter naturam statim erunt, si aliquan-
tum citerius natura atque consueuerit exoneretur.
Subruffum colorē naturales deiectiones suscipiunt,
ob modicam bilis portionē, quæ ex icore in utrumq;
uentrem decumbit: E diuerso præter naturam deie-
ctiones erunt, si bilis sincera aut multa in has partes
defluxerit, unde ruffa aut flaua redderentur. quod si
nulla bilis permeet ad intestina, ut in morbo regio,
candidæ erunt feces. Duras & asperas à liquidis &
aqueis separantur, quæ tum æquales hoc est, molles
& coherentes non sint, malas ac præter naturam es-
se iudicamus. Nam ut aquosæ cruditatis indicium præ-
se ferunt, ita præter modum indurate aduersionem,

humiditatisq; absorptionem. Aquosa admodum aut candida aut multū crocea aut spumās omnis deiectio, mala ab Hippocrate censetur. similiter si exigua, glutinosa, cādida, et quæ pinguedine absorpta ab igneo calore etiā non multum maligno, mala est: ueluti subcrocea. Spumosa deiectio spiritū flatuosum tenui cuti piā humori permistū: quandoq; caloris copiā indicat. Virides et æruginosæ excretiões, bilis æruginosæ sunt indicū: sed exitiosior adhuc est nigra et liuida, optima atq; foetida. Nigra siquidē deiectio ab atra bile sintera tingitur. Si autē liuidū quoddam in excremento apparuerit, ubi non fuerit tale aliquid intus assumptum, partium internarū frigus ingens ac ueluti mortificationē indicat. Quod si pingue aut uiscosum, ubi non fuerit tale aliquid assumptum, pinguis colliquationis quæ ab ignito fit calore, est præsagium. Interea pingue quod est in excrementis ex pinguedine fit liquesfacta: uiscosum uerò ex solidis animalis partibus contabescentibus, ob id multo grauius quàm quod à pinguedine fit. Quod autem uehementer foetet, si ex cibo non acciderit, uehementem putrefactionē ostendit. Corruptelam cibi necessario sequitur foetor, non necessario mordicatio et inflatio sicuti Gal. lib. 1. de sympt. causis indicauit. Versicolores deiectiones diuturniores sunt et exitiales, quæ quidē multas affectiones indicāt et multo tempore egent ad concoctionē.

nam simplex affectus facilius concoquitur & minus est quam multiformis periculosus. Si flatus absq; sonitu & crepitu excernatur melior est quam cum sonitu, pessimus tamen si retineatur ac reuoluatur. Nam retentus, hominem dolere aut delirium pati (si non sponte laxetur) significat, retentus uero spiritus flatuosi copiam aut angustiam orificiorum seu meatuum. Non negligenda erit ciborum ingestorum tum quantitas tum qualitas, ueluti si multa, pauca, pinguis, uiscosa, & huiusmodi. Nam tales interdum fiunt egestionis qualis fuerit ciborum natura. Interdum etiā intestina ob imbecillitatem defluuium patiuntur uel ex uermibus aliaue occasione. Atq; melius est si natura pariter cū cæteris excrementis deorsum lumbricos ac teretes expellat, quam si sursum ferantur.

Alui de- iectio.	{	Bona.	{	Mollis, Compacta. (reddita.
			{	Tempore quo per ualeitudinem
			{	Pro ratione cibi ingesti.
			{	Colore subruffa.
	{	Mala.	{	Dura & aspera.
			{	Diuisa seu liquida.
			{	Tempore non consueto reddita.
			{	Pinguis, Viscida.
			{	Fœtida, Flatuosa.
			{	Spumosa, Varia.

Colore: Ruffa, Viridis, Nigra, Liuida.

De

DE SPVTIS ET SVPPVRATIO=
NIBVS. CAP. V.

SPVTA seu excreationes in thoracis & pulmonum passionibus potissimum considerantur, in quibus dum nihil expuitur, morbi incipientis atq; summæ cruditatis est nota. Deinde augmentū sequitur posteducta humida quædam exquisitè cruda, subobscura adhuc & incompacta, quæ finem primæ morbi partis, principium dictæ, indicat. Postea concocta quædam sed pauca educuntur & expuuntur: mox plura & ad educationem faciliora, et tunc morbi incrementum instat. Demum concocta, plurima etiam faciliè excreantur, quo tempore ad uigorem seu statum peruenisse morbum cognoscitur. Postremo absolute cocta sine ulla molestia excreantur, sed pauciora & absque dolore, spirandi difficultate: & tunc manifesta morbi declinatio percipitur. In thoracis igitur seu costarum ac pulmonum doloribus, primum sputa, deinde urinas inspicimus. Atq; in principio morbi dictarum partium optimum erit, si sputum celeriter, facile, absq; dolore & uirium deiectione, non syncerum, sed cui admixtum sit flauum, educatur. Mitiora sunt sputa sanguinea: glutinosa uerò & crassa difficulter excurrunt, longiorique tempore afficiunt. Spumosa

fluxionem pituitosam aëreae substantiae mixtam indicant, ex his enim qualibet spuma consistit. Sin ipsa materia admodum tenuis et aquosa fuerit, uix educi potest, ut quæ circiter pulmones circumfluat. Itaque incrassanda modicè, ut facilius expecteretur. atque in omnibus morbis pulmonum defluxio et sternutamentum, siue præcesserint siue superuenerint ac sequantur, huiusmodi malæ affectiones, periculum portendunt. Præuenientes quidem pulmones malis humoribus replent: sequentes uerò morboşi pulmonis affectus seu causa potius existunt, et capitis affectionem arguunt. Iam uerò quæ bona, quæ uero mala sputa habeantur, quæque securitatem et auxilium prænuncient, aut contra, exponamus.

Sputum igitur cruentum cui paululum sanguinis admixtum est, in morbi principio pulmone inflammato periculum abesse, minimeque timendum indicio est. Veruntamen si ad septimum usque diem longioriue temporis spacio tale appareat, non est adeo tutum: uitiosum etiam rufum et quodcunque cum tussi multa nec adeo commixtum expuitur, sicuti cruentum syncerum.

Album, uiscidum et rotundum sputum, inutile est, pituitam enim assatam significat. Viride et spumosum mali morbi sunt indicia. Interea omnis humor (excepto sanguine) malam indicat affectionem. Si syncerus fuerit ueluti flauus, cui serosus hu-

mor adassatus adueniens, croceus apparet, & rubiginosus ubi is uehementer assatur. Nigrum sputum apparet quoties humor rubiginosus uehementer assatus est, uel ubi crassus sanguis similiter exiccatur: aut refrigeratione inmodica & natiui caloris extinctione, atq; huiusmodi colores crudi sunt & suapte natura mali: subflaua uerò sputa atq; subruffa, leuiter spumantia, tenuia, solam cruditatē: malum uerò nullum insigne denunciant: sed flaua sincere, ruffa, uiridia, spumosa, uiscida, rotunda, & adhuc magis nigra, mala sunt: sicuti omnia quæ dolorem non mitigant.

DE SUPPURATIONE.

DOLORes in iam dictis partibus nempe circa thoracem & pulmonem quos neq; sputi purgatio neq; soluta aluus neq; sanguinis missio, neq; medicamentum, neq; uictus ratio, sedare potuit, scire licet eos ad suppurationē peruenire. Hec enim uia est media inter breui solubilem affectum, & incurabilem quem superaturum expectamus. Suppuratio erumpens sputo adhuc bilioso apparente, siue bilis seorsum, siue una cū pure expuatur, admodum perniciosa est: præsertim si à die morbi septimo pus ab eiusmodi sputo procedere inceperit, Timendum namq; est ei qui sic expuit, ne decimoquarto die moriatur: nisi aliquod salutiferum indicium interueniat.

Mala suppuratio (sputo bilioso adhuc apparen-
te) cum pure: peior sine pure: pessima si in præci-
pua sede fatiget. Subijciamus (inquit Galenus) ægrum
excreare purulenta septima die, ubi biliosum ali-
quid, aut illud solummodo sine materia purulenta,
atq; in eo esse alia omnia media ab ætate, natura,
tempore, terra ac propterea facultate: ita ut nec fa-
cultas uehementissima neq; debilissima habeatur,
præterea temperamentum ægri nec optimè constans
sit, nec deterrimè, sicuti tempus, regionem, uictus
rationem, ætatem ipsius ægrotantis. Simili ratione
in unoquoq; signorum genere quæ media sunt ægro
inesse subijciantur: ipsum sperabimus quartodeci-
mo die moriturum, quo die medius mortis impetus
censeatur. Accedentibus uerò bonis indicijs, ultra
hoc tempus processurum mortis aduentum: ma-
lis uerò citius: si quod autem primi ordinis ac-
cesserit indicium, quinto aut septimo die è uiuis
discedet, & nequaquam ad undecimum diem po-
terit deuenire, idq; magis quo plura erunt talia in-
dicia. Nec aliter ad sanitatem bona signa quàm ad
mortem mala se habent. Permistis uerò inter se signis
exitiosis & salubribus, ex his quæ superabunt erit
iudicandum. Item si senex, debilis, tempore, lo-
co, uictus ratione consideratis decumbat, citius
mortis aduentum (indicatione ex uiribus non ne-
glecta)

glecta) expectabimus, quæ maximè expulsi digno-
 scuntur. Bonæ spei signa sunt, si æger bene susti-
 neat morbum, facile spiret, imminuatur dolor, citra
 difficultatem excreet, non sit immensa sitis, sitq;
 æqualiter corpus molle & calidum. Adhæc si urina,
 alui excrementa, somnus, sudores, mali nihil præ se
 ferant: contra uerò si intolerabilis morbus fuerit, &
 halitus magnus & frequens, nec mitigatus dolor
 uixq; sputum haberi queat, sitis uehementer cruciet,
 febris inæqualiter corpus afficiat, uenter & latera
 uehementer caleant, fronte, manibus & pedibus fri-
 gore affectis, atq; urina & alui excrementa, somni,
 sudores, quicquid horum iam dicto sputo superue-
 nerit periculum adesse atq; nono aut undecimo die
 ægrum moriturum significat, nec undecimum quar-
 tum posse attingere. Ex his igitur signa tum bona
 tum mala perpendere licet, & futura prædicere.
 Si cui conualescendum, inquit Galenus, omnia bona
 indicia adsint necesse est: si uerò moriendum unum
 malum sufficere poterit, solummodo enim iudicatur
 citius uel tardius ægrum moriturum, quo plura pau-
 cioraue bona uel mala indicia constiterint.

Reliquæ autem uomicæ ex magna parte rum-
 puntur, sed quædam uigesimo die, aliæ trigesimo,
 aliæ quadragesimo, nonnullæ ad sexagesimum usq;
 perueniunt. Obscurum est inquit Galenus de

T 5 quibus

Signa bonæ
 spei.

quibus hoc sensu Hippocrates dicat. fortasse de ijs quæ in alijs partibus præter thoracem & pulmonem uomica patiantur : fieri etiam potest ut de ijs agat, sed non similiter affectis, possunt enim differre inter se temporis spacio, uel loci affecti nociuæ humoris natura. Sedes enim calidior ac sicci-
 cior citius suppuratur : frigidior uerò ac glutinosior tardius. & sic de humorib; intelligendum.

Itaque suppurationis initium obseruare conuenit ab eo die quo primum quis aut febricitauit, aut inhorruit, aut pro dolore grauitatem et pondus illius par-
 tis sensit quam antea dolor afficiebat, nam talia in suppurationum principio accidere solent. Ab hoc igitur tempore usque ad iam definita spacia, uomica-
 rum eruptiones expectandæ.

Tria igitur indicia numero sunt eorum quæ dixit, pondus, rigor, & febris, quæ multo quam antea uehementius affligat. An uerò si alteram duntaxat partem uomica occupet, ex sequentibus notis licebit intelligere, ueluti si alterum latus dolore cruciatur alteroq; calidius sit, si in partem sanam aliquis decubuit interrogatus, onerari eam ueluti ex pondere aliquo respondeat, quibus cognitis in eo latere suppurationem esse conijciemus, cui grauitas incumbit.

In pulmonia, quoties ad suppurationem uerti-

tur, in utraque parte potius quam in altera colligitur pus.

In pleuritide suppuratio potius in altera quam utraque parte, quia materia alterius partis transmeare in alteram non potest, propter membranulam quæ thoracem intercipit. Suppuratos omnes deprehendemus ex his quæ sequuntur, nempe si febris non dimittit, & interdum leuior sit, increfcatq; noctu: si multus sudor oriatur, tussiendo adsit cupiditas, sed nihil penè excreetur: concaui fiant oculi, & male rubentes: unguis in manibus curuentur, digiti & maxime summi caleant, pedes tumeant, adsint ciborum fastidia & pustula toto corpore nascantur.

Hæ sunt diuturnarum uomicarum notæ: quæ uerò breuiori tempore cessant principio solent apparere & spiritus maiore cum difficultate trahitur.

Ceterum purulenti dicuntur quicumque intus in corpore pus obtinent, sed potissimum qui in thorace à pulmone, quod nisi cito educatur, tabidi intereunt febricitantes: sicuti accidit omnibus hectica febri laborantibus. Illis sudores eliciuntur continui, propter uirium debilitatem, tussunt sed nihil expuant quod ad sanitatem recuperandam sufficiat, unde purulenti euadunt. Cur autem nihil expuant una causarum est puris ipsius lentor & crassities: altera

altera membrana pulmonem continentis densitas: tertia debilis & inualida agrotantis facultas. Oculi concavi redduntur etiam in omnibus productis febribus, sed potissimum in his quæ perspicue siccant, genæ rubent propter tussim & pulmonis inflammationem: ungues incuruantur quia firmans eos utrinque caro consumitur. Digiti quanquam in morbis diuturnis sæpius refrigerentur, tamen per omnes hecticas febres calidi permanent non in partibus exterioribus, sed interioribus: ubi caro magis abundat. Procedente tempore pedes eorum intumescunt totius corporis extinctione ab extremis partibus incipiente, ut quæ à corde, caloris fonte, longissimè absint: cibum fastidiunt, appetendi scilicet facultate cum alijs extincta: pustulae quædam erumpunt, idque errodente sanie in corpore collecta. Celeriolem tardiolemue eruptionem conijciemus, si ab initio tussis fuerit & spiritus difficultas, atque sputi excreatio, tunc enim uomica intra vigesimum diem erumpet: si uerò non adeo uehemens fuerit dolor cæteraquæ illi ex proportionem respondeant tardius ruptura sequetur. Si igitur dolor spirandi difficultas, tussis & excreatio continenter & uehementer infestent, celeriolem eruptionem ostendunt: si uerò non continenter nec uehementer
afflis

affligant, diuturniorē. Extra periculum sunt, quibus eodem die quo eruptio facta est, febris conquieuit, de-
sueruntq; urgere cibi fastidium & sitis, alius exigua
quædam & figurata reddit, pus album, leue simplici
colore & sine pituita: atq; sine dolore leuis est tussi-
cula, quæ nonnihil semper eijcitur. Hæ sunt notæ
perquam salubres, quibus celeriter hominem à mor-
bo liberari colligimus. Contra uerò periculum est dñ
non quiescit febris aut post quietem repetit, si adest
sitis & cibi fastidium, si uenter est liquidus, si pus li-
uidum aut palidum, si nihil nisi spumantem pituitam
æger excreet, itaq; seruari non possunt quibus hæc
omnia contingunt, quibus uerò non omnia, alij qui-
dē moriuntur, alij uerò post longa temporum inter-
ualla sani euadunt.

Sputū aliud.	Coctū.	Abso- lutè.	{ Album, Leue, Ae- quale. Et quæ sine molestia excreatur: ut Cras- sa, Glutinosa.
		Imper- fecte.	{ Subflauū, Subruffū. Et quod difficilime expuitur: ut Tenuia Aquosa.
	Crudū.	{ Tenue, Aquosum. Exquisite coleratum, ad conco- ctionem et expulsionē ineptū.	

PER quā utilis est uomitus qui bilem pituita mixtam habet, si neque crassitie neque multitudine admodum excedat, nam uomitus syncerae pituitae bilisue, periculosus est. Hippocrates nulum humorem syncerum uult apparere, sed eos inter se quodammodo permisceri. Biliosus enim syncerus (cui permistus opponitur) caloris copiam: pituitosus uero frigiditatis excessum indicat. Quinetiam syncerus humor pituitosus redditur, cum propter frigiditatem quasi concretus apparet. At biliosus humor propter exuperantiam caloris tanquam assatus est, sed calidum euaporat. Viridis aut liuidus aut niger uomitus, horum quilibet periculosus est. Quid autem huiusmodi colores portendant, in praecedentibus, ubi de urinis sermonem fecimus, satis dictum fuit. Tales igitur colores ac reliqui praeter naturam exitiales sunt, indicant enim multas ac difficiles in corpore contineri affectiones. Ad ultimum peruentum esse uomitum liuidum creditur, praecipue si malus odor in hoc sit: putredinem enim cum extinctione indicat: atque foetores in uomitu malos esse, in prognosticis Hippocrates testatum reliquit.

Vomitus

Vomit. tus.	Vtilis.	Biliosus.	{	Nō syn	{	Edu= ctus.
		Pituitosus.		cerè.		
	Inutilis	Sanguineus.	{	Syn=		
		Biliosus.		cerè.		
		Pituitosus.				
		Atrabilarius.				

Causas ex quibus uomitus excitetur in commentarijs nostris Aphorismorum adduximus, ueluti ex cibi quantitate, aut mala quantitate facultatis concoctricis imbecillitate. Et materia quæ peccat non in substantia uentriculi, in qua singultus, sed in eius capacitate continetur.

DE PULSV. CAP. VII.

PULSVS est actio propria cordis primò, deinde arteriarum quæ distentione & contractione à facultate uitali mouetur. Corporibus quidem pulsus inest, ad conseruandam temperiem caloris natiui, & spiritus animalis qui est in cerebro generatione, atq; motus ex distentione et cōtractione δ'ις σολήν & σvsολήν Græci dicunt, cordi et arterijs duntaxat est proprius. Causæ pulsuū effectrices sunt tres numero, prima est facultas cordi insita, uitalē nominant: reliquæ duæ instrumētales sunt, utpote cor et arteriæ, ijs distentionē et contractionē facultas uitalis efficit.

efficit. quæ licet arterijs ingenita non sit, à corde ta-
 men in ipsarum tunicas promanat. Finalis causa na-
 turalis est calor, quem Diastole refrigerat & reficit
 & præterea spiritus generat: Systole uero tantum
 fuliginosa recrementa expurgat. Adhæc pulsus uel
Pulsus duplex. simplices sunt uel compositi. Simplicium species
 quantitate & qualitate metiuntur: Quantitate ut
 magnus, mediocris, paruus: Qualitate uero quadru-
 pliciter, aut enim secundum motum, unde celer, me-
 diocris, tardus: aut secundum uirtutem, & inde ue-
 hemens, mediocris, debilis: uel iuxta qualitatem ar-
 teriarum, ex quibus mollis, mediocris, durus. Harum
 omnium differentiarum pulsus compositi etiam di-
 centur, ad simplices relati: & simplices ad compositi-
 tos: ut pulsus magnus simplex erit per se, & ratione
 compositorum ut dixi: compositus uero quatenus ex
 longo, lato, alto constituitur, sic paruus pulsus ex
 breui, angusto, humili constitutus, compositi appella-
 tionem sortietur. & sic de alijs in suo genere. Varia
 enim est ac diuersa compositorum pulsuum connexio
 iuxta diuersas simplicium complicationes. Et
 qui iudicare uel prædicere ægritudinum accidentia
 cupiet, is pulsuum differentias, postea urinarum te-
 neat esse necesse. Similiter egesta, respirationes, faci-
 em, corporis decubitum atq; sermonem consideret.
 Pulsus enim primum uim caliditatis aut frigiditatis:
 in spiri-

in spiritibus indicant: urine demonstrant quantitate
 & qualitatem humorum: egesta uentris concoctio-
 nes & cruditates ostendunt: oratio testatur actionem
 virtutis rationalis: qualitates insuper decubitus toti-
 us corporis ac faciei affectus ut Hippocrates & Ga-
 lenus indicarunt. Pulsus interea obscurum sentitur in
 carnosus corporibus: Clarius uero ac manifestius in
 emaciatis, qui carne non admodum multa teguntur.
 Arterie etiam quæ in temporibus et in carpi parte in-
 terna, atq; tarsis pedum perpetuo motu sensili sunt
 præditæ, sic quæ post aures & in parte brachij inte-
 riore ac nonnullæ aliæ sed obscurius, præsertim quæ
 pleniori carne operiuntur. Verum quæ in carpi,
 commodè deprehenduntur: ut quæ secundum recti-
 tudinem sint locatæ, et locus carne sit denudatus. Sed
 nunc de quantitate dilatationis. Tangenti itaq; arte-
 riam inquit Galenus, sentietur in omnem dimensionē
 dilatari. Dimensiones autem corporum omnium tres
 sunt numero, utpote in longum, latum, & profundū.
 At cum animans secundum naturam se habet, quæ-
 vis arteria in eo admodum moderatè dilatatur: cum
 autem præter naturam habet, interdum secundum
 quamlibet dimensionē partim minuitur pulsus, par-
 tim exasperat: ob id memoria tenere oportet pulsum,
 qui prius naturalis erat, ut si is qui præter naturam
 auctus latitudine sentiatur, latum: si in longitudine,

pulsus quid
 primo indicent

Corporum di-
 mensionēs tres

V longum

Pulsuum mo-
tus qualitates.

Aequalitas at-
que inæquali-
tas pulsuum.

longum: sin profunditate, altum appellemus. Ad pro-
portionem & ijs contrarios (qui uidelicet naturalib.
sunt minores) angustum, breuē, atq; humilem uoca-
bimus. Iam uerò de motus qualitate seu differentijs,
quæ quidē in percussione pulsuum quatuor reperiun-
tur, uidelicet celeritas, tarditas, mollities, durities. Ce-
leritas motus est quidā concitatus: tarditas uerò exo-
lutus, interdum pulsus est uehemens, interdū langui-
dus, ille contactus uiolenter pellit: hic inualide. Cete-
rum mollities & durities tunicæ ipsius arteriæ sunt
qualitates, ex hac, arteria carnosior sentitur, et ex illa
siccior. Nunc de tempore quietis dicendum. Quinta
differentia est in intermissione, quæ inter percussiones
intercedit, cū scilicet arteria dilatatur ac contrahitur.
Est enim percussio cū arteriæ motus tactui nostro oc-
currit: Intermissio autē quando inter duas percussio-
nes intercedit ac remoratur, unde frequens, rarus uel
inter utrumq; medius pulsus indicatur. Frequēs pul-
sus dicitur cū quietis tempus breue fuerit: rarus cum
diuturnū. De æqualitate & inæqualitate nunc sermo
quàm breuissime instituatur. Aequalitas igitur atq; in-
æqualitas in omnib. pulsuum differentijs inueniuntur.
Illa cū uno tenore eodemq; ordine motuum fit conse-
cutio, in magnitudine, celeritate, uehemētia, frequen-
tia. Inæqualitas uerò fit quando alius in magnitudine
est inæqualis, alius in celeritate, alius in uehementia,
languo-

languore, frequentia. similiq; modo in alijs. De pul-
 su ordinato & inordinato dicere nunc ordo exigit.
 Pulsibus idcirco æqualibus nonnunq; inæqualis in-
 tercidit, idq; multis modis. nam tres æquales quartus
 inæqualis subsequitur: aut quatuor, quintus. simili
 modo & in omni alio numero, nam quinque æquales,
 sextus inæqualis plerumque excipit: ac rursus sex
 æquales, septimus inæqualis: in quibus certe omnibus
 æqualitas non seruetur, ob eam causam pulsus fit in-
 æqualis. Series tamen certa seruatur, uocaturque ob
 id pulsus ordinatus. Accidit enim perpetuo post
 parem pulsum æqualium numerum, unus inæqua-
 lis, qui tametsi æqualitatem deprauet, in singulis ta-
 men periodis seriem quandam retinet: si uero nulla
 seruetur periodus, pulsus eiusmodi inordinatus uo-
 cabitur. Nunc de inæqualitate in pulsu. Accidit
 in uno pulsu inæqualitas, tum partibus arteriæ situ
 ac motu inter se dissidentibus, tum cuiusque pulsus
 motu sibiipsi non consentiente. Inæqualitas igitur
 in partium situ accidit, cum arteria ipsa sursum
 aut deorsum, antorsum aut retrorsum, dextrorsum
 aut sinistrorsum traducta esse uidebitur. In mo-
 tu autem cum arteriæ uelocius aut tardius, tempe-
 stiuius aut serius, uehementius uel languidius, tem-
 pore diuturniore aut breuiore, assidue aut nihil pe-
 nitus moueantur. In singulis partibus est in-
 V 2 æqualitas,

Pulsuum in-
æqualitates
compositæ.

æqualitas, cū pulsus perspicuè est intercisus, è quorū numero est $\delta\iota\omicron\gamma\alpha\lambda\acute{\iota}\zeta\omega\varsigma$, id est, caprarum more saltitans. Item cum repetit, ex quibus etiam est pulsus $\delta\iota\acute{\iota}\gamma\omicron\tau\omicron\varsigma$, id est, bis pulsans. Adhæc cum motus celeritatem eandem non seruat, ut cum principio celerior in fine tardior: aut contra. Idē esto in uehementia & languore, magnitudine ac paruitate indicium. Non enim in duo duntaxat tempora motus distribuitur, sed in plura quod sensu distinguere possumus. Hæ simplices atq; in uno pulsu sunt inæqualitates. Nunc de pulsuum inæqualitate composita. Compositæ igitur fuerint inæqualitates, quatenus licuerit alteram alteri ac singulas singulis, aut unam pluribus, aut plures pluribus commisceri. quarum nonnullæ propriam appellationem sunt adeptæ. Quemadmodum pulsus uermicans qui fit uiribus iam dissolutis, sed aliquantum adhuc resistentibus: & formicans qui fit ob maximam alimentum inopiam, ut in hecticis.

Vermicans quidem cum arteria uelut reptantem uermem atq; fluctus instar subsilientem nobis representat, non autem tota ipsa uno tempore dilatatur. Quod si cum exigua dilatatione id accadat, uermicans: sin cum magna fluctuosus simpliciter appellatur. Perspicuum autem est quod uermicans quoque languidus est ac frequens: Et qui languidus summe fuerit frequens ac paruus, is formicans dicitur: qui
tamen si

tametsi celeritatem præ se ferat, non tamen est reuera celer. Hecticus, ueluti febris, ita pulsus nuncupatur, quod nihil magnopere immutetur, sed perpetuo sui similis, coherens, ac nunquam solutus permaneat: utpote toto corporis habitu in febribus eiusmodi ac pulsibus in statum morbosum commutato. Hæc de pulsum differentia summam dicta sufficiant, nisi quis ἀνακεφαλαίωσις in sequentem modum cupiat. Pulsus magnus fit cum arteria multum in longum, latum & profundum diducitur. Longus cum in longitudinem duntaxat. Latus cum in latitudinem. Altus cum in profunditatem. Pulsus uehemens ualide tactum percutit: mollis in quo arteriæ tunica blanda ac tenera existit: celer cum arteria in pauco tempore dilatatur. Frequens cum pauco interposito repetit: Aequalis qui serie continua sibi est æqualis. Ordinatus qui in singulis periodis est æqualis. At qui in una tantum percussione est inæqualis, simplex inæqualis dicitur seu in una percussione. Horum pulsum qualitatibus contrarij sunt, paruus, breuis, angustus, humilis, languidus, durus, tardus, rarus, inæqualis, inordinatus. Sed nunc de causis quæ pulsum immutant. Triplex est igitur mutationis pulsum differentia (mutantur enim à qualibet causa) prima mutatio est naturalis, secunda non naturalis, non tamen iam præter naturam: tertia præter naturam.

Pulsum triplex mutatio.

Viri in uniuersum mulieribus pulsum habent multò maiorem, uehementiorem, rariorem, paulo tardiozem. Qui natura sunt calidiores pulsum habent maiorem, celeriozem, ac longè frequentiozem, non multò tamen uehementiorem: sed qui natura sunt grandiores maiorè ac longè rariorem: non multo uehementiorem.

**Pulsus iuxta
ætates.**

Per ætates quoq; mutantur pulsus, ut puero nuper in lucem edito, pulsus est frequentior: seni, rarior. Qui uerò ætate sunt inter hos media, ijs pulsus ad proportionẽ respondent, prout scilicet proprius ad pueri aut senis ætatẽ accesserint. Maximus quidẽ inter ætates est constantium ætate ac uigentium pulsus, minimus autem senum, medius inter ipsos puerorum paulo tamen maior. atq; constantium uehementissimus: senum maximè languidus: puerorum inter ipsos medius. quibus ut celerrimus, ita seni tardior. in medio sunt qui alias ætates agunt.

**Pulsus iuxta
anni partes.**

Per anni tempora etiam pulsus immutantur, ut Vere medio si anni tempora spectemus, pulsus sunt maximi ac uehementissimi: celeritate uerò ac frequentia moderati. Similiter & Autumno medio se habent. Progrediente autem Vere, magnitudo quidẽ & uehementia pulsus imminuitur, augentur tamen celeritas & frequentia. Aestate adueniente pulsus fiunt languidi & parui, celeres ac frequentes.

Autumno

Autumno progrediente magnitudo, uehementia, celeritas, et frequentia: pulsus ipsi imminuuntur. Hyeme accedente, pulsus in paruitatem, languorem, tarditatem ac raritatem mutantur. Porro ut Veris initium Autumno exitui, ita Veris exitus Autumnus initio respondet: sicuti æstatis principium eius ipsius fini, & sic de Hyemis initio cum suo fine intelligendum.

Per regiones etiam immutantur. In calidis admodum regionibus pulsus sunt quales æstate media, & in ualde frigidis quales media hyeme. In temperatis uerò quales Vere medio. Quæ autem inter has sunt mediæ, ad proportionem se habent. Ex aëris quoque nos ambientis constitutionibus, quæ calidæ sunt temporibus anni calidis, quæ frigida frigidis, quæ mediæ medijs Veris temporibus sunt similes. Mulieribus uterogredientibus pulsus sunt maiores, frequentiores ac celeriores: Cæteræ autem modum suum naturalem retinent. Somnus etiam pulsum immutat, nam principio hunc minorem, tardiolem, rariorem, ac languidiorem efficit: procedente uerò tempore tarditatem ac raritatem adauget. Si diuturnior is fuerit, rursus in languorem mutatur: ac paruitatem, tarditatem et raritatem retinet. Qui à somno sunt expergefatti, protinus quidem ipsi pulsus sunt magni, uehementes, celeres, frequentes, ac quodammodo turbati. uerum non ita multò post ad mediocritatem reuertuntur.

Pulsus iuxta regiones.

Corporis temperamenta acquisititia haud secus q̄ naturalia pulsus immutant. Exercitationes principio quidem quo ad mediocritatem peruenerint, pulsus efficiunt uehementiores, magnos, celeres, ac frequentes. Si quis multum supra uires laboret, paruos pulsus, languidos, celeres, & frequentissimos habet: sin modo plurimum excesserit & uires sint exolutæ, paruos admodum ac languidos, tardos ac raros pulsus habebit, idq; ad proportionem exolutionis seu dissolutionis.

Balnea quales efficiant effectus,

Balneorum insuper quæ calida sunt, quam diu erunt temperata ac moderata, magnos, celeres, frequentes ac uehementes pulsus efficient: si uerò modū excesserint, paruos ac languidos, & præterea celeres ac frequentes. quod si ibi non cessetur, paruos, tardos, raros, ac languidos pulsus efficient. Quæ autem balnea frigida sunt repente quidem paruos, tardos, ac raros pulsus edent. Quod si frigore stuporem induxerint, paruos, languidos, tardos, & raros: contra uerò quæ calorem ac robur induxerint, magnos quidem ac uehementes: celeritate tamen ac frequentia moderatos efficient.

Edulia quales pulsus efficiant,

Edulia multa sic ut uires grauent, pulsus reddunt inæquales & inordinatos: pauciora uerò sic ut minus quàm par est nutriant, minorem moderatis pulsum efficiunt. Vinum ciborum instar pulsus immutat,

mutat, sed magis repente, desinitq; citius: Celeritatem magis auget, & magnitudinem, quàm uehementiam ac frequentiam. Aqua omnium quæ sumuntur mutationem minimam efficit, nutrit tamen ad proportionem ciborum. Ab ira pulsus fit magnus, uehemens, **Pulsus ex affectibus.** altus, celer ac frequens. A uoluptate, magnus, rarus, non tamen uehementia diuersus. A mœstitia, paruus tardus, languidus ac rarus. A metu recenti ac uehementi, celer, turbulentus, inordinatus atq; inæqualis: inueterato autem, pulsui à mœstitia est similis. Omnibus his si diu perseverauerint, aut uehementes admodum fuerint, ijs quales solutæ uires denunciare solent, erunt similes. soluunt enim hæc omnia uires celeriter quidem si sint ualida: serius si imbecilla. Dolor qui pulsus immutat, id quidem aut quia uehemens est, aut quia partibus principibus inest, cuiusmodi est inflammatio. Et cum paruus adhuc est dolor, atq; exoritur, maiorem, uehemētiorem, celerio rem frequentio rem pulsum efficit: auctus uerò uehemensq; admodum factus, sic ut iam robori uitæ noxam inferat, minorem, languidiorem, celerem ac frequentem: & quo diuturnior fuerit aut uehementior, eò magis intenditur. Sed qui iam uires dissoluit, pulsus immutat in languorem, paruitatem ac falsam celeritatis imaginem, immensamq; frequentiam. Omnis inflammationis **Pulsus ex inflammatione.** pulsus quidem communis est quasi serratilis, ut pars

arteriæ alia delatari uideatur, alia autem minimè, quæ uidelicet durior sentitur. habet autem pulsus hic & turbationis nonnihil: præterea celer est ac frequens: magnus autem non semper: incipientibus maior, uehementior ac frequentior est naturali: cū uerò increfcit, omnia hic fiunt auctiora pulsusq; est durior ac turbulentior: in uigore autem seu statu durior, turbulentior, sed durior quàm ante, nō tamè languidior, nisi morbus uires superauerit, & tunc frequentior ac celerior. Partes quæ magis sunt neruosa hæ duriores (quæ pulsus efficiūt serratiles) ac magis duriores: partes uerò uenosa & arteriosa contrarios his ipsis: Estq; maior in partib. magis arteriosis pulsus, qui inæqualis atq; inordinatus efficitur. Perspicuū igitur iam est, qualis esse debeat pulsus eorum quibus hepar est inflammatum, et eorū quibus lien, renes, uesica, uentriculus, intestinum colon: præterea pleuriticorū, perineumoniarum, & ut summatim dicam omnium quorum inflammationem partis febris consequitur. Attamen quibus phrenes sunt inflammata, celeriter conuelluntur. Suffocantur quibus pulmones syncope præhenduntur, quibus os uentriculi laborat atrophia, quibus non coquit uentriculus & hepar, aut urinae supprimuntur, quibus etiam renes sunt inflammati.

Pulsus pleuriticorum.

Pleuriticorum pulsus celer est ac frequens atq; uehemens. Plenius in lib. de dignotione pulsuum Galenus scripsit.

scripsit. Interea ubi pleuritis transit in perineumoni-
 am, pulsus excedit, & syncopen minatur. Atq; puru-
 lentorum nuper incipientium talis est pulsus, qualis
 uigentis inflammationis, & nonnunq̃ inæqualis et in-
 ordinatus existit. Cum autem pus instat, uehementior
 est æquali: postquam uerò est ruptum, languidior,
 tardior ac rarior. In hectica febre & marasmo pul-
 sus non simpliciter neq; secundum unam speciem mu-
 tatur. Phthisicorum pulsus paruus, languidus, mol-
 lis, celer, mediocriter hecticus. Perineumonicorum
 magnus & aliquantum fluctuosus, languidus, ac mol-
 lis, non aliter quàm in lethargo, nisi inæqualitate su-
 peraret. Omnes perineumonici febre acuta corrip-
 untur, aut graui sopore: Græci κῶμα uocāt, illo mo-
 do inflammatio et admodum frequens est pulsus: hoc
 uerò infrequentior. Lethargicorum pulsus cum sit
 magnitudine, languore & mollitie perineumonicorū
 pulsui similis, eodem tamē tardior, languidior, minus
 inæqualis ac deficiens, magis quàm intercidens. Phre-
 niticorum pulsus paruus est, durus ac neruosus, fre-
 quens et ualde celer, nonnunq̃ subtremsens, atq; mag-
 na ipsius frequētia syncopē minatur. In catalepsi pul-
 sus à Lethargo, specie non multū discrepat, nō tamē
 sunt imbecilli aut molles, atq; in lethargo, inæqualis
 est: in catoche uero seu catalepsi æqualis. In cōuulsioe
 pulsus est inæqualis nullū diastoles aut systoles indicium
 habens,

habens, apparet tamen uehemens ac magnus magis quàm sit. In Paralyfi pulsus paruus, languidus, tardus, & quibusdam rarus, alijs frequens: interdum deficiens, inordinatus. Epilepticorum & apoplepticorum pulsus sunt similes: in his tamen intensiores.

Orthopnææ acutæ, pulsus est inæqualis, inordinatus, ac penè deficiens cum maligna frequentia; cum ad ultimum uergit tardus, ac deficiens: cum uerò hominem è medio tollit, frequens ac languidus. Suffocationis matricis pulsus est conuulsoriae extensæ, ac rarus: eius uerò quæ est exitialis, frequens ac languidus,


Pulsus stomachi affecti.

inordinatus ac penè deficiens. Stomachi affectus non secundum unam speciem pulsus immutat, sed inflammatione eam duntaxat mutationem facit, cuiusmodi in inflammatione corporis neruosi: si uero compressus fuerit aut morsus aut singultiens uel exolutus, uel uomituriens, nauseabundus aut imbecillus appetitusue careat, aut doloribus multis sit obnoxius, pulsus mutat secundum symptomatis speciem. Morsus enim ac uomitus nausea, singultus, appetitus, priuationes atq; dissolutiones, præterquàm quod pulsus paruus efficiunt ac languidus, ipsum etiam reddunt admodum frequentem, & in quibusdam moderatè celeriores. Compressio autem sola extra hæc omnia, rarus, tardus, paruus et obscurus reddit. hic affectus accidit à cibis ipsum uentriculū grauantibus sola quantitate

tum humoribus quibusdam in ipsum confluentibus. quod si ab ipsis refrigeretur, tunc maxime huiusmodi pulsus accidet: similiter & quibus magna est fames quam Græci Βαλιμίαυ appellant. Hydropum pulsus in ascite quidem longus ac frequens et subdurus cū quadam tensione: in tympanite uerò longior, non imbecillus, celerior, frequens, subdurus cum quadam tensione. In anasarca, fluctuosus latior ac mollis. Elephantiasis pulsus, parvus, imbecillus, tardus ac frequens. Ictericorum pulsus sine febre, minor, frequentior, durior, non languidus neq; celer. Eorū qui Eloborum sumpserunt paulo quidem antequam uomāt, quando scilicet premuntur, pulsus est latus, rarus, languidior ac tardior: cum uomunt ac conuelluntur inæqualis & inordinatus: cum meliuscule iam habēt ordinatus quidem sed adhuc inæqualis uerum minus quàm antea. Qui syncope corripiuntur, conuelluntur, ac singultiunt: ijs pulsus paruus, languidus, inordinatus, celerior, & admodum frequens. Pulsuum igitur omnium causam, usum et differentiam scire oportet ut qui uitalis facultatis robur indicent, atq; differentias ipsorum indicabit tabella sequens.

In pulsu

BLASII HOLLERII



Hæc

Hæc de σημειωτικῇ medicæ artis parte quæ signa docet sufficere iudicamus. atq; ubi paucula de methodo in curandis morbis obseruanda adiunxerimus, non multum ultra opus hoc nostrum producemus. Non enim (quod aliqui faciunt) præcepta seu theoremata artis & medicamenta siue simplicia fuerint siue composita, eodem uoluntate tanquam uasculo comprehendendi contineriq; uolui. quin potius aliquando, diuinæ maiestatis ope adiutus, de ipsis aliquid in medium adferam.

DE METHODO IN CURANDIS
morbis obseruanda. CAP. VIII.

METHODVM, qua progrediendum sit in morbis curandis ante aliquot annos edidimus, itaq; persunctoriè tantum hic admonebo quæ consideranda priusq; ægrotantium curâ quis suscipiat. idq; iuxta Hippocratis medicorû omnium præstantissimi tradita. Principio inquit considerandum unde morbi fiant ac generentur: deinde longine sint an breues, lethales an non lethales, & in qua corporis parte sedem habeant. Etenim læso cerebro, spinali medulla, hepate, diaphragmate, uesica, uena cava, aut corde ipso mors est: sic in muliere grauida perineumonia, febris ardens, pleuritis, phrenitis, aut deniq; erysipelas in matrice.

Neces-

Neccessario quoq; enecat phthisis, hydrops carnosus, in quibus iam facti morbi fuerint. Ceteri interdum mortales, & interdum non. Est quoq; considerandū ne quid intempestive fiat aut dicatur, & contra quæ exquisitè & secundum artem fiant & dicantur.

Cogitandum etiam num manu artificiosa an medicamentis fieri debeat curatio. Inspiciendum & corpus num calidum, frigidum, humidum, siccum: robustum uel imbecille, densum, rarum. Et quæ tardè, citò, rectè aut non rectè succedant: & an ex malo aliud sequatur, interdum enim morbi degenerant, ut pleuritis in perineumoniam, tenesmus in dysenteriam, dysenteria in lienteriam, lienteria in hydropem, perineumonia & pleuritis, in empyema. Consideranda etiam tempora, nam intempestive quidem fit cum quis morbus qui manè curari debebat, si meridie uel alia quadam parte diei curetur, uel ediuerso, aut uere si æstate, & sic de reliquis tempestatibus. Aut si quod præsentem curationem postulet in aliud tempus differatur aut contra, & an methodo certa aut aliter, atq; possibile num sit uel impossibile, quod ex arte suscipitur. Etenim febricitanti uenterculus exiccatus, uel lusus malum. Contra uerò multum turbatus in hydropicis, spleniticis & leucophlegmatia laborantibus. Erysipelas si in exterioribus corporis partibus hærens ad internas se receperit, malum. Vomitus ei qui uen-

qui uentris fluxu laborat utilis est. Mulieri etiam sanguinē euimenti fluxus menstruorū superueniens optima fit reuulsio. Hęc & similia memoria tenere oportet artem medicam quicunq; cupiat exercere. atque illa ratio qua morbi curantur (Græcis *θεραπεία* est nuncupata,) nō nisi rerum contrariarum usu acquiritur. Vnde morbos suo contrario tolli axioma est medicorum uniuersale. Est quoq; rogandus qui ægrotat si quando purgatus fuerit, qua forma medicamēti magis delectetur: potionibus, electuarijs, catapotijs: & qua saporum differentia. nam aliqui acidis, austeris, salsis, amaris: alij dulcibus uti malunt. Videndum tamen ne sapor augeat affectum: siquidē sapores salsi, acres, amari, in affectibus multum calidis non conuenirent. sicuti nec acerbi, austeri, acidi, in frigidis: tametsi Hippocrates cibum aut potum deteriozem, sed suauiozem, meliori sed ingrato præferat. Quantitas & qualitas eorum quæ assumuntur, ex affectus essentia, magnitudine, anni parte, regione, loco affecto, medicamentorum facultate ualida uel languida, æris temperie, metiri debet. Affectus enim paruus, recens, superficialius, facillē curatur: ob id pauciora ac mitiora remedia postulat, morbo contraria. E diuerso affectus magnus & inueteratus, profundus, & proinde curatu difficilis, ualidiora requirit: Quod si affectus natura contrarij, com-

plicati fuerint, ut hydrops cum febre, ei qui magis urget prima curatio atq; maior remediorum uis adhibenda, non neglecto tamen altero. Sic ubi causa & morbi diuersæ sunt naturæ, ut pituita frigida, et humida causa, febris quotidiana calida & sicca dispositionis, urgentiori maior est habenda ratio, nempe pituitæ: per attenuantia, incidentia, tergentia, concoquētia, et phlegmogoga, eius generationē prohibentia: febris per refrigerantia, humectantia, putredinem pellentia. Si æque polleant, eademq; postulent causa et morbus maior ratio causæ habenda, ut quæ primo loco tolli debeat. Si temperatura partis affectæ & corporis totius est eadem, tum qualitas et uis medicamenti maior parti debetur: ob id sicca magis adhibemus ulceri partis naturæ siccæ, uel si totum etiā corpus fuerit siccum: Contra uerò in parte præhumida, aut toto corpori humefacto, simile ulcus minus siccandum. si corpus humidum sit & pars sicca, miscenda cum siccis humida, uel humido & sicco temperata simplicia, sumpta indicatione ex siccitate quam ulcus naturaliter postulat: eaq; maiore tamen in parte natura humidiori. quod si ulcus malignum & putridū fuerit acribus egent et ignis modo exedētibus. ueluti mysi, chalciti, arsenico, calce, sandaracha. Sed ubi ulcus est cū phlegmone quæ hanc curant refrigerantia, ulcus mordent & insuppurabile reddunt: quæ uerò
ulcus

ulcus tergent & siccant, phlegmonem exasperant. Componendum igitur medicamentū, in quo utriusq; habeatur ratio: maior tamen phlegmone, citra cuius ablationem ulcus non potest curari. Idem statuendū ubi causa adhuc præsens in corpore, & ipse affectus naturæ sunt diuersæ, ut in quotidianis & quartanis febribus causa est materia frigida, morbus uerò calidus.

Duo igitur sunt morborum genera, quæ non nisi methodo curantur, alterum in intemperie: alterum in continui solutione de hoc Galenus lib. tertio, quarto, quinto, et sexto methodi: Postea de his quæ in intemperie consistunt, usq; ad decimum tertium, in quo de humoribus præter naturam differit.

Tempus etiam tum in alimentis, tum medicamentis exhibendis eligendum mitius. Et ubi morbus continuus fuerit, quo tempore minus affligere solet, eo nutriendum & medicandum. Itaq; in febribus intermittentibus die intermissionis, medicamentum purgans debet exhiberi. Considerandæ quæ præcesserunt, uel adsunt, uel impendent spontaneæ uel nostræ uacuationes. Et cum natura integrè ac perfectè per Crysim non uacuauit, uel non uacuat materiam quæ offendit: tunc medicamentis purgantibus, uel alijs (ne quod relinquitur morbum faciat) utendum. adhæc si natura deprauatè

moueat excrementa, ueluti ad pulmones, thoracem, cor, uel aliam partem principem, hunc naturæ motum perhibebimus, & ad contraria transferemus. Motus deprauatus est quoties ante coctionem symptomaticè euacuat. quemadmodum etiam iuxta Cræsum, quando immodicè mouet quo tempore motus ipse inhibendus, reuulsione facta per contrarium.

Sumpto medicamento purgante corpus mouendum Galenus suadet, ut Pharmacum ad inferiorem uentriculi partem descendat. quod si medicamentum fortissimum uideatur, ordeï cremor iuxta Hippocratem, erit sorbendus: ut si ori & orificio uentriculi adhæserit, tergeat & medicamenti ingratum saporem tollat. Vbi autem fieri cœperit purgatio, ptisis sanam minimè concedit, ne uis medicamenti exoluatur. Nos tribus horis aut circiter à medicamento purgante præsumpto, iusculum pulli gallinacei nondum cocti, aut cicerum rubrorum aut hordei absq; sale, & ullo obsonio, per horam aut mediam ante ciborum assumptionem, solemus exhibere. Quod si medicamentum non egerit, ob portionē exiguam uel imbecillitatem, aut ægrotantis naturam siccam uel reſtenta excrementa, enema uel balanum iniiciatur, & inunctionibus lenientibus uenter inferior obliniatur, utaturq; cibis humectandi uim habentibus. Philotinus & Praxagoras (sicuti Galenus refert) suc-

corum

corum copiam è uentriculo & primis uenis uomitu uacuabant, præsumpta largiori mulsa, cui incotum fuerit Hisopum, uel etiam simplicia quædam, alia simili facultate prædita. Vomitus impediunt hyems, capitis dolor, phthisis, phlegmone uentriculi, & partium uicinarum. Et dum quis ægrè uomit cogendus non est, aut uictu humectante paulatim ad uomendum (ut docet Hippocrates) parandus. Vomitu etiam purgatio fit post cibum, non quemuis, sed salsum, amarum, acrem seu incidentem, tergentem. Qui thorace sunt angusto, unde etiam pulmo contrahitur, ad uomendum apti non sunt. Astringentibus principio assumptis aluum cohiberi, post cibum uerò ingesta eam solui Galenus docet. Purgationes ueluti & phlebotomiæ ad morborum sunt consuetorum & impendentium: sicuti Vere ineunte, ut à Vernis uel Aestiuis morbis sit liber: & Autumno, ut denitet Autumnales & Hyemales. Eadem ratione in spontanea lassitudine, plethoricis, & morborum reliquijs. Sani alias purgari non debent, quia inde uertigines ac tormina succedunt, celeriter quæ exoluuntur. Phlegmonis initio sola repellentibus: Augmento miscenda concoquentibus: Statu digerentibus, et his solis in declinatione utendū. Eadem ratione in reliquis morbis ex fluxione prodeuntibus, nisi fluxio eruperit in partem aliquam principem, ut est cerebrum,

Vomitum quæ impediunt.

Lib. VI. sanit. tuend. & ij, alim. ment.

brum, cor, hepar: aut nisi materia fuerit uenenosa & pestilens, aut crassa, glutinosa, impacta, profunda: ut in pleuritide, schiade, ubi anodinis per initia utimur: postea uerò concoquentibus & digerentibus, totius corporis ratione præhabita, si purgatione egere uideatur. Potiones purgantes dū morbus dat inducias, tēpore matutino: Catapotia, magna ex parte media nocte, maximè quæ scamoneam recipiunt, aut post primum somnum: interdum duabus horis ante coenam si leuiores sint & dosi media. idq; in defluxionibus ad diuertendum. Sed cum uentriculum, intestina, & uenas meseraicas purgare libet, etiam hora una ante uel post sumptum cibū leuiora quædam cathartica exhibemus, ut catapotia, ruffi, mastichina, assaiaret, ex aloe, (quas ante cibum etiam nominant) aut cassiam nigram. Quibus hepar calidius est, ijs hora una ante purgantis medicamenti usum, ptisanæ uel alterius similiter refrigerantis & humectantis ad uncias octo, aut aliquid ultra propinabimus. præsertim aëre calido: aut ante coenam, uel horis duabus tribusue à coena. Idem quoq; facimus hepate iam per alimentum temperato. In frigidis regionibus & corporibus natura pituitosis, inexplata ingluuie, à purgantibus scamnoneatis in uentriculo externa coena uacuo, non timemus. quod in eo adhuc pituita fluctuet atq; hereat, sed iuscula celerius post scamnoneatis

moneatis (quæ non multo post uacuant) sorbenda, ut citius fiat deiectio & noxa eluatur. Rhabarbarum non ita citò è corpore pelli debet, nam uisceribus etiam sua ui astringente prodest: Vbi autem morbi uiolentia ex improviso urget, quocunque tempore, modo uires ferant, medicamentum etiam uehemens potest exhiberi. quandoquidem extremis morbis extrema exquisitè remedia optima esse Hippocrates iudicauit.

Aph. VI.
lib. I.

Sub cane & ante canem, seu in temporibus multum calidis frigidisue, à medicamentis fortibus & phlebotomia, quæ calorem natium imminuit & extinguit abstinendum, nisi maxime urgeat necessitas: & tunc noctu potius quàm die, aut locis humana industria refrigeratis. Sunt igitur non solum partes anni quatuor considerandæ & obseruandæ, uerumetiam diei pars matutina, meridiana, uespertina, nocturna: antè cibum, uel post, & similia. Ad tempus etiam referri potest affectus prior curandus, qui est causa alterius. ut si fluxio à capite in oculos defluat, caput primo purgandum, deinde oculorum infirmitati prospiciendum. Sic & dum præcauemus ne morbi generentur, ubi tamen minor remediorum quantitas requiritur. Caterum hepar ab obstructione præcauent & obstructum liberant, incidentia, tenu-

antia, abstergentia, uacuantia, mane praesumpta. Extrinsecus etiam adhibentur linimenta, unguenta. Densitas per ea quae rarefaciunt, ueluti tenuitas in crassantibus, ad symmetriam reducitur. Abundantia euacuantibus et crassitudo dissecantibus, sicuti lentor ijs quae detergent curatur. atque totum corpus aut pars uno affectuum, aut pluribus si afficiatur, per contraria succurrendum. In morborum curationibus ubi periculum non impendet, à leuioribus incipiendum, quae si non sufficiant nullo modo inueniunt, ad fortiora progrediendum: consideratis uiribus, aeris temperie, etate, anni parte, coeli statu, sensu exacto, uel obliquo, et id genus. Imbecilla quoque remedia debilibus, sicuti fortia robustioribus exhibenda. Saepe tamen uetus copia grauata falsam imbecillitatis suspensionem praebent, et tunc ualentiora ferre possunt. Pueri et senes fortia non ferunt, illi siquidem calidi et humidi cum sint, per insensibilem transpirationem copiose uacuantur: hi uero frigidi sunt, unde parum robusti.

DE PONDERIBVS. CAP. IX.

HVC spectant quae de ponderibus et mensuris frequentiori usu habentur, ut est libra et eius partes, utpote semilibra, triens, quadrans, quincunx, sextunx, septunx, bes, dodrans, dextans, deunx.

de unx. Deinde uncia, semiuncia, drachma, scrupulus,
& quæ sub ipsis sunt, ut schema sequens indicabit.

Libra medica constat.	Vnciis duode- cim: Vncia au- tem.	Drachmis 8. Seu denarijs 7 Aureo. 1. idest drac. & med. Obulis 48.
	Drachmis no- naginta sex: drachma uero	Scrulpis 3. Obolis 6. Lupinis 9. Siliquis 18. Aereolis 36. Granis 60. Lentib. sem 36.
	Scrulpis ui- ginti quatuor: Scrulpus au- tem.	Obolis duo- bus. Lupinis trib. Granis 20.
Hemina	{ Quartarios duos: seu uncias de- decem, siue acetabula quatuor.	
Sextar.	{ Heminas tres & liquidorū duas.	
Congius	{ Sextarios sex.	
Cyathus	{ Sextarij partem duodecimam.	

Conti-

X 5 Sextu-

Sextula.	{	Scrupulos quatuor.	} net.
Sicili =	{	Quartam partem unciae, id est	
quus.	{	drachmas duas.	
Ex Ara =	{	Aureus.	} Compre
	{	Sesquidrachmam.	
bibus no	{	Vncias uiginti.	
te sunt.	{	Grana sex.	
	{	Dauich.	} hendit.
	{	Grana tria.	

Partes libræ sunt: uncia, semiuncia, trien, quæ= arans, quincunx, sextunx, septunx, Bes, dodrans, dexstans, deunx. quibus addi potest fescuncia, id est, uncia & dimidia.

Atq; indifferenter tum siccis tum humidis rebus, Hemina, Sixtarium, Acetabulum, Cyathum, diximus: quemadmodum Iacobus Syluius, uir in Medicina nostra & ætate doctissimus obseruauit. Sed nunc de signis cœlestibus & Planetis quibus inferiora hætenus regi creduntur, pauca adijciamus.

DE SIGNIS COELESTIBVS ET planetis. CAP. X.

DISTINXERVNT Astrologi globum cœlestem in partes duodecim, quas ipsi domos cœli appellarunt: Quarum sex semper supra Horizonta apparent: aliæ uerò sex sub Horizonte

zonte occultantur. & his domibus attribuuntur singulatur membra corporis humani : ut in sequenti schemate apparebit.

Messahala morbos curare incipit, Luna existente in signo membrum respiciente.

Signa igitur sunt duodecim.	}	Aries calidum & siccum.	}	Caput	Cum suis partibus & morbis.
		Taurus frigidum et siccum.		Collū.	
		Gemini calidum & humidum temperatè.		Humeros.	
		Cancer frigidum & humidum temperatè.		Pectus	
		Leo calidum et siccū excessivè		Cor.	
		Virgo frigidum & siccum minus temperatè.		Ventrem.	
		Libra, calidum et humidū in-		Renes	
		temperatè.		Puden-	
		Scorpio, frigidum & humidū à temperamento recedens.		da.	
		Sagittarius, calidum et siccum ab omni temperamento remotum.		Fœmora.	
		Capricornus, frigidum & siccum distemperatè.		Genua	
		Aquarius, calido & humido excedens.		Crura.	
		Pisces, frigidum & humidum excessivè.		Pedes.	

respicit.

Planetae sunt sep- tem.	Sol.	Habet domū in	Leone.
	Luna.		Cancro.
	Mars.		Ariete, Scor- pione.
	Mercurius.		Geminis, Vir- gine.
	Iupiter.		Sagit. Piscib.
	Venus.		Tauro, Libra.
	Saturnus.		Capric. Aqua.

Inter ipsos Planetas amicitia quaedā qualitātibus ijs-
dem esse dicitur, seu inimicitia diuersis: unde boni uel
mali aspectus.

Hactenus eam medicæ artis partem sum prosequu-
tus, quæ necessario præponi præmeditariq; debet, an-
tequam ægrotantibus medeamur. Fieri enim non po-
test, ut quis recte præter naturam affectiones tollat,
quas prius non nouerit, itaq; praxim in adeundis
periculis non (ut existimo) infoelicem edi-
turus cū sim, malui prius in pauca re-
digere quæ prænouisse opor-
teat. quare boni consu-
lat etiā quisquis
maiora po-
test.

F I N I S.

E R R A T A.
 PRIMVS NVMERVS PAGINAM
 secundus uerò lineam indicat.

Pag. 10. Lin. 3. autem. Ibid. lin. 14. crearet. pag.
 15. l. 15. apes. Ibid. l. 23. institutas. p. 21. l. 10. statim.
 Ibid. l. 21. particulas. p. 23. l. 23. demoliri. p. 25. l. 18.
 acri. p. 32. l. 12. excernendi. Ibid. l. 24. arcem. p. 34.
 l. 17. trahunt abundantia. Ibid. adustione. p. 39. l.
 11. Quid. p. 45. l. 6. phragma. p. 47. l. 2. columna. p.
 48. l. 23. uentriculi. p. 50. l. 1. meningas. Ibid. l. 3. sen=
 sorij. Ibid. l. 12. quidem. p. 53. l. 10. facili mè p. 58. l.
 2 aorta. p. 60. l. 22. unde. p. 62. l. 1. desumunt. Ibid.
 l. 19. cum etiam. p. 64. l. 7. pro, atq; legendum estq;
 & expungatur est, subinde sequens. p. 66. l. 16. fo=
 cile. p. 68. l. 14. sensu. p. 78. l. 16. chronico. p. 81. l. 17.
 quorum usu. p. 84. l. 19. quiescentia excitat. p. 94. l.
 15. ocyssimè. p. 96. l. 13. accumulatur. p. 79. l. 24.
 plenitudinis species. p. 98. l. 4. palida. p. 102. l. 9. re=
 liquus. p. 104. l. 8. febres synochæ. p. 111. l. 23. febrüs
 p. 112. l. 4. qua aperta. p. 116. l. 25. comminuunt. p.
 123. l. 1. incendio. p. 123. l. 19. interpellabit. p. 125. l.
 1. difficile. p. 127. l. 8. Venæ. p. 136. l. 13. spermatis. p.
 138. l. 7. marasmus. p. 146. l. 20. inductis antequam
 frictione ad æqualitatem. p. 147. l. 15. habere. Ibid.
 l. 17. eorum pro eius. p. 148. l. 23. collocant. p. 150. l.
 5. ructus. Ibid. l. 11. saliuæ. p. 158. l. 24. distentionem
 p. 159. l. 24. oppositionibus. p. 162. l. 22. iudicantur

p. 17 .

p. 170. l. 5. uenas. p. 171. l. 16. quadam. p. 174. l. 12.
februm. p. 175. l. 16. aqueæ. p. 177. l. 14. uel cōtra,
expungatur. p. 183. l. 4. generatur. p. 188. l. 2. con=
uersos. Ibid. l. 24. Priuatim. p. 195. l. 17. nuncupatur
p. 196. l. 10. foetidus. p. 199. l. 4. cōstas. p. 202. l. 18.
σφρυγτῆς. p. 204. l. 4. quæ expungatur. p. 212.
l. 1. soleat. p. 216. l. 1. præcipuè.

Si quæ adhuc desiderentur, uel in distinctionibus,
per se quis facile aduertet.

